Б45

Р. Л. БЁМЕ
А. А. КУЗНЕЦОВ

ПТИЦЫ ЛЕСОВ И ГОР СССР

Р. Л. БЁМЕ
А. А. КУЗНЕЦОВ

ПТИЦЫ ЛЕСОВ И ГОР СССР

ПОЛЕВОЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ИЗДАНИЕ 2-е

Пособие для учителей

КВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1981

ББК 28.693.35
Б45

Рецензенты: кандидат биол. наук, доцент В. Т. Бутьев (МГПИ им. В. И. Ленина); кандидат биол. наук, зав. отд. орнитологии ЗИН АН СССР В. М. Лоскот

Беме Р. Л., Кузнецов А. А.
Б45 Птицы лесов и гор СССР: Полевой определитель. Пособие для учителей. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1981. —223 с., ил., 24 л. ил.

Пособие предназначено для определения птиц в полевых условиях. Определение птиц проводится по их величине, которую нужно сравнивать с размерами всем известных и широко распространенных видов птиц — домашнего гуся, курицы, вороны, домашнего голубя, скворца и воробья. Книга содержит описание около 400 видов птиц.

Б $\frac{60\,501-685}{103\,(03)-81}$ 139—81 4306011000

ББК 128.693.35
596.4

© Издательство «Просвещение», 1981 г.

ОТ АВТОРОВ

В нашей литературе имеется много общих сводок по птицам отдельных областей и всего Советского Союза, но все они предназначены для специалистов-зоологов. У нас очень мало пособий для самостоятельной работы учителей средней школы с птицами в полевых условиях. Обычно для этой цели используют полевые определители А. Н. Промптова и А. Н. Сунгурова. Однако названные пособия охватывают только птиц европейской части СССР, без Карпат, Крыма и Кавказа.

Специально для учителей средней школы и любителей природы в последние годы написано три определителя: «Птицы лесов и гор СССР» (авторы: Р. Л. Бёме, А. А. Кузнецов), «Птицы СССР» (авторы: В. Е. Флинт, Р. Л. Бёме, Ю. В. Костин, А. А. Кузнецов) и «Определитель птиц фауны СССР» (авторы: П. П. Второв, Н. Н. Дроздов). Во второе издание полевого определителя «Птицы лесов и гор СССР» внесены некоторые уточнения и изменения, в частности изъяты характеристики птиц как объектов охоты и введен показатель РОВ (редкий охраняемый вид). В конце определителя приведен список редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц, включенных в Красную книгу СССР.

Все рисунки в книге оригинальные и выполнены художником-анималистом В. Ф. Федотовым.

ВВЕДЕНИЕ

Определитель «Птицы лесов и гор СССР» охватывает все лесные и горные области нашей Родины.

В определительные таблицы включены только птицы, гнездящиеся в горных (горы от подножия до вершин) и лесных (вместе с долинами лесных рек, озер и болот) местностях. Птицы, встречающиеся во время пролетов и кочевок, не описаны.

Некоторые виды птиц в таблицах объединены, например, пеночки, сверчки, большинство камышовок и некоторые другие. Все они в полевых условиях практически неотличимы друг от друга, и детальное определение можно произвести, только имея птицу в руках. Правда, почти все они хорошо различаются по голосам, но передача голоса буквами или нотами весьма несовершенна и в значительной степени зависит от индивидуального восприятия звуков слушателем.

Построение определителя предельно упрощено в целях наибольшей доступности его для недостаточно подготовленного читателя. Если в других определителях отряды, семейства, роды и виды птиц находятся с помощью специальных таблиц, построенных на отдельных внешних признаках птиц, по принципу тезы и антитезы, то основным ключом к определению птицы в данном определителе служит только ее величина, которая приводится в сравнении с величиной наиболее известных, широко распространенных видов — домашнего гуся, курицы (или утки), вороны, домашнего голубя (или галки), скворца и воробья.

В отдельных случаях бывают отклонения, так как птица может быть немного крупнее или мельче птицы, взятой для сравнения.

В некоторых случаях допущены исключения. Например, самый крупный из наших диких голубей — вяхирь величиной с ворону, но облик его типично голубиный, и сравниваешь его при встрече именно с голубем.

Конечно, некоторых птиц по их телосложению и манере держаться трудно сравнивать с птицами, взятыми за образец размеров, поэтому приходится делать это условно. Для облегчения использования специальных научных сводок по птицам приведены латинские названия каждого вида.

«Птицы лесов и гор СССР» — один из двух томов полевого определителя птиц. Второй том — «Птицы открытых и околоводных пространств СССР», построенный по тому же принципу, что и первый, включает описания птиц, обитающих в степях, пустынях и полупустынях, на побережьях морей и берегах различных водоемов. Таким образом, отправляясь в лес, нужно брать с собой первый том полевого определителя птиц, а при поездке к морю — второй.

Желаем вам приятного знакомства со всеми встреченными вами птицами.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

В определении птицы в равной мере используются текст и рисунок. Увидев птицу и определив на глаз ее примерную величину (с ворону, с воробья и т. д.), надо найти в данной книге соответствующую группу таблиц, где по рисунку определяется сразу вид птицы. На таблице есть название птицы, по которому следует найти ее описание. Кроме описания, прилагается картосхема, где показано распространение данной птицы на территории СССР. По карте видно, может ли птица быть встречена в местности, где производятся наблюдения, в гнездовое (весенне-летнее) время. Характеристика каждого вида дается очень кратко и разбита на ряд пунктов.

Сокращения:

В. — величина в сравнении с птицей, взятой за образец.
ОП. — особенности поведения и характерные признаки птицы.
Г. — весьма приблизительное изображение голоса птицы буквами.
От. — отличия данной птицы от наиболее похожих на нее.
Б. — биотоп, т. е. описание мест, где живет птица.
ХП. — характер пребывания птицы, т. е. является она перелетной или встречается весь год.
Гн. — гнездование: очень краткие сведения о местоположении гнезда, количестве и цвете яиц.
РОВ. — редкий охраняемый вид, внесенный в Красную книгу СССР.

ПТИЦЫ
КРУПНЕЕ ГУСЯ













1. Серый журавль—Grus grus L.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупная длинноногая и длинношеяя птица. Держится парами, во время пролета — стаями. Шея и ноги в полете вытянуты. Летящая стая выстраивается треугольником. Общая окраска серая. Горло, низ шеи и верх головы черные. Затылок голый, красный. Ноги ч рные. *Г.* Громкое курлыканье. *От.* В отличие от даурского жура ля, ноги черные, на голове и шее светлые полосы. *Б.* Глухие топкие болота, пойменные луга и берега озер. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 2 зеленовато-бурых с темными крапинками яйца.

2. Даурский журавль — Grus vipio Pall.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупная длинноногая и длинношеяя птица. Держится парами, на пролете — стаями. В полете голова, шея и ноги вытянуты. Общая окраска серая. Голова и верхняя часть шеи белые. Бока головы (от клюва до уха) серые. Ноги красные. *Г.* Звонкое курлыканье. *От.* В отличие от серого журавля, ноги красные, голова и шея белые. *Б.* Горные заболоченные узкие долины с речками. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 2 зеленовато-бурых с темными пятнами яйца. *РОВ.*

3. Уссурийский журавль — Grus japonensis Müll.

В. Значительно крупнее гуся. *ОП.* Очень крупная длинноногая и длинношеяя птица.



Держится парами, во время пролета — стаями. Ноги и шея в полете вытянуты. Общая окраска белая. Низ головы, верх шеи, задние перья крыльев, хвост, лоб и ноги черные, темя красное. Лоб и темя голые. *Г.* Громкое курлыканье. *От.* В отличие от других журавлей, размер значительно больший, окраска серно-белая. *Б.* Обширные болота и побережья рек. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 2 зеленовато-бурых с темными пятнами яйца. *РОВ.*

4. Черный журавль — Grus monacha Temm.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупная длинноногая и длинношеяя птица. Держится парами, на пролете — стаями. В полете ноги и шея вытянуты. Общая окраска черно-серая, голова и шея белые. Лоб голый, черный. Темя голое, красное. Ноги черные. *Г.* Громкое курлыканье. *От.* В отличие от других журавлей, окраска черная, голова и шея белые. *Б.* Глухие таежные моховые болота низкогорий. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 2 зеленовато-коричневато-бурых с темными пятнами яйца. *РОВ.*

5. Черный аист — Ciconia nigra L.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Длинноногая и длинношеяя птица. Держится в одиночку или парами. Часто виден парящим над лесом или бродящим по берегу. Общая окраска черно-бурая. Клюв и ноги красные. Брюхо белое. *Г.* Тихие звуки «че-лин» и негромкое трещание клювом. *От.* В отличие от белого аиста, верх тела буро-черный. *Б.* Высокоствольный лес и скалы близ водоемов. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 2—5 сероватобелых яиц. *РОВ.*

6. Белый аист — Ciconia ciconia L.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Длинноногая и длинношеяя птица. Держится парами, на пролете — стаями. Во время полета шея и ноги вытянуты. Общая окраска белая. Крылья черные. Клюв и ноги красные. У дальневосточного белого аиста клюв черный. *Г.* Весной издает клювом характерное трещание. *От.* В отличие от черного аиста, окраска белая. *Б.* Рощи, отдельные деревья вблизи лугов, болот, поселки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на крыше постройки. В кладке 2—6 белых яиц.



Таблица 1

1. Серый журавль. 2. Даурский журавль. 3. Черный журавль. 4. Уссурийский журавль.



Таблица 2

1. Черный аист. 2. Белый аист. 3. Серая цапля. 4. Лебедь-кликун.





7. Серая цапля —
Ardea cinerea L.

В. Несколько крупнее гуся. *ОП.* Длинноногая и длинношеяя птица. Держится в одиночку, парами и группами, обычно у воды. В полете шея изогнута S-образно. Ноги во время полета вытянуты, крылья кажутся очень широкими. Общая окраска сизо-серая. Голова и шея белые. На голове над глазами длинные черные перья, образующие свисающую на затылке косицу. Крылья черные. По бокам шеи черные полосы. Грудь и брюхо белые. Клюв бурый. Ноги зеленоватые. *Г.* Громкое грубое «крянк». *От.* В отличие от других цапель, окраска однотонная, серо-белая. В отличие от журавлей и аистов шея в полете изогнута. *Б.* Различные водоемы часто с древесной растительностью по берегам. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Часто гнездится колониями. Гнездо на дереве. В кладке 3—7 зеленовато-голубых яиц.

8. Лебедь-кликун —
Cygnus cygnus L.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Держится парами и стаями. Взрослые птицы белые, молодые — буровато-серые. При плавании держит прямую шею вертикально. Голова и клюв направлены вперед. *Г.* Звучное «ганг» или «ганг-го». *От.* В отличие от малого лебедя, величина бóльшая. *Б.* Крупные водоемы, заросшие по берегам тростником. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на завалах старого тростника. Кладка из 4—6 белых яиц.

9. Беркут —
Aquila chrysaëtus L.



В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупный орел. Как и у других орлов, на концах широких крыльев перья расставлены. У летящей птицы хорошо видна широкая поперечная светлая полоса у основания хвоста. Общая окраска темно-бурая. У взрослых птиц верх головы и шеи рыжевато-желтый. Молодые — темно-бурые *Г.* Своеобразный клекот «кьек-кьек-кьек». *От.* В отличие от других орлов, у молодых птиц хвост белый, с черной полосой на вершине. *Б.* Горные и равнинные леса, скалы. Охотится на открытых пространствах. *ХП.* Оседлая, на севере перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве или уступе скалы. В кладке 1—3 грязно-белых с бурыми пятнами яйца. *РОВ.*

10. Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla L.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупный орел. Держится в одиночку и парами. На концах широких крыльев перья расставлены пальцеобразно. Общая окраска серовато-бурая, голова и шея грязно-беловатые, хвост белый. Молодые — бурые. *Г.* Глухое «кра-кра» или звонкое «кии-кии-кии». *От.* В отличие от орлана-долгохвоста, у взрослых белый хвост. *Б.* Побережья крупных водоемов. *ХП.* На севере перелетная, на юге оседлая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 1—3 белых с рыжеватыми пятнами яйца. *РОВ.*

11. Орлан-долгохвост — Haliaeetus leucoryphus Pall.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупный орел. Держится в одиночку или парами. Как и у всех орлов, в полете видны пальцеобразно расставленные перья на концах широких крыльев. Общая окраска черно-бурая с коричневым налетом на боках. У взрослых птиц голова грязно-беловатая, хвост белый с широкой черной поперечной полосой на конце. Молодые — бурые. *Г.* Громкое «квок-квок-квок». *От.* В отличие от белохвоста, у взрослых на хвосте черная полоса. *Б.* Побережье крупных водоемов. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на куче тростника или на дереве. В кладке обычно 2 белых яйца. *РОВ.*



Таблица 3

1. Орел-могильник. 2. Орлан-долгохвост. 3. Беркут. 4. Орлан-белохвост. 5. Белоплечий орлан.



Таблица 4

1. Черный гриф. 2. Бородач. 3. Белоголовый сип. 4. Стервятник (взрослый). 5. Стервятник (молодой).

ФИЛИАЛ №2
НАГ ЧЕРНОИ



12. Белоплечий орлан — Haliaeetus pelagicus Pall.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупный орел. Держится в одиночку или парами. Во время полета перья на концах крыльев расставлены пальцеобразно. У взрослых птиц плечи, брюхо и хвост белые. Остальное оперение темно-бурое. Клюв массивный, желтый. Молодые — серовато-бурые. *Г.* Низкий громкий клекот. *От.* В отличие от других орлов, у взрослых птиц плечи белые. *Б.* Долины низовьев рек с высокими деревьями и скалистые морские побережья. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на вершине дерева. В кладке 1—3 белых яйца. *РОВ.*



13. Орел-могильник — Aquila heliaca Savigny.



В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупный орел. Держится в одиночку или парами. Перья на концах широких крыльев в полете расставлены пальцеобразно. Хвост в полете кажется очень коротким. Часто виден сидящим на отдельных деревьях, стогах и т. д. Общая окраска взрослых птиц темно-бурая, верх головы и шеи желтоватый, на плечах по белому пятну. Хвост бурый. Молодые сверху бурые, снизу рыжевато-коричневые, с продольными темными пестринами. *Г.* Громкое «кьяв-кьяв». *От.* В отличие от беркута, хвост короткий, одноцветный. *Б.* Смешанные и лиственные леса. Охотится на открытых местах. *ХП.* На севере перелетная, на юге оседлая и кочующая птица. *Гн.*



Гнездо на дереве. В кладке 2 — 3 белых яйца. *РОВ.*



14. Белоголовый сип — Gyps fulvus Habl.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупная хищная птица. Держится обычно группами. На падали собирается до нескольких десятков сипов. Виден чаще всего парящим или неподвижно сидящим на скалах. В полете крылья очень широкие, с пальцеобразно расставленными перьями на концах. Окраска глинисто-бурая. Крылья темно-бурые. Голова и шея голые, покрытые редким беловатым пухом. *Г.* Глухое, грубое карканье и шипение. *От.* В отличие от черного грифа, окраска светлая. *Б.* Открытые пространства гор со скалами. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в нише скалы. В кладке 1 грязно-белое яйцо.

15. Черный гриф — Aegypius monachus L.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупная хищная птица. Держится в одиночку и группами. В полете крылья очень широкие, с пальцеобразно расставленными на концах перьями. Общая окраска черно-бурая. Голова и шея голые, с пятнами густого бурого пуха. *Г.* Глухое шипение. *От.* В отличие от сипа, окраска черно-бурая. *Б.* Открытые пространства, чаще вблизи гор. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на вершине дерева. В кладке 1 грязно-белое с красно-бурыми пятнами яйцо.

16. Бородач, или ягнятник — Gypaëtus barbatus L.

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупная хищная птица. Во время полета видны длинные заостренные крылья и длинный клиновидный на конце хвост. У взрослых птиц окраска верха тела буровато-серая, низ тела рыжеватый. Под клювом пучок черных перьев — «борода». Молодые — темно-бурые. *Г.* Негромкий свист и своеобразный мяукающий звук. *От.* В отличие от орлов и сипа, крылья длинные, острые. *Б.* Скалы и открытые пространства гор. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на выступе скалы. В кладке 1—2 беловатых с коричневыми пятнами и крапинками яйца. *РОВ.*

17. Стервятник —
Neophron percnopterus L.



В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупная хищная птица. Держится в одиночку или группами. В полете крылья широкие, с расставленными на концах перьями. Окраска взрослых птиц белая, крылья черные. Голова голая, желтая. Молодые птицы темно-бурые. *Г.* Звенящая трель. *От.* В отличие от других грифов, величина меньше, окраска взрослых птиц белая *Б.* Скалы и открытые пространства. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на выступе скалы или обрыва. В кладке 2 желтовато-белых с буровато-красными пятнами яйца.

ПТИЦЫ ВЕЛИЧИНОЙ С ГУСЯ

Цветная таблица I









18. Глухарь — Tetrao urogallus L.

В. С гуся. *ОП.* Держится в одиночку или небольшими группами на земле, часто садится на деревья. Вылетает иногда из-под самых ног с сильным шумом. Во время весеннего тока в марте — мае самцы собираются группами в редколесье, чаще всего в сосняках среди моховых болот. Самки держатся поблизости. Ток длится от рассвета до восхода солнца. У самца голова, шея и надхвостье серые. Спина коричневая. Хвост и крылья черно-бурые, с мелкими белыми пятнами. Грудь черная с сине-зеленым блеском. Брюхо белое, с черными пятнами. Самка и молодые рыжевато-серые, со светлыми и темными пестринами. *Г.* Во время тока самцы издают звуки, напоминающие щелканье и точение ножа на камне. Самки квохчут. *От.* В отличие от каменного глухаря, клюв крупный, светлый, хвост короткий. *Б.* Моховые болота с редкими деревьями, хвойные леса с ягодниками. Чаще встречается в глухих местах, хотя вылетает на поляны, дороги и берега речек. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—10 желтовато-бурых с бурыми крапинками яиц.

19. Каменный глухарь — Tetrao parvirostris Bp.

В. С гуся. *ОП.* Держится обычно в одиночку на земле или на деревьях. Весной, во время тока, и зимой птицы со-

бираются группами. Окраской самец похож на обыкновенного глухаря, но на спине и хвосте белые пятна. Самка и молодые темно-серые с рыжеватым оттенком, темными и светлыми поперечными пестринами. Хвост длинный, к концу клиновидный. *Г.* Во время тока самцы издают щелкающие звуки. Самки квохчут. *От.* В отличие от обыкновенного глухаря, клюв короткий, темный, хвост длинный, на хвосте и плечах белые пятна. *Б.* Лиственнично-березовые редколесья с ягодниками и заросшие моховые болота. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке обычно 8 буровато-желтоватых с темными крапинками яиц.

20. Полярная гагара — Gavia immer Brünn.

В. Несколько крупнее гуся. *ОП.* Держится в одиночку и парами на воде. При плавании тело глубоко погружено в воду, видны только голова, шея и спина. Хорошо ныряет. Голова и спина черные, на спине белые пятна, по бокам шеи белые полосы. Клюв длинный, белый. У птиц, живущих на восточной Чукотке, клюв черный. *Г.* Громкие стонущие звуки и грубое «гага-га». *От.* В отличие от других гагар, величина бóльшая. *Б.* Богатые рыбой озера. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на островке или куче травы среди воды. В кладке 2 оливково-бурых с темными пятнами яйца.

21. Чернозобая гагара — Gavia arctica L.

В. С гуся. *ОП.* Крупная водоплавающая птица. По земле ходить не может, а только ползает. Окраска верха тела черная, с белыми поперечными полосами. Голова и шея серые. Горло черное, окаймленное снизу белой полосой. Нижняя часть шеи и верх зоба черные. Низ тела белый. *Г.* Громкие крики, напоминающие стон или хохот, и тихое «гага». *От.* В отличие от полярной гагары, величина меньшая, голова серая. В отличие от краснозобой гагары, горло и спина черные. *Б.* Богатые рыбой озера и речные затоны. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на берегу, на земле. В кладке 2 оливково-бурых с черноватыми пятнами яйца.

22. Краснозобая гагара — Gavia stellata Pontop.

В. Несколько мельче гуся. *ОП.* Довольно крупная водоплавающая птица. Окраска верха тела буровато-серая, со светлыми пестринами. Низ тела белый. Голова серая. Горло и прилегающая к нему часть шеи ржаво-красные. *Г.* Громкое стонущее «уааан-уааан», заканчивающееся подобием хохота. В полете — негромкое «га-га-га». *От.* В отличие от чернозобой гагары, горло ржаво-красное. *Б.* Богатые рыбой озера с пологими заросшими берегами. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на берегу, на земле.



Таблица 5

1. Кавказский улар. 2. Каспийский улар. 3. Тибетский улар. 4. Гималайский улар. 5. Алтайский улар.



Таблица 6

1. Горный гусь. 2. Белолобый гусь. 3. Пискулька. 4. Гуменник. 5. Гусь-сухонос. 6. Серый гусь.









В кладке 2 оливково-зеленых с темно-бурыми пятнами яйца.

23. Улары — Tetraogallus

В. Несколько мельче гуся. *ОП.* Крупные птицы, напоминающие по внешнему виду курицу. Держатся обычно небольшими группами на скалах или около них, часто со свистом перелетают с одной скалы на другую. Полет быстрый, прямой. Общая окраска серая, с ржавыми и светлыми полосами и тонким струйчатым рисунком. У алтайского и тибетского уларов брюхо белое, а окраска довольно однотонная, серая. *Г.* Громкий флейтовый свист, короткие свисты «уль-уль-уль», негромкое квохтанье и грубое «ког-когок-кок-кок». *От.* В СССР сходных птиц нет. *Б.* Верхние зоны гор. Скалы и осыпи среди альпийских лугов. *ХП.* Оседлые птицы. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 5—8 желтоватых с мелкими бурыми пятнами яиц. *РОВ.*

24. Серый гусь — Anser anser L.

В. С домашнего гуся. *ОП.* Держится парами и стаями. Крупный гусь, очень похожий на домашнего. Общая окраска серовато-бурая, со светлыми поперечными полосками на спине и боках. Подхвостье и верх хвоста белые. Клюв розовый. *Г.* Громкое звучное «гаганг». *От.* В отличие от гуменника, величина бо́льшая, клюв розовый. *Б.* Поймы рек и озера с густыми зарослями тростника. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—10 белых яиц.

25. Гусь-сухонос — Anser cygnoides L.



В. С гуся. *ОП.* Крупный гусь. Держится парами и стаями. Верх тела и бока буровато-серые, со светлыми поперечными полосками. Низ тела буровато-желтоватый, брюхо белое. Голова и шея сверху рыже-бурые, по бокам шеи по всей ее длине тянутся грязно-белые полосы. Клюв черный. *Г.* Звонкое «гооо». *От.* Издали похож на гуменника, но крупнее. Заметны темная сверху и беловатая с боков шея и черный клюв. *Б.* Различные водоемы в лесу и в горах. После вывода птенцов держится по песчаным косам и на илистых берегах. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 5—8 белых яиц. *РОВ.*

26. Белолобый гусь — Anser albifrons Scop.

В. С гуся. *ОП.* Довольно крупный гусь. Держится парами и стаями. Общая окраска буровато-серая. На лбу белое пятно. На белом брюхе большие черные пятна. Конец клюва желтый, основание розовое. *Г.* Звонкое «кленг-кленг» или «клинг-клинг». *От.* В отличие от пискульки, размер больший. *Б.* Берега рек и озер у северной границы леса и тундра. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3—7 белых яиц.

27. Пискулька — Anser erythropus L.

В. Несколько мельче гуся. *ОП.* Мелкий гусь. Держится парами и стаями. Общая окраска буровато-серая. Лоб, брюхо и подхвостье белые. На груди и брюхе черные пятна. Клюв и ноги оранжевые. Веки желтые. *Г.* Довольно громкое пискливое «клик-клик». *От.* В отличие от белолобого гуся, размер меньше. *Б.* Низовья горных рек, предгорья и горные озера у северной границы леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле или на скалах. В кладке 4—8 белых яиц.

28. Гуменник — Anser fabalis Lath.

В. С гуся. *ОП.* Крупный гусь. Держится парами и стаями. Окраска темно-бурая, светлее снизу. Брюхо и подхвостье белые. Сверху и снизу по всему телу поперечные светлые полоски. Клюв черный, с розовой, оранжевой или красной перевязью. Ноги от желтых до красных. *Г.* Громкое «кайяг» или «го-гок». *От.* В отличие от серого гуся, окраска темная, клюв двуцветный. *Б.* Таежные водоемы (озера, долины рек). *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3—6 светло-палевых яиц.



Таблица 7

1. Филин. 2. Рыбный филин, 3. Большой баклан. 4. Бородатая неясыть.



Таблица 8

1. Ястребиный орел. 2. Змееяд. 3. Скопа. 4. Большой подорлик.







29. Горный гусь — Anser indicus Lath.

В. Несколько мельче гуся. *ОП.* Некрупный, с относительно высокими ногами гусь. Держится обычно стайками. Окраска пепельно-серая. Голова белая, с широкими черными полосами. Клюв и ноги желтые. *Г.* Низкий, трубный звук. *От.* В отличие от других гусей, голова полосатая. *Б.* Высокогорные водоемы, вблизи которых имеются скалы или обрывы. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на выступе скалы, на островке, изредка на дереве. Часто гнездится колониями. В кладке 4—8 белых яиц. *РОВ.*

30. Филин — Bubo bubo L.

В. Несколько мельче гуся. *ОП.* Очень крупная сова. Ведет ночной образ жизни. Полет мягкий, бесшумный. На голове хорошо видны торчащие по бокам пучки перьев — «уши». Окраска рыжеватая, серо-охристая, с широкими темными продольными пестринами и тонким струйчатым поперечным рисунком. Глаза оранжево-красные. *Г.* Очень громкое «хууу» и своеобразное верещание. *От.* В отличие от рыбного филина, лапы оперенные, на груди широкие продольные пестрины. *Б.* Лес, скалы и обрывы на открытых пространствах. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле, в нишах скал и обрывов. В кладке 2—3 белых яйца.

31. Рыбный, или гололапый, филин — Ketupa blakistoni Gm.

В. Несколько мельче гуся. *ОП.* Очень крупная сова. На го-

лове видны растрепанные пучки перьев — «уши». Окраска серовато-охристо-буроватая, с тонким темным поперечным рисунком и продольными полосками — широкими на спине и узкими на груди и брюхе. Ночная птица. Полет мягкий, бесшумный. Часто ходит по берегам речек. Глаза оранжево-желтые. *Г.* Глухое протяжное «бауууу». *От.* В отличие от филина, лапы голые, на груди узкие темные пестрины. *Б.* Лесные долины речек. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дуплах, реже в нишах скал и в старых гнездах хищных птиц. В кладке 2 белых яйца.



32. Бородатая неясыть — Strix nebulosa Forst.

В. Мельче гуся. *ОП.* Крупная темная сова. Полет бесшумный, медленный. Хвост длинный. Окраска серовато-бурая, с темными и светлыми пестринами. Вокруг клюва на «лице» концентрические темные полосы. Горло черно-бурое. Глаза ярко-желтые. *Г.* Глухое «ху-ху-хууу». *От.* В отличие от других сов, на «лице» концентрические полосы. *Б.* Высокоствольные леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—5 белых яиц.

33. Большой баклан — Phalacrocorax carbo L.

В. С гуся. *ОП.* Крупная черная птица с длинными шеей и хвостом. В полете шея вытянута. Сидит вертикально, часто с раскрытыми крыльями. Хорошо плавает и ныряет. Держится обычно стаями. Общая окраска черная, на спине с бронзовым блеском. Бока головы и пятна под крыльями на боках тела белые. Кожа около клюва и горло голые, желтого цвета. *Г.* Грубое, глухое карканье. *От.* В отличие от малого баклана, размер больший. *Б.* Крупные водоемы, богатые рыбой. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездится колониями. Гнездо на дереве. В кладке обычно 4 голубоватых или зеленоватых яиц.

34. Большой подорлик — Aquila clanga Pall.
Малый подорлик — Aquila pomarina Brehm

В. С гуся. *ОП.* Некрупные орлы. Полет тяжелый; часто видны парящими. Обычно садятся на отдельные деревья или столбы. Крылья в полете широкие, с пальцеобразно расставленными перьями на концах. Хвост короткий, округлый. Общая окраска темная, бурая, с более светлыми плечами. *Г.* Звонкое «кьяк-кьяк-кьяк». *От.* Между собой в полевых условиях неотличимы. *Б.* Высокоствольные леса. Охотятся на открытых пространствах. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда на дереве. В кладках по 2 белых с буроватыми пестринами яйца.





35. Ястребиный орел — Aquila fasciata Vieill.

В. С гуся. *ОП.* Некрупный орел. Летает, взмахивая крыльями, парит редко. Хвост довольно длинный. Окраска верха тела черновато-бурая, низ тела охристо-рыжеватый или охристо-белый, с продольными и поперечными темными полосками. Хвост серый, с поперечными темными полосами. *Г.* Не описан. *От.* В отличие от других орлов, хвост длинный. *Б.* Полупустынные и пустынные горы с деревьями и кустарником. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на скале или на дереве. В кладке 2 беловатых с бурыми крапинками яйца.

36. Змееяд — Circaëtus gallicus Gm.

В. С гуся. *ОП.* Некрупный орел. В полете видны широкие крылья с расставленными на концах перьями и довольно длинный хвост с поперечными темными и светлыми полосами. Во время полета иногда «трясется» на месте. У сидящей птицы кажется очень большой серая голова, на которой выделяются светло-желтые глаза. Окраска верха тела бурая, низа — белая, с темными пестринами, продольными на зобе и поперечными на груди. *Г.* Громкое «кииий-о, кииий-о». *От.* В отличие от орла-карлика, размер больший. *Б.* Лес. Охотится на открытых пространствах. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке обычно 1 белое яйцо. *РОВ.*

37. Скопа — Pandion haliaëtus L.

В. Несколько мельче гуся. *ОП.* Крупная хищная птица. Обычно видна летающей или «трясущейся» над водой. Хорошо заметны темные крылья, хвост и белый низ тела. Часто сидит на деревьях у воды. Окраска сверху темно-бурая. На голове белые пестрины. Через глаз к затылку идет резкая темная полоса. *Г.* Громкое «кай-кай-кай». *От.* В отличие от других орлов, черно-белая окраска резко разграничена. *Б.* Богатые рыбой водоемы. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на вершине дерева. В кладке 2—3 бледно-голубоватых с красно-бурыми крапинками яйца. *РОВ.*

ПТИЦЫ
ВЕЛИЧИНОЙ С КУРИЦУ ИЛИ УТКУ



Цветные таблицы II—VII



38. Тетерев —
Lyrurus tetrix L.

В. Несколько мельче курицы. *ОП.* Держится в одиночку и стаями. Весной самцы собираются для тока на лужайках и полях вблизи леса. Окраска самца черная, блестящая, подхвостье и зеркало на крыле белые, брови красные. Хвост изогнут «лирой». Самка и молодые серые, с рыжеватыми и темными поперечными частыми полосками. *Г.* Во время тока самцы издают звуки, напоминающие воркование голубя и громкое «чуфффы». Самки квохчут. *От.* В отличие от кавказского тетерева, хвост лирообразный, на крыльях белые полосы, подхвостье белое. *Б.* Березовые рощи, вырубки и разреженные ельники. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—12 охристо-беловатых с темными крапинками яиц.





39. Кавказский тетерев —
Lyrurus mlokosiewiczi Tacz.

В. Несколько мельче курицы. *ОП.* Держится в одиночку и выводками. Осенью и зимой — стаями. Весной, во время тока, собирается до 40—50 птиц. Окраска самца матово-черная. Самка и молодые — как у тетерева. *Г.* Во время полета самцы издают крыльями свист. Самки квохчут. *От.* В отличие от обыкновенного тетерева, хвост длинный, изогнутый книзу. *Б.* Заросли березняка и рододендронов в субальпийском и альпийском поясах гор. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке обычно



8 охристо-беловатых с неясными темными крапинками яиц. *РОВ.*



40. Фазан —
Phasianus colchicus L.

В. С курицу. *ОП.* Держится очень скрытно, в одиночку, парами и группами на земле. Иногда садится на деревья.

Хвост длинный. Самец окрашен очень ярко. Самки и молодые — скромного буровато-серого цвета с темными пестринами. *Г.* Напоминает пение домашнего петуха или громкое «кур-гок». *От.* Спутать с какой-либо другой птицей нельзя. *Б.* Густые заросли тростника и колючих кустарников. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 10—15 оливково-бурых или голубовато-зеленых яиц.

41. Огарь — Tadorna ferruginea Pall.

В. Несколько крупнее утки. *ОП.* Крупная рыжая со светлой головой утка. Держится парами и небольшими стайками. Встречается далеко от воды. По посадке напоминает гуся. Полет довольно медленный, видны широкие белые полосы на черных крыльях. *Г.* Громкое протяжное «аааанг-ооооуууооуу». *От.* В отличие от других уток, окраска рыжая и бóльшая величина. *Б.* Пресные и соленые озера на открытых пространствах. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в норах, трещинах скал, в заброшенных постройках, реже в дуплах. В кладке 8—12 желтовато-белых яиц.

42. Большой крохаль — Mergus merganser L.

В. Несколько крупнее утки. *ОП.* Крупная светлая утка с длинным, узким, загнутым на конце крючком клювом. Держится парами и стайками. Хорошо ныряет. Издали кажется белой, с большой темной головой, так как на голове большой хохол. У самца голова, спина и хвост черные, надхвостье серое, весь низ тела белый, с нежным розовым налетом. У самки и молодых голова рыжая, вместо черного цвета—бурый. Клюв и ноги красные. *Г.* Глухое «ба-а баб» или трескучее «корр-корр». *От.* В отличие от среднего крохаля, величина бóльшая. *Б.* Озера и реки, богатые рыбой. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле, реже в дупле. В кладке 6—10 белых яиц.



43. Длинноносый, или средний, крохаль — Mergus serrator L.

В. С утку. *ОП.* Крупная утка. Держится в одиночку, парами и стаями, почти всегда на воде. Хорошо ныряет. У самца голова и спина черные, шея, брюшко и основание крыльев белые, зоб бурый, с черными пестринами. На голове хохол. У самки и молодых голова рыжая. Очень похож на среднего крохаля чешуйчатый крохаль, живущий на Дальнем Востоке. Отличается он четким темным чешуйчатым рисунком на боках тела, на зобе нет коричневого цвета. *Г.* Грубое «карр-рр». *От.* В отличие от большого крохаля, величина меньшая. *Б.* Реки и озера, богатые рыбой. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в камнях, расщелине скалы, под поваленными деревьями. В кладке 8—12 бледно-оливковых яиц.



44. Луток — Mergus albellus L.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Мелкая утка. Держится в одиночку, парами и стайками. Хорошо ныряет. Общая окраска самца белая. Спина, крайние перья крыла, полоса от клюва к глазу и полосы по бокам хохла черные. Бока тела серые. У самки голова и хохол рыжие, спина и бока серые. *Г.* Трескучее «экк» или «крр». *От.* В отличие от других крохалей, величина меньшая. *Б.* Лесистые берега таежных рек и озер. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 6—12 белых яиц.

45. Кряква —
Anas platyrhynchos L.



В. С утку. *ОП.* Крупная утка, очень похожая на домашнюю. Держится в одиночку, парами и стаями. У самца голова черная, с зеленым отливом, зоб каштановый, клюв желтый, лапы оранжевые. Самка, молодые и самец в конце лета и начале осени сверху темно-бурые, с широкими темными пестринами, снизу серовато-бурые, с темными пестринами и рыжеватыми головой и шеей. *Г.* Селезни издают своеобразное жвяканье. Самки крякают. *От.* В отличие от серой утки, зеркальце синее. *Б.* Различные водоемы с богатой растительностью. *ХП.* Перелетная, на юге зимующая птица. *Гн.* Гнездо на земле, селится в искусственных домиках на деревьях. В кладке 7—11 белых с зеленоватым оттенком яиц.

46. Шилохвость — Anas acuta L.

В. С утку. *ОП.* Довольно крупная утка. Хорошо заметны тонкая шея и длинный (у самца) хвост, заканчивающийся тонкими острыми перьями. Ныряет редко. Держится в одиночку, парами и стаями. У самца голова коричневая, шея, грудь и брюшко белые, спина и бока серые, с поперечным рисунком. Самки, молодые и самцы осенью серовато-бурые, с темными пестринами. *Г.* Самцы издают мелодичный свист «тью-идить». Самки крякают. *От.* В отличие от других уток, у самца длинный острый хвост, у самки окраска более светлая, шея тонкая. В отличие от морянки, у самца коричневая голова. *Б.* Озера и реки с прибрежной растительностью. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке обычно 8 белых, с желтоватым или оливковым оттенком яиц.

47. Касатка — Anas falcata Georgi

В. С утку. *ОП.* Довольно крупная утка. Держится в одиночку, парами и стаями. У самца на коричнево-зеленой голове длинный хохол, на крыльях свисающие «косицы». Общая окраска серая, со струйчатым рисунком, зеркальце на крыльях зеленое. Клюв и лапы черные. Самки и селезни осенью тускло-серые, с темным поперечным рисунком. *Г.* Самцы издают мелодичное «тютювить... тю-вить». Самки крякают. *От.* В отличие от шилохвости, хвост короткий, на голове хохол. *Б.* Мелкие озера и речные старицы. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8 желтовато-белых яиц.









48. Широконоска — Anas clypeata L.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Некрупная утка с очень широким лопатообразным клювом. Самцы окрашены ярко: голова, шея и клюв черные, зоб и грудь белые, брюхо ржаво-коричневое, плечи серо-голубые. Самки и селезни осенью рыжевато-бурые, с темными пестринами. *Г.* Самцы издают глухое «кхо-кхо». Самки негромко крякают. *От.* В отличие от других уток, клюв лопатообразный. *Б.* Широкие поймы рек и озера. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 7—11 желтовато-белых яиц.

49. Свиязь — Anas penelope L.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Некрупная утка. Ныряет редко. Испуганная, ныряет хорошо. Самец сверху и с боков пепельно-серый, снизу белый, голова красно-рыжая, со светлым рыжевато-белесым хохлом, зоб и грудь красновато-коричневые. Самка и самец осенью сверху однотонно-серые, снизу белые, голова, шея, верх зоба и бока рыжевато-бурые. *Г.* Самцы издают громкий свист «ввиууу», самки — короткое «ерр». *От.* В отличие от других уток (в полете), довольно длинные и широкие крылья, на которых видны светлые широкие полосы. *Б.* Открытые озера и речные затоны, заросшие по берегам травой. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—10 белых яиц.

50. Мандаринка — Aix galericulata L.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Небольшая ярко окрашенная утка. Держится в одиночку, парами и стайками. Часто садится на деревья. У самца окраска яркая, состоит из сочетания рыжего, красно-коричневого, зеленого, черного и белого цветов. На голове хохол и «воротник», на крыльях поднятые вверх перья. Клюв красный, лапы желтые. Самка сверху зеленовато-бурая, зоб, грудь и бока бурые, с белыми пятнами. Хохол на голове бурый. *Г.* Самцы издают своеобразное «вэк-вэк-вэк». Самки крякают. *От.* Окраска настолько своеобразна, что спутать с другой птицей нельзя. *Б.* Лесные речки и озера. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 9—12 белых или желтовато-белых яиц. *РОВ.*

51. Чирок-свистунок — Anas crecca L.

В. Значительно мельче утки. *ОП.* Мелкая утка. Держится в одиночку, парами и стайками. У селезня окраска яркая: голова коричневая, с зеленой полосой, зоб охристый, с черными пятнышками, бока серые, с темным струйчатым рисунком, зеркальце на крыле зеленое с черным. Самка, молодые и самец осенью сверху серовато-бурые, с широкими продольными пестринами, снизу грязно-белые, с темными крапинами на зобе и груди. *Г.* У самцов дребезжащий свист «фрюююк-фрююк». Самки крякают. *От.* В отличие от трескунка, зеркальце зеленое. *Б.* Мелкие внутренние водоемы, особенно в лесу. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—10 белых яиц.

52. Чирок-клоктун — Anas formosa Georgi

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Мелкая утка. Держится в одиночку, парами и стайками. Окраска самца яркая: на голове зеленое полулунное пятно и два желтых пятна, разделенных черной полоской. Грудь розоватая, с темными пятнышками, бока серые, спина бурая, зеркальце на крыле зеленое, с черным и фиолетовым. Самка, молодые и самец осенью сверху темно-бурые, со светлыми пестринами, снизу охристо-буроватые, с беловатым брюшком. *Г.* У самцов глухое «клоон-клоон». Самки крякают. *От.* В отличие от других чирков, величина бóльшая, довольно толстая шея, зеркальце фиолетово-зелено-черное. *Б.* Мелкие лесные водоемы и острова в дельтах рек. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 6—9 белых с зеленоватым и сероватым оттенком яиц.



53. Чирок-трескунок — Anas querquedula L.

В. Значительно мельче утки. *ОП.* Мелкая утка. Держится парами, в одиночку и стайками. Окраска самца весной яркая: голова коричневая, с белой полосой от глаза к затылку, спина, грудь и зоб бурые, с темным рисунком, брюшко белое, бока и крылья серые, зеркальце на крыле зеленовато-серое, без блеска. Самка, молодые и самец осенью сверху темно-бурые, с широкими темными продольными пестринами, снизу грязно-белые, с темными крапинами. Зеркальце на крыльях серое. У самца плечи голубоватые. *Г.* У самцов трескучее «крерр-крерр». Самки звонко крякают. *От.* В отличие от свистунка, зеркальце серое. *Б.* Различные водоемы с богатой водной растительностью. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—10 белых с палевым или буроватым налетом яиц.





54. Белоглазый нырок — Aythya nyroca Güld.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Небольшая утка. Держится парами и стайками. Самец сверху темного серо-бурого цвета, голова, шея и грудь каштаново-рыжие, брюшко белое. У самки вместо каштановых тонов буроватые, брюшко сероватое. Глаза у взрослых птиц белые. *Г.* Грубый, каркающий звук. *От.* В отличие от чернетей и нырка Бэра, голова каштана-

новая. *Б.* Озера с богатой водной и прибрежной растительностью. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 7—11 желтовато-белых яиц.



55. Нырок Бэра — Aythya baeri Radde

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Небольшая утка. Держится парами и стайками. Самец сверху темно-бурый, голова черная, зоб и грудь каштановые, брюшко белое, на крыле белое зеркальце. У самки вместо черного и каштанового цвета тускло-бурый. *Г.* Не описан. *От.* В отличие от белоглазого нырка, голова черная. *Б.* Небольшие озера с богатой водной растительностью. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—10 зеленовато-серых яиц.

56. Красноголовый нырок — Aythya ferrina L.

В. С утку. *ОП.* Довольно крупная утка. Держится в одиночку, парами и стаями. Самец серый, голова и шея красно-коричневые; зоб, грудь, зашеек и подхвостье черные. У самки и селезня осенью вместо красно-коричневого цвета рыжевато-бурый, зоб и грудь буроватые, клюв серовато-голубой, с черным концом. *Г.* Хриплое «кэрр-р-ра». Весной самец издает свистящий звук. *От.* В отличие от чернетей, голова красноватая. *Б.* Реки и озера с зарослями тростников. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на поваленном тростнике у воды. В кладке 6—9 желтовато-голубоватых яиц.

57. Гоголь — Bucephala clangula L.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Средней величины утка. Держится парами, в одиночку и стаями. Хорошо ныряет. У самца голова, крылья и подхвостье черные. Весь низ тела, широкая полоса на плечах и пятно на голове около клюва белые. У самки, молодых и самца осенью вместо черного цвета серовато-бурый, на плечах нет белой полосы. *Г.* Хриплое «кра-кра». *От.* В отличие от чернетей, в основании клюва белое пятно, зоб белый. *Б.* Лесные реки и озера. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—11 зеленовато-голубых яиц.



58. Морянка — Clangula hyemalis L.

В. Несколько меньше утки. *ОП.* Утка средней величины. Держится парами и стаями на открытой воде. У самца длинный шиловидный хвост. Окраска самца весной и летом контрастная — черно-белая, на спине и плечах ржавые полосы. У самки вместо черного цвета серовато-бурый, хвост короткий. *Г.* Далеко слышный на воде громкий и звонкий «о-а-аулы... о-а-аулеу». *От.* В отличие от шилохвости, окраска черно-белая. *Б.* Озера у северной границы тайги (основное местообитание — тундра). *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 6—8 серовато-белых яиц.





59. Хохлатая чернеть — Aythya fuligula L.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Средних размеров утка. Держится стаями и парами. Хорошо ныряет. У самца голова, спина, шея и зоб черные, с фиолетовым отливом, на голове хохол, брюхо и бока белые. У самки и селезня осенью вместо черного цвета серовато-бурый. *Г.* Самцы издают тихие звуки «глю-глю» или «курлюкрлюк». Голос самок — грубое, хриплое «кэрр-кэрр». *От.* В отличие от морской чернети, спина черная. *Б.* Озера и широкие поймы рек лесной полосы. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—11 оливково-белых яиц.



60. Морская чернеть — Aythya marilla L.



В. Несколько мельче утки. *ОП.* Средних размеров утка. Держится стаями и парами. Хорошо ныряет. У самца голова, шея и зоб черные, спина пепельно-серая, брюхо и бока белые. Самка и селезень осенью сверху буровато-серые, брюшко грязно-белое, вокруг клюва беловатое кольцо, голова, шея и грудь буро-серые. *Г.* Громкое, грубое «карр». *От.* В отличие от хохлатой чернети, спина серая. *Б.* Проточные, богатые растительностью озера. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 6—9 серовато-оливковых яиц.

61. Турпан — Melanitta fusca L.

В. С утку. *ОП.* Крупная темная утка. Держится в одиночку, парами и стаями. Хорошо ныряет. У плавающей птицы шея втянута в плечи. Самец черный, на крыле большое белое зеркальце. Клюв оранжевый, вздутый у основания. Самка и молодые серовато-бурые, более светлые снизу, клюв серовато-бурый. *Г.* Глухое «краакра». *От.* В отличие от синьги, зеркальце белое. В отличие от горбоносого турпана, шишка на основании клюва меньше. *Б.* Лесные и горные озера. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 6—10 сливочно-белых яиц.

62. Горбоносый турпан — Melanitta deglandi Bp.

В. Несколько крупнее утки. *ОП.* Крупная темная утка. Хорошо ныряет. Поднимается с воды с трудом и летит долгое время низко. Самец черный, с белым пятном под глазом и на крыльях, клюв оранжевый, с черным вздутием у основания. Самка и молодые темно-бурые, с более светлым брюхом и белыми пятнами около клюва, за глазом и на крыльях, клюв бурый. *Г.* Глухое «краакраа». *От.* В отличие от обыкновенного турпана, у самца на клюве черное вздутие, у самца и молодых бока более светлые. *Б.* Озера в горной тундре и альпийском поясе гор. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 10—14 палево-охристых яиц.



63. Тихоокеанская синьга — Melanitta americana Swains.

В. С утку. *ОП.* Крупная темная утка. Держится стаями, парами и в одиночку. Самец сплошь черный. На клюве посредине оранжевая полоса. Самка и молодые темно-бурые. *Г.* Самцы издают звуки, напоминающие «стрюк-люк». Самки хрипло крякают. *От.* В отличие от турпанов, на крыльях нет белого оперения. *Б.* Лесные озера. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—9 бледно-желтоватых яиц.



64. Каменушка — Histrionicus histrionicus L.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Средней величины утка. Держится парами и стаями. Хорошо ныряет. Самец темного аспидно-серого цвета, бока ржаво-рыжие. Самка и молодые темно-бурые, с белыми пятнышками на голове *Г.* У самцов хриплое «хе-хе», у самок тихое «эк-эк». *От.* Отличается от других уток своеобразной окраской. *Б.* Горные реки и озера. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3—8 желтовато-белых яиц.

65. Выпь — Botaurus stellaris L.



В. Несколько крупнее утки, но кажется значительно крупнее из-за длинных шеи и ног. *ОП.* Средней величины цапля. Ведет ночной образ жизни. Днем затаивается в тростниках. На шее длинные перья, отчего она кажется по тол-

щине равной туловищу. Ноги длинные, с очень длинными пальцами. При опасности птица вытягивается вверх и замирает. Летает тяжело. В полете видны широкие крылья. Шея у летящей птицы изогнута S-образно. Окраска рыжебурая, с темными продольными и поперечными пестринами. *Г.* Во время полета резкое «кау». Весной издает звуки, напоминающие рев быка. *От.* В отличие от других цапель, шея толстая, окраска рыжая. *Б.* Заболоченные луга, озера, заливы, болота с зарослями тростника. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кочке среди зарослей. В кладке 3—5 глинисто-серых яиц.



66. Большой кроншнеп — Numenius arquata L.

В. С утку. *ОП.* Крупный кулик с длинным, дугообразно изогнутым вниз клювом. Держится парами и стаями. Общая окраска буровато-серая с продольными темными пестринами, широкими на спине и узкими на зобе и груди. Надхвостье и брюхо белые. Очень похож на большого кроншнепа дальневосточный кроншнеп, отличающийся темным надхвостьем. *Г.* Громкое заунывное «фьюууль-фьюууль-уль-уль-уль». *От.* В отличие от среднего кроншнепа, величина бо́льшая. *Б.* Луга и большие лесные болота. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 оливково-зеленых с буровато-серыми пятнами яйца.

67. Средний кроншнеп — Numenius phaeopus L.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Довольно крупный кулик с серповидно изогнутым длинным клювом. Держится в одиночку, парами и стайками. Общая окраска серовато-буроватая с продольными темными пестринами. Брюхо и надхвостье белые. Верх головы темно-бурый, со светлой полосой посредине. Над глазом широкая светлая бровь. *Г.* Грубый протяжный свист «фьюу-ит-фьюу-ить... уль-уль-уль». *От.* В отличие от большого кроншнепа, величина меньшая. *Б.* Берега небольших озер и болота. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 оливково-бурых или голубовато-зеленоватых с бурыми и серыми пятнами яйца.



68. Большая поганка, или чомга — Podiceps cristatus L.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Водоплавающая птица. Хорошо ныряет. Держится почти все время на воде. Ходить по земле не может и передвигается по ней ползком. Взлетает с воды с трудом и долго летит низко. Окраска желтовато-бурая, шея и брюшко белые, на голове «воротник», клюв красноватый. Ноги далеко отставлены назад. Каждый палец окаймлен широкой лопастью. *Г.* Разнообразные звуки вроде «кек-кек», «кьюик», «ккуа». *От.* В отличие от других поганок, величина бо́льшая, весной появляется рыжечерный «воротник». *Б.* Озера и затоны рек с богатой водной растительностью. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на воде, плавающее. В кладке 3—4 зеленовато-белых яйца.





69. Серощекая поганка — Podiceps griseigena Bodd.

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Водоплавающая птица. Верх тела темный, буровато-серый, низ тела белый, щеки и подбородок серые. Весной зоб ржаво-рыжий. Клюв черный, с желтым основанием. Ноги отставлены далеко назад. Каждый палец окаймлен широкой лопастью. *Г.* Негромкое «кек-кек». Весной — громкий крик, напоминающий ржание жеребенка и переходящий в ворчание. *От.* В отличие от чомги, щеки серые, клюв двухцветный. *Б.* Стоячие водоемы



с обильной водной растительностью. *ХП*. Перелетная птица. *Гн*. Гнездо на воде среди растительности. В кладке 4—5 зеленовато-белых яиц.



70. Красношейная поганка — Podiceps auritus L.

В. Значительно мельче утки. *ОП*. Водоплавающая птица. Хорошо ныряет. Держится постоянно на воде. По земле ходить не может. Клюв острый, несколько вздернутый. Верх тела темно-бурый, низ белый. Весной голова черная, с хохлом и большим черным «воротником». От клюва через глаз к затылку тянется широкая рыжая полоса, переходящая в выдающиеся с обеих сторон головы пучки перьев — рожки. Шея красновато-коричневая. Ноги отставлены далеко назад. Каждый палец окаймлен широкой лопастью. *Г*. Негромкое «ек» или «кек». Весной — низкая трель. *От*. В отличие от черношейной поганки, клюв вздернутый, весной шея красно-коричневая. *Б*. Небольшие озера и заводи с богатой водной растительностью. *ХП*. Перелетная птица. *Гн*. Гнездо на воде, реже на берегу. В кладке 4—5 зеленовато-белых яиц.

71. Черношейная поганка — Podiceps nigricollis Brehm

В. Значительно мельче утки. *ОП*. Водоплавающая птица. Хорошо ныряет. По земле ходить не может, а только ползает. Клюв острый, прямой. Верх тела темно-бурый, низ белый. Весной голова черная, с большим «воротником» и хохлом, от глаза к уху тянется пучок золотисто-рыжих перьев. Шея черная. Ноги отставлены далеко назад. Каждый палец окаймлен широкой лопастью. *Г*. Довольно разнообразные звуки вроде «пиипи» или «уип» и трель. *От*. В отличие от красношейной поганки, клюв прямой, весной шея черная. *Б*. Озера, речные протоки и заводи. *ХП*. Перелетная птица. *Гн*. Гнездится колониями. Гнездо на воде. В кладке 4—5 зеленовато-белых яиц.

72. Малая поганка — Podiceps ruficollis Pall.

В. Значительно мельче утки. *ОП*. Мелкая водоплавающая птица. Держится почти все время на воде. Хорошо ныряет. Летает низко над водой. При полете видны белые зеркальца на крыльях. Клюв острый. Общая окраска серовато-бурая, переходящая на

брюшке в белую. Весной горло, щеки и передняя часть шеи рыжевато-коричневые. Ноги отставлены далеко назад. Каждый палец окаймлен широкой лопастью. *Г.* Мелодичное «уит-уит», сливающееся в трель. *От.* От других поганок отличается меньшим размером. *Б.* Мелкие стоячие водоемы с зарослями водных растений. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на воде. В кладке 4—5 беловатых яиц.

ПТИЦЫ ВЕЛИЧИНОЙ С ВОРОНУ



Цветные таблицы VIII-IX



73. Серая ворона —
Corvus cornix L.

В. Общеизвестна. *ОП.* Хорошо заметная, довольно крикливая птица. Держится стаями и парами на деревьях и на земле. Окраска грязно-серая, голова, крылья и хвост черные. *Г.* Хриплое «карр-карр». *От.* В отличие от черной вороны, окраска серая. *Б.* Различные типы леса и поселения человека. *ХП.* Оседлая, кочующая, на севере—перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке обычно 5 зеленовато-голубых с бурыми пятнами яиц.



74. Черная ворона —
Corvus corone L.

В. С ворону. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стаями. Заметная черная птица. *Г.* Хриплое «карр-карр». *От.* От молодого грача на расстоянии почти неотличима. В отличие от большеклювой вороны, клюв более тонкий. *Б.* Лес и поселения человека. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке обычно 5 голубовато-зеленых с бурыми пятнышками яиц.



75. Грач —
Corvus frugilegus L.

В. С ворону. *ОП.* Держится стаями. Окраска сине-черная. У взрослых птиц вокруг клюва голая грязно-белая кожа. *Г.* Хриплое «краа». *От.* В отличие от черной вороны, у взрослых птиц кожа вокруг клюва белая. У молодых это-

го нет, и на расстоянии отличить их от черной вороны почти невозможно. *Б.* Светлые леса и парки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездится колониями. Гнездо на дереве. В кладке 5—6 зеленовато-голубых с бурыми крапинками яиц.



76. Ворон — Corvus corax L.



В. Значительно крупнее вороны. *ОП.* Держится в одиночку, парами и, реже, небольшими группами. Крупная сине-черная птица. В полете виден довольно длинный, клиновидный на конце хвост. *Г.* Громкое «крук-крук» или глухое «кро-кро». *От.* В отличие от вороны и грача, величина бо́льшая. *Б.* Высокоствольный лес и скалы. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на уступе скалы. В кладке 5—6 зеленовато-голубых с бурыми крапинками яиц.

77. Большеклювая ворона — Corvus levaillantii Less.

В. С ворону. *ОП.* Крупная черная птица с несоразмерно толстым клювом. Держится парами и стаями. *Г.* Звонкое «кро-кро» или «кау-кау». *От.* В отличие от черной вороны, клюв большой, толстый. *Б.* Леса и рощи. Зимой — поселения человека. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 5—6 зеленовато-голубых с бурыми крапинками яиц.

78. Черный дятел, или желна — Dryocopus martius L.

В. С ворону. *ОП.* Крупный матово-черный дятел с красной шапочкой на голове. *Г.* Громкое «кли-кли-кли» и гнусавое «кюэээ». *От.* В отличие от других дятлов, величина бо́льшая, окраска черная. *Б.* Высокоствольный лес. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 3—5 белых яиц.



Таблица 9

1. Черная ворона. 2. Большеклювая ворона. 3. Черный дятел, или желна. 4. Грач (взрослый). 5. Грач (молодой). 6. Серая ворона. 7. Ворон.



Таблица 10

1. Болотный лунь (взрослый). 2. Болотный лунь (молодой). 3. Степной лунь. 4. Полевой лунь (самец). 5. Полевой лунь (самка). 6. Пегий лунь. 7. Луговой лунь.







79. Кречет —
Falco gyrfalco L.

В. Значительно крупнее вороны. *ОП.* Крупный сокол. Окраска варьирует от белой до темно-серой. У молодых на груди и брюхе широкие каплевидные пестрины. *Г.* Громкое «кьяк-кьяк-кьяк». *От.* В отличие от других соколов, размер более крупный. *Б.* Скалы и отдельные деревья у северной границы леса. Охотится на открытых пространствах. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на карнизе скалы или на дереве. В кладке 3—4 красновато-рыжих с более темными пятнами яйца. *РОВ.*

80. Сапсан —
Falco peregrinus Tunst.

В. С ворону. *ОП.* Крупный сокол. В полете видны длинные острые крылья и сравнительно короткий и узкий хвост. Сидит «столбиком». Окраска верха тела темная — от сизой до черной. Верх головы и полосы от глаза вниз («усы») черные (у рыжеголового сапсана верх головы рыжий). Низ тела светлый, рыжеватый или белый. Щеки белые. У взрослых птиц снизу редкие поперечные темные полоски, у молодых эти полоски широкие, продольные. *Г.* Громкое «кьяк-кьяк-кьяк». *От.* В отличие от кречета, величина меньшая. В отличие от балобана, окраска более темная, есть резко выраженные «усы». *Б.* Лес, скалы и открытые пространства. *ХП.* Перелетная, на

юге оседлая птица. *Гн.* Гнездо на дереве, уступе скалы или обрыве, реже на земле. В кладке 3—5 рыжевато-бурых с более темными пятнами яиц. *РОВ.*

81. Балобан — Falco cherrug Gray

В. С ворону. *ОП.* Крупный сокол. Окраска верха тела от глинисто-серой до темно-бурой. Низ беловатый, с темными каплевидными пестринами. Под глазом неясные темные «усы». *Г.* Громкое «кеек-кеек-кеек». *От.* В отличие от сапсана, окраска более светлая, «усы» неясно выраженные. *Б.* Лес, скалы, глинистые обрывы. Охотится на открытых местах. *ХП.* На юге оседлая, на севере кочующая и перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве, выступе скалы или обрыве. В кладке 3—5 охристо-буроватых с более темными пятнами яиц. *РОВ.*

82. Болотный лунь — Circus aeruginosus L.

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Довольно крупная хищная птица. В полете заметны широкие заостренные крылья и сравнительно длинный хвост. Летает обычно низко над землей или над тростниками. У взрослой птицы видны светло-сероватые голова, крылья и хвост. Остальное оперение темное, ржаво-бурое. У молодых верх и бока головы желтоватые, остальное оперение темно-бурое. *Г.* Громкое «пийюю-пийюю-пийюю». *От.* В отличие от других луней, белого цвета в оперении нет. *Б.* Луга и заросли близ воды. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 — 5 зеленовато-белых яиц.

83. Полевой лунь — Circus cyaneus L.
Луговой лунь — Circus pygargus L.
Степной лунь — Circus macrourus Gm.
Пегий лунь — Circus melanoleucus Penn.

В. С ворону, но кажутся несколько крупнее благодаря длинным крыльям и хвосту. *ОП.* Средней величины хищные птицы. Крылья сравнительно широкие, длинные, заостренные на концах. Хвост узкий и довольно длинный. Летают обычно низко над землей. Самцы имеют светлую серо-белую окраску. Концы крыльев, а у пегого луня голова, грудь и спина черные. Самки сверху бурые, снизу ржаво-охристые, хорошо заметно белое надхвостье. Молодые похожи на самок, но низ тела у них в продольных бурых пестринках. *Г.* Громкое «цирррь-цирррь». *От.* Хорошо отличимы самцы: у полевого луня верх тела и грудь серые, брюхо белое, концы крыльев черные; у степного луня на крыльях есть еще черная поперечная полоска; луговой лунь более темный, с коричневыми пестринками на боках; у пегого луня голова, спина



Таблица 11

1. Обыкновенный канюк, или сарыч. 2. Ястреб-тетеревятник (взрослый). 3. Ястреб-тетеревятник (молодой). 4. Ястреб-тетеревятник (белая фаза). 5. Ястребиный канюк. 6. Осоед. 7. Хохлатый осоед.



Таблица 12

1. Зимняк, или мохноногий, канюк. 2. Курганник. 3. Орел-карлик. 4. Мохноногий курганник. 5. Красный коршун. 6. Черный коршун.









и зоб черные. Самки и молодые практически в полевых условиях неотличимы. В отличие от болотного луня, надхвостье белое, величина меньшая. *Б.* Открытые пространства, луга с кустарником. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда на земле. В кладке по 4—5 зеленовато-белых яиц, у степного луня с красно-бурыми пятнами.

84. Ястреб-тетеревятник — Accipiter gentilis L.

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Крупный ястреб. У летящей птицы видны короткие округлые крылья и довольно длинный хвост. Держится в одиночку, скрытно. Летает обычно низко, лавируя между деревьями. Садится на дерево в гущу ветвей, обычно около основания ветви. Окраска взрослой птицы сверху серо-сизая, над глазами светлая бровь, низ тела серовато-белый, с тонким поперечным рисунком. Самки более крупные. Молодые птицы сверху темно-бурые, снизу охристо-беловатые, с крупными продольными пестринами. Среди сибирских тетеревятников попадаются светлые, иногда совершенно белые птицы. *Г.* Громкое «гик-гик-гик». *От.* В отличие от канюка и осоеда, крылья короткие, округлые, а хвост сравнительно длинный. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—4 зеленовато-белых со слабо заметными темными пятнами яйца.

85. Обыкновенный канюк, или сарыч — Buteo buteo L.

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Средней величины хищная птица. В полете видны широкие, слегка заостренные крылья с широкой светлой полосой и короткий округлый хвост. Окраска верха темно-бурая, снизу беловатая, с темными продольными и поперечными пестринами. Есть птицы, у которых весь низ тела бурый или с небольшими светлыми пятнами. *Г.* Громкое гнусавое «ки-кия, ки-кия». *От.* В отличие от осоеда, хвост более короткий. *Б.* Гнездится в лесу. Охотится на открытых пространствах. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 2—3 зеленовато-белых с бурыми пятнами яйца.

86. Осоед — Pernis apivorus L.

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Средней величины хищная птица. Во время полета видны длинные широкие крылья и довольно длинный узкий хвост. Окраска двух типов: светлая и темная. Хвост серый, с широкими поперечными темными полосами. *Г.* Короткое звонкое «пи-ия». *От.* В отличие от канюка, хвост и крылья более длинные. (На востоке встречается еще хохлатый осоед. В отличие от обыкновенного осоеда у него на голове хохол из длинных перьев.) *Б.* Высокоствольные леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 2—3 беловатых с каштановыми пятнами яйца.

87. Ястребиный канюк — Butastur indicus Gm.

В. С ворону. *ОП.* Средней величины хищная птица. Обычно виден летающим высоко над лесом или сидящим на высоких сухих деревьях. У летящей птицы видны довольно короткие заостренные крылья и сравнительно короткий хвост. Верх тела буровато-серый, голова несколько светлее. Горло белое, с продольной темной полоской посередине. Низ тела беловатый с широкими бурыми поперечными полосами. *Г.* Громкое «ти-вии-ти-вии». *От.* В отличие от обыкновенного канюка, величина меньшая. *Б.* Лиственный и смешанный лес. Охотится на открытых пространствах. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4 белых яйца.

88. Орел-карлик — Aquila pennata Gm.

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Небольшой орел. У летящей птицы видны широкие крылья, на концах перья пальцеобразно расставлены. Хвост довольно длинный. Окраска двух типов. У птиц светлой окраски спина, крылья и хвост темно-бурые, низ тела охристо-беловатый, с продольными редкими











темными пестринами; у птиц темной окраски все тело темно-бурое, с охристыми пестринами. *Г.* Громкое «кю-кю-кю», «тервить-тервить» и протяжный свист. *От.* В отличие от других орлов, размер меньший. *Б.* Различные типы леса. Охотится на открытых пространствах. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 2 зеленовато-белых с красноватыми крапинками яйца.

89. Зимняк, или мохноногий канюк — Buteo lagopus Pontopp.

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Средней величины хищная птица. Летает, тяжело взмахивая крыльями и часто паря. Иногда «трясется» на одном месте. Часто садится на вершину дерева, стога или столба. В полете кажется почти белой, с темным брюхом, темными полосами на крыльях и хвосте. Крылья широкие, хвост короткий, округлый. Окраска верха тела светлая, белесая, с темными пестринами. *Г.* Громкое «кьяу-кьяу». *От.* В отличие от обыкновенного канюка, величина бóльшая, окраска светлая. *Б.* Тундра и лесотундра, иногда заходит в лес. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле, на уступе обрыва, редко на дереве. В кладке 3—4 грязно-белых с темными пятнами яйца.

90. Курганник — Buteo rufinus Cretzschmar

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Довольно крупная хищ-

ная птица. Во время полета видны широкие длинные крылья со светлыми пятнами. Хвост сравнительно длинный. Окраска верха тела рыжевато-бурая. Низ охристый, с продольными бурыми пестринами. *Г.* Громкое «кей-кей-кей». *От.* Очень похож на мохноногого курганника. Только вблизи видны голые ноги. *Б.* Сухие пространства степного типа. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на скалах, обрывах, реже на деревьях. В кладке 2—5 беловатых с темными пятнами яиц.

91. Мохноногий курганник — Buteo hemilasius Temm. et Schleg.

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Довольно крупная хищная птица. Во время полета видны длинные широкие крылья и довольно длинный хвост. Крылья кажутся белыми, с темной полосой по краю. Хвост светлый, с поперечными темными полосами. Верх тела темно-бурый, низ охристо-беловатый, с большими бурыми пятнами. *Г.* Громкое «кьяй-кьяй-кьяй». *От.* В отличие от курганника, ноги оперенные, что видно только вблизи. *Б.* Сухие горные и равнинные степи. *ХП.* Плохо изучен. Вероятно, кочующая птица. *Гн.* Гнездо на скале или куче камней. В кладке 2—3 охристо-желтых с красновато-бурыми пятнами яйца.

92. Черный коршун — Milvus korschun Gm.

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Средней величины хищная птица. Держится в одиночку, парами и группами. У летящей птицы видны широкие длинные крылья и довольно широкий хвост с вырезкой на конце. Окраска темная, рыжевато-бурая, но голова светло-сероватая. Молодые птицы бурые, с охристыми пестринами. *Г.* Мелодичная трель «юрль-ююррль-ююрррль» и частое «кики-ки». *От.* В отличие от красного коршуна, окраска более темная. *Б.* Различные типы леса, обычно вблизи водоемов. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 2—4 белых с бурыми пятнами яйца.

93. Красный коршун — Milvus milvus L.

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Средней величины хищная птица. Держится в одиночку или парами. У летящей птицы видны широкие длинные крылья и глубокая вырезка на конце хвоста. Общая окраска верха тела темно-бурая, с черными продольными и рыжеватыми поперечными полосками. Голова грязно-беловатая, с темными продольными пестринами. Низ тела ржаво-рыжий, с широкими на груди и узкими на брюхе темными продольными пестринами. *Г.* Громкое «хиияя-хиияя-хиияя» или «хи-хиии». *От.* В отличие от черного коршуна, окраска бо-



Таблица 13

1. Длиннохвостая неясыть. 2. Серая неясыть. 3. Болотная сова. 4. Ушастая сова. 5. Ястребиная сова. 6. Сипуха. 7. Иглоногая сова.



Таблица 14

1. Сизая чайка (взрослая). 2. Сизая чайка (молодая). 3.Малая чайка. 4. Озерная чайка. 5. Озерная чайка (молодая). 6. Малый баклан. 7.Малая выпь.







лее светлая. *Б.* Лиственные и смешанные леса, перемежающиеся открытыми пространствами. *ХП.* На юге оседлая, на севере перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 2—3 белых с бурыми пятнами яйца.

94. Длиннохвостая неясыть — Strix uralensis Pall.

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Крупная светлая сова. У летящей птицы видны широкие длинные крылья и длинный, несколько свисающий хвост. Общий тон окраски охристо-сероватый, низ тела более светлый. На спине светлые и темные пятна. На груди и брюхе продольные темные полоски. Глаза черные. *Г.* Глухое «ху-ху-ху» и «хау-хау». *От.* В отличие от серой неясыти, величина бóльшая, хвост длинный. *Б.* Хвойные и смешанные леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве, реже в дупле. В кладке 3—4 белых яйца.

95. Серая неясыть — Strix aluco L.

В. С ворону. *ОП.* Средней величины сова. У летящей птицы видны широкие длинные крылья и довольно короткий хвост. Общая окраска охристо-сероватая или охристо-рыжая, более светлая на нижней стороне тела. На спине светлые и темные пятна. На груди и брюхе широкие продольные темные пестрины. Глаза черные. *Г.* Громкое «ху-ху-хууу» и короткое «кувит». *От.* В отличие от длиннохвостой неясыти, ве-

чина меньшая. Хвост корот-
й. *Б.* Различные типы леса.
П. Оседлая птица. *Гн.* Гнез-
в дупле или на дереве. В
адке 2—6 белых яиц.

. **Ястребиная сова** —
rnia ulula L.

В. Несколько мельче воро-
. *ОП.* Небольшая сова. Охо-
тся преимущественно днем. В полете видны короткие крылья и
вольно длинный хвост. Летает быстро, бесшумно, часто «тря-
гся» на месте. Окраска верха тела темно-серая, с белыми пят-
ми. Низ тела беловатый, с темным поперечным рисунком. Гла-
желтые. *Г.* Мелодичное «уль-уль-уль» и громкое «ки-ки-ки».
п. В отличие от других сов, крылья относительно короткие,
ост длинный. В полете напоминает ястреба. *Б.* Смешанная и
ойная тайга. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на
реве. В кладке 3—4 белых яйца.

. **Болотная сова** — Asio flammeus Pontopp.

В. Несколько мельче вороны. *ОП.* Средней величины сова.
ержится на земле и почти никогда не садится на деревья. Иног-
летает днем. В полете видны длинные широкие крылья и до-
льно короткий хвост. Общая окраска охристо-рыжеватая, брю-
белое. По всему телу разбросаны продольные темные пестрины.
учки перьев на голове — «уши» — очень маленькие. Глаза желт-
ые. *Г.* Глухое «бу-бу-бу» и «кьяв-кьяв». *От.* В отличие от ушас-
ой совы, «уши» короткие. *Б.* Открытые пространства с кустарни-
ом. *ХП.* Перелетная, кочующая, местами оседлая птица. *Гн.*
ездо на земле. В кладке 3—5 белых яиц.

. **Ушастая сова** — Asio otus L.

В. Несколько мельче вороны. *ОП.* Средней величины сова.
летящей птицы видны широкие длинные крылья и довольно
роткий хвост. Общая окраска охристо-рыжевато-серая, с про-
льными темными пестринами. На голове длинные пучки перь-
— «уши». Глаза оранжево-красные. *Г.* Глухое «ху-хууу».
п. В отличие от болотной совы, «уши» длинные. *Б.* Различные
ипы леса. *ХП.* Кочующая, а местами оседлая птица. *Гн.* Гнездо
дереве, реже в дупле. В кладке 4—5 белых яиц.



99. Иглоногая сова — Ninox scutulata Raffles

В. Несколько мельче вороны. *ОП.* Средней величины сова со слабо выраженным лицевым диском. У летящей птицы видны длинные, широкие, бледно-бурые, с черными поперечными полосами крылья и довольно короткий хвост. Спина темно-бурая. Низ тела беловатый, с широкими продольными бурыми пестринами. Ноги покрыты мелкими иголочками. Глаза желтые. *Г.* Громкое «хуху». *От.* В отличие от других сов, «лицо» слабо выражено, ноги покрыты иголочками. *Б.* Смешанные и лиственные леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 2—4 белых яйца.





100. Сипуха — Tyto alba Scop.

В. Несколько мельче вороны. *ОП.* Средней величины сова с характерным треугольным лицевым диском. Окраска верха тела светло-серая, с мелкими черноватыми и белыми пестринами. Низ тела светлый, золотисто-рыжеватый. Хвост рыжий, с серыми поперечными полосами. Лицевой диск грязно-белый. *Г.* Своеобразное шипение. *От.* В отличие от других сов, лицевой диск треугольной формы. *Б.* Парки и рощи в поселках и городах или около них. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле или в нише здания. В кладке 4—8 белых яиц.

101. Сизая чайка — Larus canus L.

В. С ворону. *ОП.* Средней величины чайка. Держится парами и стайками около водоемов или на вспаханных полях. Общая окраска белая. Спина и плечи сизые, концы крыльев черные. Клюв и ноги желтые. Молодые птицы буровато-серые. *Г.* Громкое «каа-каа». *От.* В отличие от озерной чайки, голова белая. *Б.* Озера и крупные реки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездится часто небольшими колониями. Гнездо обычно на каком-нибудь возвышении. В кладке 2—3 серовато-оливковых с темными пятнами яйца.

102. Озерная чайка — Larus ridibundus L.

В. С ворону. *ОП.* Средней величины чайка. Держится обычно группами, летая над рекой или озером, иногда кормится на вспаханных полях. Общая окраска белая. Спина сизо-серая, крайние перья крыла черные, причем на первых трех большие белые пятна. Голова бурая. У молодых птиц голова белая, с темными пятнами по бокам, на конце хвоста поперечная темная полоса. Клюв и ноги у взрослых птиц красные, у молодых буроватые. На озерную чайку очень похожа живущая на озерах Памира буроголовая чайка. *Г.* Громкие крики «киаа-киаа», «кья-кья» и короткое «кек-кек». *От.* В отличие от сизой чайки, голова бурая. *Б.* Озера и реки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездится колониями. Гнездо на земле. В кладке обычно 3 грязно-зеленых с темными пятнами яйца.

103. Малая чайка — Larus minutus Pall.

В. Несколько мельче вороны. *ОП.* Мелкая чайка. Общая окраска белая. Голова и концы крыльев черные. Спина и плечи сизо-серые. На черных концах крыльев белые пятна. Клюв черный. Ноги у взрослых птиц красные, у молодых буроватые. *Г.* Громкое протяжное «кааа-кааа» или короткое «кек-кек». *От.* В отличие от озерной чайки, голова черная. *Б.* Озера и реки с заболоченными, заросшими берегами. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездится колониями. Гнездо на земле. В кладке 2—3 оливково-зеленоватых с красно-бурыми и черными пестринами яйца.

104. Малая выпь, или волчок — Ixobrychus minutus L.

В. Несколько мельче вороны. *ОП.* Мелкая цапля. Ведет сумеречный и ночной образ жизни. У самца верх головы, спина и крылья блестяще-черные. Остальное оперение рыжевато-желтое, такого же цвета широкие полосы на плечах. По бокам груди красновато-бурые полоски. У самок и молодых вместо черного цвета рыжевато-бурый. *Г.* Резкое и быстрое «ке-ке-кек». Весной самец издает глухое «пумб» или «прумб» и «буэх». *От.* В отличие от большой выпи, размер меньше. *Б.* Озера, речные заводи и старицы с зарослями тростника и ивы. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кустах, тростнике или на дереве, невысоко над землей. В кладке 4—9 белых с зеленоватым оттенком яиц.







105. Малый баклан — Phalacrocorax pygmaeus Pall.

В. С ворону. *ОП.* Средней величины темная птица с довольно тонкой и длинной шеей. Держится в одиночку, парами и стайками. Во время полета шея вытянута. Хвост довольно длинный. Сидит вертикально, часто с распущенными крыльями. Окраска спины темно-коричневая. Нижняя часть тела черная, с мелкими белыми пятнышками. *Г.* Глухое карканье. *От.* В отличие от боль-



шого баклана, размер меньше. *Б.* Богатые рыбой водоемы с густой прибрежной растительностью. *ХП.* Кочующая и перелетная птица. *Гн.* Гнездо среди тростника или на дереве. В кладке 4—6 белых с зеленоватым оттенком яиц.

106. Белая куропатка — Lagopus lagopus L.

В. С ворону. *ОП.* Небольшая курочка. Держится парами и стайками. Взлетает с громким криком. Окраска летом рыжевато-коричневая, с поперечными темными полосами. Крылья и брюхо белые. Зимой все оперение снежно-белое, крайние перья хвоста черные. *Г.* Громкий крик, напоминающий хохот или лай собаки. *От.* В отличие от тундряной куропатки, летом окраска рыжеватая, зимой нет черной полоски от клюва к глазу. *Б.* Разреженная тайга, лесотундра и лесостепь. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 14—15 желтоватых с черными и коричневыми пятнышками яиц.

107. Тундряная куропатка — Lagopus mutus Montin

В. Несколько мельче вороны. *ОП.* Небольшая курочка. Держится парами, в одиночку и стайками. Окраска летом охристо-серая, с темными поперечными полосками и белыми крыльями. Зимой окраска снежно-белая, полоска от глаза к клюву и крайние перья хвоста черные (у самки полоски у глаза не бывает). *Г.* Хриплый крик, напоминающий сухой кашель. *От.* В отличие от белой куропатки, величина меньшая, летом окраска серая, зимой у глаз черные полосы. *Б.* Сухая горная тундра. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3—12 беловатых или охристо-буроватых с шоколадно-бурыми пятнами яиц.

108. Дикуша — Falcipennis falcipennis Hartl.

В. Несколько мельче вороны. *ОП.* По общему облику напоминает небольшую курочку. Очень скрытная и молчаливая птица. Совершенно не боится человека, подпускает к себе вплотную. Взлетев, тут же садится на дерево. У самца окраска темная, с белыми пятнами на спине и белым поперечным рисунком на груди, на хвосте белая полоса. Самка и молодые буровато-серые, с поперечными темными пестринами. *Г.* Весной самец издает своеобразное двойное щелканье и протяжное «у-у-ур-рр». *От.* В отличие от рябчика, величина бо́льшая, окраска темная. *Б.* Глухие участки тайги с ягодниками. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Не изучено. *РОВ.*



109. Рябчик — Tetrastes bonasia L.

В. Несколько мельче вороны. *ОП.* Напоминает небольшую курочку. На голове хохолок. Скрытная птица. Вылетает с сильным шумом и летит в гущу леса. Часто садится на деревья. Общая окраска буровато-серая, более светлая снизу. На спине тонкие поперечные темные полоски, на плечах рыжеватые и беловатые пятна. Бока рыжие. Весь низ тела в крупных бурых пятнах. У самца горло черное. *Г.* Тонкий, протяжный свист. *От.* В отличие от дикуши, величина меньшая, окраска более светлая. *Б.* Еловые и смешанные леса, часто по берегам речек. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—10 буровато-желтых с красно-бурыми пятнышками яиц.

110. Кеклик — Alectoris kakelik Falck

В. С ворону. *ОП.* Небольшая курочка. Держится обычно стайками или парами. Виден чаще всего перебегающим по склонам или по камням осыпи. Окраска пепельно-серая, с розовым оттенком, на горле светлое пятно, окаймленное черной, идущей к глазам и лбу полосой, на боках поперечные черные, коричневые и белые полосы. Клюв, ноги и кольцо вокруг глаза красные. *Г.* Громкое «кок-когок-когок-кок-кок». *От.* В отличие от других куропаток, по бокам черные полосы. *Б.* Сухие степные участки гор с осыпями и скалами. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 10—24 глинисто-охристых с неясными коричневатыми пятнышками яйца.

ПТИЦЫ
ВЕЛИЧИНОЙ С ГОЛУБЯ ИЛИ ГАЛКУ



Цветные таблицы X — XV



111. Пустынная куропатка — Ammoperdix griseogularis Br.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Маленькая курочка. Держится стайками и парами. Обычно видна перебегающей по склонам или по скалам, перескакивающей и перелетающей с камня на камень. Окраска глинисто-розовая. У самца через глаз идут черная и светлая полоски, на боках тела ржаво-коричневые поперечные полоски. У самок и молодых нет черной полосы над глазом. *Г.* Негромкий свист и звонкое «квак-квак-квак». *От.* В отличие от кеклика, размер меньше. *Б.* Пустынные и полупустынные участки невысоких гор с выходами скал и осыпями. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—12 желтовато-охристых яиц.



112. Серая куропатка — Perdix perdix L.

В. С голубя. *ОП.* Небольшая курочка. Держится парами и стайками. Окраска пепельно-серая с тонким, более темным струйчатым рисунком. Бока головы и горло рыжие. Боковые перья хвоста ржаво-коричневые. Брюхо белое, у самца иногда и у самки на нем большое бурое пятно. *Г.* Громкое «чир-гик». *От.* В отличие от бородатой куропатки, на брюхе бурое пятно, на груди охристого цвета нет. *Б.* Лесостепные участки на равнине и в горах. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 14—24 охристо-оливковых яйца.



113. Бородатая, или даурская, куропатка — Perdix daurica Pall.



В. С голубя. *ОП.* Небольшая курочка. Держится парами и стайками. Общий тон окраски буровато-серый, с тонким струйчатым рисунком. Бока головы, горло, середина груди и зоба охристые. На брюхе большое черное пятно (иногда его не бывает). По бокам головы у основания клюва длинные перья — борода. *Г.* Негромкое «чир-гик», как и у серой куропатки. *От.* В отличие от серой куропатки, на брюхе черное пятно, грудь охристая. *Б.* Безлесные склоны гор, поросшие кустарником. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 16—20 зеленовато-серых яиц.

114. Саджа, или копытка — Syrrhaptes paradoxus Pall.

В. С голубя. *ОП.* Небольшая, с короткими ногами птица. Держится стаями. У летящей птицы видны очень длинные узкие острые крылья и довольно длинный заостренный хвост. Общая окраска желтовато-глинистая, брюшко черное, на спине черные пестрины. У самца лоб, горло и бока головы рыжие, верх головы и шеи серый, поперек груди идет широкая белая с черными поперечными пестринами полоса. *Г.* Негромкое «трюк-ти-трюк» или «как-кек». *От.* В отличие от белобрюхого рябка, брюхо черное, в отличие от чернобрюхого рябка, хвост длинный. Кроме того, у саджи сросшиеся пальцы на ногах, чего нет у других рябков. *Б.* Степи и полупустыни. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3 глинисто-серых с коричневатыми или светло-серыми пятнами яйца.

115. Тибетская саджа — Syrrhaptes tibetanus Gould

В. Несколько крупнее голубя. *ОП.* Птица с очень короткими ногами. Держится маленькими стаями. В полете видны длинные острые крылья и заостренный хвост. Окраска верха тела песчано-серая. Бока шеи рыжие, брюхо белое. На голове, спине и зобе черные тонкие поперечные полоски. *Г.* Довольно громкое «уак-уак-кага» или «гок-гок». *От.* В отличие от обыкновенной саджи, размер крупный. *Б.* Высокогорные полупустыни. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3 буроватых с темными пятнами яйца. *РОВ.*



Таблица 15

1. Скалистый голубь. 2. Белогрудый голубь. 3. Бурый голубь. 4. Сизый голубь. 5. Клинтух. 6. Вяхирь.



Таблица 16

1. Горлица. 2. Кольчатая горлица. 3. Большая горлица. 4.Малая горлица. 5. Речная крачка.











116. Чернобрюхий рябок — Pterocles orientalis L.

В. С голубя. *ОП.* Птица с короткими ногами. Держится стаями. Во время полета видны длинные острые крылья и заостренный хвост. Общая окраска желтовато-серая, с мелкими черными пятнами на спине. Брюхо черное. *Г.* Громкое «тчурр-тчурр». *От.* В отличие от саджи, хвост более короткий. *Б.* Щебнистые пустыни и полупустыни. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3 светло-серых или оливковых яйца.

117. Белобрюхий рябок — Pterocles alchata L.

В. С голубя. *ОП.* Птица с короткими ногами. Держится стаями. Во время полета видны длинные заостренные крылья и острый хвост. Верх тела серовато-глинистый, с желтыми пятнами. Шея и бока головы желтые. Грудь и зоб розовато-рыжие, окаймленные сверху и снизу черными полосами. Брюхо белое. У самца черное горло. *Г.* Громкое «га-га» или «га-нг». *От.* В отличие от чернобрюхого рябка и саджи, брюхо белое. *Б.* Глинистые пустыни и полупустыни. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3 желтоватых с коричневыми и серыми пятнами яйца.

118. Галка — Coloeus monedula L.

В. Общеизвестна. *ОП.* Хорошо заметная, довольно крикливая птица. Держится стаями,

часто вместе с воронами и грачами. Окраска тела черная. Верх головы и шеи серый. У взрослых птиц белые глаза. *Г.* Звонкое «каа-каа» или «кэээ-кэээ». *От.* В отличие от даурской галки, нет белого оперения. *Б.* Редкие леса и рощи, города и поселки. *ХП.* На юге оседлая, на севере перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле, норе, под крышей дома, в трубе, трещине скалы. В кладке 4—6 голубовато-зеленых с бурыми пятнами яиц.



119. Даурская галка — Coloeus davuricus Pall.

В. С галку. *ОП.* Хорошо заметная, довольно крикливая птица. Держится стайками. Окраска головы, крыльев и хвоста черная. Остальное оперение белое. Встречаются птицы сплошь черные или с белым верхом шеи. *Г.* Звонкое «каа-каа». *От.* В отличие от галки, есть белое оперение. Однако есть птицы, совершенно неотличимые от обыкновенной галки. *Б.* Леса с обилием дуплистых деревьев и открытые пространства с обрывами и скалами. *ХП.* Не выяснен. Вероятно, перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 6 голубовато-зеленых с бурыми пятнышками яиц.

120. Голубая сорока — Cyanopica cyana Pall.

В. Несколько мельче галки. *ОП.* Хорошо заметная, довольно крикливая птица. Держится парами и стайками. Хвост очень длинный, ступенчатый. Спина и плечи буровато-серые, на голове черная шапочка, крылья и хвост голубые, кончик хвоста и весь низ тела белые. *Г.* Громкое «чиииль-чиль-чиль». *От.* В отличие от сороки, величина меньшая, хвост голубой. *Б.* Леса по речным долинам. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо невысоко на дереве. В кладке 3—7 серовато-голубоватых с темными крапинками яиц.

121. Сорока — Pica pica L.

В. Несколько крупнее галки. *ОП.* Хорошо заметная, черно-белая, с длинным хвостом птица. Полет тяжелый, волнистый, с частыми взмахами коротких округлых крыльев. У сидящей птицы часто вздергивается и покачивается хвост. Голова, спина, крылья и хвост черные. Брюхо, грудь и полоса на плечах белые. *Г.* Резкое стрекотание. *От.* Длинный ступенчатый хвост и характерная черно-белая окраска отличают







сороку от других птиц. *Б.* Разреженные, светлые леса, лесостепь и заросли кустарников. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на кусте или на дереве. В кладке 5—7 голубовато-зеленых с бурыми крапинками яиц.

122. Кедровка —
Nucifraga caryocatactes L.

В. С галку. *ОП.* В гнездовое время скрытная и малозаметная птица, в остальное время очень шумлива и хорошо заметна. Держится парами и стаями. Окраска темная, каштаново-бурая, с частыми белыми пятнышками. Шапочка на голове, крылья и хвост черные. На конце хвоста поперечная белая полоска. *Г.* Хриплое протяжное «рэээж-рэээж» или «крэй-крэй». *От.* Своеобразная окраска не позволяет спутать кедровку с другими птицами. *Б.* Хвойная тайга. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—5 зеленоватых с темными крапинками яиц.

123. Клушица —
Pyrrhocorax pyrrhocorax L.

В. Несколько крупнее галки. *ОП.* Держится стаями. Крылья довольно длинные, а хвост сравнительно короткий. Вся птица черная. Клюв и ноги красные. *Г.* Звонкое «клиаа-клиаа». *От.* В отличие от альпийской галки, клюв красный. *Б.* Открытые пространства гор со скалами. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в трещинах скал. В кладке 3—9 серовато-желтых или зеленоватых с темными крапинками яиц.

124. Альпийская галка — Pyrrhocorax graculus L.



В. Несколько крупнее галки. *ОП.* Держится обычно большими стаями. Во время полета заметны довольно длинные крылья и хвост. Общая окраска матово-черная. Клюв желтый, ноги красные. *Г.* Негромкое «кири-кири» и звонкое «криаа». *От.* В отличие от клушицы, клюв желтый. *Б.* Открытые пространства верхнего пояса гор со скалами. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в трещинах скал. Кладки в СССР не найдены.

125. Сойка — Garrulus glandarius L.

В. С галку. *ОП.* Подвижная, довольно шумливая птица. Во время насиживания яиц очень скрытная. Держится обычно стайками на деревьях и земле. Общая окраска рыжевато-серая. Подхвостье, надхвостье и полоска на крыле белые. Крылья и хвост черные. На сгибе крыла яркие голубые с черными полосками перья. На голове хохол, который у обыкновенной сойки светлый, с черными пестринами, у кавказской и крымской — черный, а у сибирской — ярко-рыжий. *Г.* Грубое «чжээ-чжээ». Самцы поют, подражая голосам других птиц. *От.* В отличие от кукши, величина бóльшая, надхвостье белое, на крыльях голубые перья. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 5—7 зеленоватых с бурыми пятнами яиц.

126. Кукша — Perisoreus infaustus L.

В. Несколько мельче галки. *ОП.* Молчаливая подвижная птица. Держится на деревьях и на земле. Летает тяжело. Общая окраска буровато-серая, с охристым налетом. На голове темно-бурый хохол. Боковые перья хвоста рыжие. *Г.* Громкое «кжэээ-кжээ» и набор низких свистов. *От.* В отличие от сойки, окраска однотонная. *Б.* Хвойная тайга. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—5 зеленовато-серых с серыми и фиолетово-серыми крапинками яиц.

127. Синяя птица — Myophonus coeruleus Scop.

В. Несколько мельче галки. *ОП.* Держится в одиночку и парами у воды. Часто поднимает и медленно опускает распущенный хвост, поводя им из стороны в сторону. Издали кажется черной. Окраска темная лилово-синяя. Крылья и хвост темно-синие. На груди и зобе серебристо-сероватые пятна. *Г.*











Громкое резкое «дзжжжи». Песня — набор громких красивых свистов. *От.* В отличие от черного дрозда, размер крупный. *Б.* Ущелья и теснины со скалами и водопадами. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на скале, возле воды. В кладке 4—5 голубовато-белых с неясными бурыми крапинками яиц.

128. Зеленый дятел — Picus viridis L.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Довольно крупный дятел. Спина желто-зеленая, низ тела зеленовато-белый. Верх головы и полоски над клювом — «усы» — красные, у самки «усы» черные. *Г.* Громкое гнусавое «киэй-кэй-кэй». *От.* В отличие от седого дятла, верх головы красный. *Б.* Лиственные леса. *ХП.* Оседлая, отчасти кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—9 белых яиц.

129. Седой дятел — Picus canus Gm.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Средней величины дятел. Спина серовато-зеленая, низ тела сероватый, с зеленым оттенком. Голова серая, на лбу и темени у самца красное пятно. *Г.* Громкий крик «кияйкияай». *От.* В отличие от зеленого дятла, голова серая. *Б.* Широколиственные леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—7 белых яиц.

130. Чешуйчатый дятел — Picus squamatus Vig.



В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Довольно крупный дятел. Спина желто-зеленая, низ тела беловато-зеленоватый с чешуйчатым бурым рисунком на груди и брюхе. Верх головы красный, окаймленный с боков черными полосками. *Г.* Громкое «ти-тию» или «клю-клю». *От.* В отличие от зеленого дятла, низ тела имеет чешуйчатый рисунок. *Б.* Лиственные пойменные леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 3—6 белых яиц. *РОВ.*

131. Сизый голубь — Columba livia L.

В. С домашнего голубя. *ОП.* Средней величины голубь. Окраска голубовато-серая. Надхвостье белое. Широкая полоса на конце хвоста и поперечные полосы на крыльях черные. У летящей птицы видны белые перья под крыльями. *Г.* Негромкое воркование. *От.* В отличие от скалистого голубя, на хвосте нет белой поперечной полосы. *Б.* Скалы, обрывы и каменные постройки. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в нише обрыва скалы и построек. В кладке 2 белых яйца.

132. Белогрудый голубь — Columba leuconota Vig.

В. С сизого голубя. *ОП.* Средней величины голубь. Держится парами и стаями. Голова сизая. Спина, крылья и хвост буровато-серые. Шея, надхвостье, неясная полоса поперек хвоста и весь низ тела белые. *Г.* Негромкое воркование. *От.* В отличие от сизого голубя, низ тела белый. *Б.* Скалы верхнего пояса гор. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в нише или щели скалы. В кладке 2 белых яйца. *РОВ.*

133. Скалистый голубь — Columba rupestris Pall.

В. С сизого голубя. *ОП.* Средней величины голубь. Держится стаями. Окраска сизая, более темная на голове и шее, где отливает зеленым и красным блеском. Надхвостье и широкая полоса поперек основания хвоста белые. Полосы на крыльях и широкая полоса на конце хвоста черные. *Г.* Негромкое воркование. *От.* В отличие от сизого голубя, на хвосте белая полоса. *Б.* Скалы и каменные постройки. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в нише или трещине скалы. В кладке 2 белых яйца.







134. Бурый голубь —
Columba eversmanni Bp.

В. С сизого голубя. *ОП.* Средней величины голубь. Держится стаями. Окраска серо-сизая, с буроватым налетом. Надхвостье белое. На крыльях черные полосы. На конце хвоста широкая черная полоса. Перья под крылом темные. *Г.* Глухое «уу-ууу-уу». *От.* В отличие от сизого голубя, под крылом темные перья. *Б.* Рощи, сады, обрывы и постройки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дуплах деревьев, в нишах и трещинах обрывов. В кладке 2 белых яйца.

135. Клинтух —
Columba oenas L.

В. С сизого голубя. *ОП.* Держится парами, осенью — стаями в лесу и на полях. Окраска светлая, голубовато-серая. Полоса на конце хвоста и пятна на плечах черные. *Г.* Глухое «ху-хуууу». *От.* В отличие от сизого голубя, надхвостье серое. *Б.* Высокоствольный лес. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле или на дереве. В кладке 2 белых яйца.

136. Вяхирь —
Columba palumbus L.

В. Значительно крупнее домашнего голубя. *ОП.* Крупный голубь. Держится парами, осенью — стаями на полях. Общая окраска голубовато-серая. Грудь и брюхо винно-розовые. Полосы на крыльях, по краям

хвоста и полукольцо на шее белые. На конце хвоста широкая поперечная черная полоса. *Г.* Глухое «куу-кру-кухууу». *От.* В отличие от других голубей, размеры крупные. *Б.* Высокоствольный лес. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 2 белых яйца.



137. Горлица — Streptopelia turtur L.
Большая горлица — Streptopelia orientalis Lath.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Мелкие голуби. Держатся парами, в конце лета и осенью — стаями. Кормятся на земле. Спина рыжевато-коричневая, с широкими бурыми пестринами. Хвост и крылья сизо-черные, полосы по краям хвоста и брюхо белые. Оперение груди серовато-розовое. По бокам шеи пятна из чередующихся белых и черных перьев. *Г.* Звонкое «курр-куукуррр». *От.* Друг от друга в полевых условиях практически неотличимы; большая горлица несколько крупнее. *Б.* Светлые леса. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 2 белых яйца.

138. Кольчатая горлица — Streptopelia decaocto Frivald.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Мелкий голубь. Общая окраска светло-палевая, на шее черный «ошейник», не сходящийся спереди. На хвосте большие белые пятна. *Г.* Громкое «куу-кругуу» и звук, напоминающий смех человека. *От.* В отличие от малой горлицы, на шее имеется черный ошейник. *Б.* Сады и парки около городов и поселков. В последнее время расселяется по крупным населенным пунктам европейской части СССР. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 2 белых яйца.

139. Малая горлица — Streptopelia senegalensis L.

В. Значительно мельче голубя. *ОП.* Мелкий голубь. Держится парами и стаями. Окраска довольно темная, буровато-розовая. Брюхо и пятна по бокам хвоста белые. По бокам шеи по небольшому черному пятну. *Г.* Звонкое «кху-кхукуукууу». *От.* В отличие от кольчатой горлицы, величина меньшая, окраска темная. *Б.* Поселения человека. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в нише или



щели постройки, иногда на дереве. В кладке 2 белых яйца.

140. Речная крачка — Sterna hirundo L.

В. Несколько мельче галки. *ОП.* Похожа на маленькую чайку. Крылья длинные, острые, хвост на конце глубоко вырезан. Обычно видна у воды. Окраска сверху светло-серая, снизу белая. На голове черная шапочка, заходящая на шею. Клюв красный, с черным концом, ноги красные. Осенью лоб белый, клюв черноватый, ноги бурые. *Г.* Громкое звонкое «криа-крриа» и «кик-кик». *От.* В отличие от других чаек, размер меньше. *Б.* Озера и реки обычно с песчаными берегами. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездится часто колониями. Гнездо на земле. В кладке 2—3 буровато-желтоватых или зеленовато-оливковых с бурыми пятнами яйца.

141. Камышница — Gallinula chloropus L.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Хорошо плавает. Во время плавания хвост поднят вертикально вверх. Окраска темная, голова и грудь матово-черные, спина и крылья черно-буроватые, подхвостье и полоса на боку белые. На лбу красная «бляшка», ноги зеленоватые. Молодые светло-бурые, без «бляш» ки» на лбу. *Г.* Громкое «крррук» и «кек-кек». *От.* От других околоводных птиц отличается по

красной «бляшке» на лбу. *Б.* Тростниковые заросли на водоемах. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кочке среди тростника. В кладке 6—12 грязно-зеленоватых или ржаво-желтых с темными пятнышками яиц.

142. Кукушка — Cuculus canorus L.
Глухая кукушка — Cuculus saturatus Blyth
Малая кукушка — Cuculus poliocephalus Lath.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Обнаруживаются обычно по голосу. Крылья и хвост довольно длинные. Во время кукования крылья опущены вниз, хвост поднят кверху. Голова, спина и верх зоба пепельно-серые. Хвост и крылья бурые, с поперечными светлыми полосами. Грудь и брюхо белые, с поперечными черными полосами. Встречаются птицы (чаще всего самки), у которых вместо серого цвета рыжий. *Г.* У обыкновенной кукушки — громкое «ку-ку» и «кли-кли», у глухой кукушки — глухое «ду-ду-ду», у малой кукушки — мелодичная трель «ле-ля-ла-лю». *От.* Между собой на расстоянии различаются с трудом. Малая кукушка заметно мельче. В полете похожи на ястреба, но отличаются острыми, довольно длинными крыльями. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Откладывают яйца в гнезда насекомоядных птиц.

143. Ширококрылая кукушка — Hierococcys fugax Horsf.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Скрытная птица, держится в кронах деревьев. Голова, спина, крылья и хвост серые. Низ тела охристо-белый, с редкими продольными пестринами. На хвосте две широкие темные поперечные полосы. *Г.* Довольно громкое «жиу-ичи», «жиу-ичи», постепенно ускоряющееся и переходящее в трель. *От.* В отличие от других кукушек, нижняя сторона тела белого цвета. *Б.* Высокоствольные леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Откладывает яйца в гнезда насекомоядных птиц.

144. Сизоворонка — Coracias garrulus L.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Яркая, зеленовато-голубоватая птица с глинисто-коричневой спиной. Обычно видна сидящей на проводе или на сухой ветке дерева. *Г.* Громкое «раак-раак». *От.* Окраска настолько своеобразна, что спутать с другой птицей нельзя. *Б.* Лесостепь и сухие сосновые боры. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в норе или в дупле. В кладке 4—6 белых яиц.



145. Удод — Upupa epops L.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Небольшая птица с большим веерообразным хохлом. Во время полета крылья кажутся очень широкими. Полет тихий, порхающий. Клюв тонкий, длинный, слегка изогнутый вниз. Общая окраска розовато-рыжая. Брюшко белое. Полосы на хохле, крылья и хвост черные. На крыльях и хвосте большие белые пятна. *Г.* Глухое «уп-уп-уп». *От.* По веерообразному хохлу легко отличить от других птиц. *Б.* Открытые пространства с отдельными группами деревьев. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле дерева, в грудах камней, расщелинах скал и в норах. В кладке 5—6 белых яиц.



146. Золотистая ржанка — Charadrius apricarius L.



В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Средней величины кулик с довольно коротким клювом. Держится парами и стайками. Окраска сверху золотисто-зеленоватая, с мелкими белыми крапинками. Нижняя сторона тела весной и летом черная. Черный цвет, окаймленный широкой белой полосой, заходит на шею и бока головы. Осенью нижняя сторона тела грязно-беловатая. Нижняя часть крыла беловатая. *Г.* Мелодичное громкое «тюйлиии». *От.* В отличие от бурокрылой ржанки, перья под крыльями беловатые. *Б.* Моховые болота в лесу. Характерна для тундры. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В клад-



ке 4 желтовато-коричневых с крупными бурыми пятнами яйца.



147. Бурокрылая ржанка — Charadrius dominicus Müll.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Средней величины кулик с довольно коротким клювом. Держится парами и стайками. Перебегая по земле, приседает, а затем вытягивается кверху. Окраска сверху золотисто-зеленоватая, с частыми белыми крапинками. Весь низ, шея и бока головы черные. Все черные участки окаймлены широкой белой полосой, начинающейся от лба и бровей. Осенью низ тела беловатый. Перья под крылом бурые. *Г.* Звонкое «тюйлии». *От.* В отличие от золотистой ржанки, перья под крыльями бурые. *Б.* Сухая горная тундра. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 охристо-коричневых с большими бурыми пятнами яйца.

148. Хрустан — Charadrius morinellus L.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Средней величины кулик с довольно коротким клювом. Держится парами и стайками. Окраска сверху серовато-бурая. На голове темно-бурая шапочка. Зоб дымчато-бурый, окаймленный черной и белой полосками. Грудь ржаво-рыжая, брюхо черное. Над глазом светлые полосы, сходящиеся на затылке. Осенью низ тела сероватый. *Г.* Громкое «тютюю». *От.* В отличие от ржанок, общая окраска серая. *Б.* Каменистая горная тундра. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке обычно 3 зеленоватых или светло-коричневых с бурыми пятнами яйца.

149. Серпоклюв — Ibidorhyncha struthersi Vig.

В. Несколько крупнее голубя. *ОП.* Довольно крупный кулик с длинным, серповидно изогнутым вниз красным клювом. Держится парами и небольшими стайками. Окраска сверху дымчато-серая. Нижняя сторона тела белая. Лоб, верх головы, горло и широкая полоса поперек груди черные. *Г.* Громкий, мелодичный свист. *От.* В отличие от других куликов, клюв красный, серповидный. *Б.* Галечниковые широкие долины рек в высокогорьях. *ХП.* Оседлая, отчасти кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 серых с желтоватым или зеленоватым налетом и бурыми крапинками яйца. *РОВ.*



150. Турухтан —
Philomachus pugnax L.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Средней величины кулик с довольно длинными ногами и клювом. Держится стайками. Верхняя сторона тела темная, черновато-бурая, со светлыми рыжеватыми пестринами. Низ беловатый, с розовато-желтоватым налетом на груди. У самок на нижней стороне тела редкие бурые пятна. Весной у самцов большой «воротник» по бокам шеи. Окраска «воротников» разнообразна. *Г.* Тихое короткое потрескивание. *От.* В отличие от улитов, надхвостье и спина темные. *Б.* Мокрые травяные луга и болота. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 желтоватых с бурыми пятнами яйца.



151. Щеголь —
Tringa erythropus Pall.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Средней величины кулик с довольно длинными ногами и клювом. Окраска сверху зеленовато-бурая, с поперечными темными пестринами. Низ тела осенью белый, весной и летом матово-черный. Клюв черный, с красным основанием. Ноги красные. *Г.* Мелодичный свист «ррюю-рю-ррюю». *От.* В отличие от улитов, спина темная, пестрая, ноги красные. *Б* Болота и болотистые берега рек. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 зеленоватых или коричневатых с темными пятнами яйца.



152. Большой улит — Tringa nebularia Gunn.



В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Средней величины кулик с высокими ногами. Сидя, покачивает задней половиной тела вверх и вниз. Окраска сверху буровато-серая, с темными пестринами. Нижняя сторона тела и надхвостье белые. По бокам зоба и груди продольные черноватые пестрины. Клюв довольно длинный, на конце слегка изогнутый вверх. На Дальнем Востоке встречается еще и охотский улит, неотличимый на расстоянии от большого улита, вблизи видны чисто-белые подбои крыла. *Г.* Громкое мелодичное «тлюи-тлюии» или «крю-крю-крю». *От.* В отличие от пепельного улита надхвостье белое. *Б.* Прибрежные луга с травой и кустарником. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 желтовато-бурых или желтовато-белых с коричневыми пятнами яйца.

153. Пепельный улит — Tringa brevipes Vieillot

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Средней величины кулик с довольно длинными ногами и клювом. Держится на земле, но иногда садится на деревья. Окраска сверху пепельно-серая, снизу белая, с неясными бурыми поперечными полосками. *Г.* Громкий свист «тювит-тювит-тювит». Около гнезда — «тви-тви». *От.* В отличие от большого улита, надхвостье темное. *Б.* Берега горных ручьев. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Единственное найденное гнездо помещалось в старом гнезде дрозда. В кладке было 4 голубых с черными пятнами яйца.

154. Вальдшнеп — Scolopax rusticola L.

В. С голубя. *ОП.* Средней величины кулик с короткими ногами и длинным прямым клювом. Держится очень скрытно. Весной наблюдается тяга — весенний ток — вальдшнепов, когда самцы с характерными звуками летают очень низко над лесом. Окраска верхней стороны тела каштаново-рыжая, с темными и светлыми пятнами. Низ тела сероватый, с поперечными темными волнистыми полосками. На голове сверху широкие темные поперечные полосы. *Г.* Весной во время тяги самец издает своеобразные звуки — «хорк-хорк... цсии». *От.* В отличие от бекаса и дупеля, величина бо́льшая. *Б.* Густые леса с кустарником и влажной почвой. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 грязно-охристых с темными пятнами яйца.







155. Кроншнеп-малютка — Numenius borealis Forster

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Небольшой кулик с длинным, изогнутым вниз клювом. Окраска сверху рыжевато-серая, с темными треугольными пятнами. Над глазом и посредине головы сверху светлые полосы. Нижняя сторона тела охристо-беловатая. На зобе и груди мелкие продольные пестрины. *Г.* Протяжный свист. *От.* В отличие от других кроншнепов, размер меньше. *Б.* Горное редколесье и горные тундры. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 оливково-бурых с темными пятнами яйца. *РОВ.*

156. Кобчик — Falco vespertinus L.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Мелкий сокол. Во время полета видны довольно длинные острые крылья и сравнительно длинный хвост. Окраска самца темно-серая. Подхвостье и перья под крылом ржаво-рыжие (у амурского кобчика перья под крылом белые). У самки спина серая, с поперечными темными полосками. Нижняя сторона тела и голова рыжеватые, с редкими продольными темными пестринами, по бокам головы заметны темные «усы» .*Г.* Громкое «ки-ки-ки». *От.* В отличие от пустельги, спина сизая. *Б.* Участки леса среди открытых пространств. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—4 охристых с ржаво-коричневыми пятнами яйца.

157. Чеглок — Falco subbuteo L.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Мелкий сокол. Во время полета видны серповидные крылья. Окраска контрастная: верх темно-серый, голова черноватая, горло белое, низ светлый, с продольными пестринами, подхвостье и «штаны» рыжие. «Усы» широкие и хорошо заметные. Молодые окрашены бледнее. *Г.* Звонкое «кликли-кли» или «кик-кик-кик». *От.* В отличие от сапсана, размер



Таблица 17

1. Пепельный улит. 2. Кроншнеп-малютка. 3. Большой улит. 4. Вальдшнеп.







меньше. *Б.* Лиственные и смешанные леса. Охотится на открытых пространствах. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 2—4 охристых с красновато-бурыми пятнами яйца.

158. Обыкновенная пустельга — Falco tinnunculus L.
Степная пустельга — Falco naumanni Fleisch.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Мелкие соколы. Во время полета видны довольно длинные крылья и хвост. Часто «трясутся» в воздухе. Окраска верха тела взрослого самца красновато-коричневая, с круглыми пестринами, низ охристый, с продольными пестринами, голова серая или сизая, «усы» почти незаметны, на конце хвоста темная полоса. Самка и молодые сверху рыжевато-коричневые, с темными пестринами. Хвост рыжий, с поперечными темными полосами, низ тела беловатый, с крупными продольными бурыми пестринами. *Г.* Звонкое «кликли-кли-кли». *От.* В отличие от кобчика, спина рыжая. Друг от друга на расстоянии отличаются с трудом. Степная пустельга светлее и ярче. Кроме того, держа птицу в руках, видно, что у обыкновенной пустельги когти черные, а у степной — белые. *Б.* Открытые степные пространства с группами деревьев или скалами и обрывами. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнездо на дереве, в дупле, в нише скалы, в норе. В кладке по 4—5 охристых с ржаво-бурыми пятнами яиц.

159. Дербник — Falco columbarius L.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Мелкий сокол. В полете видны сравнительно длинные острые крылья и довольно короткий хвост. Окраска взрослой птицы сверху голубовато-серая (у северных особей) и глинисто-серая (у южных). Низ тела охристо-беловатый, с редкими узкими продольными пестринами. *Г.* Громкое «ки-ки-ки». *От.* В отличие от ястреба-перепелятника, крылья длинные, острые. *Б.* Тундра, разреженная тайга и лесостепь. *ХП.* На юге оседлая, на севере перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве, уступе скалы или на кочке. В кладке 3—4 охристых с рыжевато-бурыми пятнами яйца.

160. Ястреб-перепелятник — Accipiter nisus L.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Во время полета видны короткие округлые крылья и довольно длинный хвост. Летает, ловко лавируя между деревьями. Поднявшись вверх, летает, быстро взмахивая крыльями и коротко планируя. Окраска как у тетеревятника, но у самца поперечный рисунок на груди рыжий, а у самки темно-коричневый. Продольной полоски на горле обычно нет. Глаза темные. Молодые похожи на самку. *Г.* Громкое «кик-кик-кик» и «кью-кью-кью». *От.* В отличие от тетеревятника, размер меньше. В отличие от малого перепелятника, величина несколько бóльшая. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—6 белых с бурыми пятнами яиц.

161. Ястреб-тювик — Accipiter badius Gm.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Мелкая хищная птица. В полете видны короткие округлые крылья и довольно длинный хвост. Летает, лавируя между деревьями. У взрослых птиц верх тела серо-голубой, низ беловатый, с частыми поперечными ржаво-рыжими полосками. Молодые сверху бурые, снизу беловатые, с продольными бурыми пестринами. *Г.* Мелодичный посвист «тююю-ви, тююю-ви». *От.* В отличие от перепелятника, низ тела ржаво-рыжий. *Б.* Сады и рощи. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—4 зеленовато-белых яйца.



162. Малый перепелятник — Accipiter gularis Temm. et Schleg.

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Мелкая хищная птица. Во время полета видны короткие округлые крылья и довольно длинный хвост. Часто летает кругами, делая быстрые взмахи крыльями и коротко планируя. В лесу ловко лавирует между деревьями. Самец сверху голубовато-серый, хвост со светлыми поперечными полосами, низ тела бледно-рыжеватый, с неясными буроватыми поперечными полосами. Самка темно-бурая, снизу белая, с четкими поперечными бурыми полосами, несколько крупнее самца. *Г.* Не описан. *От.* Очень похож на обыкновенного перепелятника, но мельче. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 5 белых с бурыми пятнами яиц.

ПТИЦЫ
ВЕЛИЧИНОЙ СО СКВОРЦА

Цветные таблицы XVI — XXIII



163. Скворец — Sturnus vulgaris L.

В. Общеизвестна. *ОП.* Заметная черная птица. Держится стаями. По земле передвигается шагами, а не прыжками. Осенью птицы блестяще-черные, с частыми белыми пестринами. Весной и летом черные, с ярким металлическим блеском. Молодые птицы серо-бурые. *Г.* Резкий, скрипящий крик. Песня состоит из подражаний различным звукам и голосам других птиц. *От.* В отличие от других скворцов, оперение черное. *Б.* Поселки, города, редкие леса и рощи с дуплистыми деревьями, реже глинистые обрывы. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле, искусственном гнездовье, норе. В кладке 5—8 голубых яиц.



164. Розовый скворец — Sturnus roseus L.

В. Со скворца. *ОП.* Держится большими стаями, реже в одиночку. Оперение яркое. У взрослой птицы голова, крылья и хвост блестяще-черные. Остальное оперение нежно-розовое. Молодые птицы светлые, серовато-бурые. *Г.* Резкие, скрипучие, хриплые звуки. *От.* От других скворцов отличается розовым цветом в оперении. *Б.* Открытые сухие пространства с обрывами, кучками камней и т. д. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в щели обрыва, скалы, между камнями. Гнездится колониями. В кладке 4—6 бледно-голубых яиц.



65. Майна —
Acridotheres tristis L.



В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Держится стаями около поселений человека. По земле ходит шагами. Во время полета видны широкие крылья с поперечной белой полосой. Общая окраска буровато-розовая. Брюхо белое. Голова, крылья и хвост черные. Под глазом голое желтое пятно. *Г.* Скрипучие, скрипучие крики и низкие свисты. *От.* В отличие от других скворцов, размер крупный. *Б.* Поселения человека и глинистые обрывы. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле, норе, расщелине скалы. В кладке 3—6 голубых яиц.

66. Серый скворец — Spodiopsar cineraceus Temm.

В. Со скворца. *ОП.* Держится обычно стаями. Шумная, крикливая птица, напоминающая обыкновенного скворца. По земле шагает, иногда прыгает. Общая окраска матово-серая. Верх и бока головы белые, шея и затылок черные. Клюв у основания ярко-желтый, на конце бурый. У самки вместо черного цвета бурый. *Г.* Резкие, трескучие звуки. *От.* В отличие от обыкновенного скворца, окраска серая. *Б.* Широколиственные леса и рощи. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездится колониями. Гнездо в дупле. В кладке 4—8 голубых яиц.

67. Малый скворец — Sturnia sturnina Pall.

В. Несколько мельче скворца *ОП.* Небольшая птица, по внешнему облику напоминающая обыкновенного скворца. Во время пения трепещет крыльями и распушает перья на горле, как и обыкновенный скворец. По земле ходит. Общая окраска светло-серая. Спина, хвост и крылья черные, с металлическим фиолетовым блеском. На плечах широкие белые полосы. У самца на затылке черное пятно. У самки вместо черного цвета буро-черный. На Сахалине и Курильских островах встречается японский малый скворец. У него на боках головы яркие ржаво-коричневые пятна. *Г.* Громкие, трещащие звуки. Песня разнообразная, красивая, с подражаниями голосам других птиц. *От.* В отличие от других скворцов, размер меньше. *Б.* Опушки лесов и рощи. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездится часто колониями. Гнездо в дупле. В кладке 5—6 голубых яиц.



Таблица 18

1. Серый сорокопут. 2. Клинохвостый сорокопут. 3. Чернолобый сорокопут. 4. Толстоклювая камышовка. 5. Дроздовидная камышовка.



Таблица 19

1. Белозобый дрозд (взрослый). 2. Белозобый дрозд (молодой).3. Черный дрозд (самец). 4. Черный дрозд (самка). 5. Бурая оляпка (взрослая). 6. Бурая оляпка (молодая). 7. Обыкновенная оляпка (темнобрюхая). 8. Обыкновенная оляпка (молодая). 9.Обыкновенная оляпка (белобрюхая).









168. Иволга —
Oriolus oriolus L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Скрытная птица. Держится в густой листве. Легко обнаруживается по голосу. Самец ярко-желтый, с черными крыльями и хвостом. На хвосте по бокам большие желтые пятна. Самка и молодые сверху серовато-зелено-желтые, снизу желтовато-белые, с редкими продольными бурыми пестринами. *Г.* Резкое «вжжжяяа» и красивый флейтовый свист «фю-тиу-лиу». *От.* В отличие от черноголовой иволги, на затылке нет черного цвета. *Б.* Светлые лиственные леса, парки и сады. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—4 белых с черными точками яйца.

169. Черноголовая иволга —
Oriolus chinensis L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Держится скрытно в кронах деревьев. Легко обнаруживается по голосу. Окраска взрослых птиц ярко-желтая. Крылья, широкая поперечная полоса на хвосте и полоса, опоясывающая голову от глаз через затылок, черные. У молодых птиц верх зеленовато-желтый, низ желтовато-белый, с редкими пр дольными темными пестринами. *Г.* Самцы издают громкий свист «грии-гориий», самки — протяжный свист «ть-ю-ю». *От.* В отличие от обыкновенной иволги, на затылке черная олоса. *Б.* Лиственный лес. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнез-

до на дереве. В кладке 3—4 розовато-белых с ржаво-коричневыми пятнами яйца.



170. Широкорот — Eurystomus orientalis L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Небольшая, плотного телосложения птица. Общая окраска темно-синяя. Клюв широкий, красный. Чаще всего виден в полете или сидящим на сухих ветвях деревьев. *Г.* Хриплое, резкое «черр-черр». *От.* В отличие от сизоворонки, величина меньшая, клюв красный. *Б.* Высокоствольный лес. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 4—6 белых яиц.

171. Золотистая щурка — Merops apiaster Pall.

В. Со скворца. *ОП.* Держится обычно стайками. В полете видны длинные острые крылья и довольно длинный,с выдающимися посредине узкими перьями хвост. Часто сидит на проводах и на сухих ветках деревьев. Клюв длинный, несколько изогнутый вниз. Весной и летом спина и верх головы каштаново-коричневые, с широкими желтыми полосами. Горло желтое, окаймленное черной полосой. Низ тела голубой. Крылья и хвост зеленые. Молодые и осенние взрослые птицы сверху зеленые. *Г.* Звонкое «кюрю-кюрю». *От.* В отличие от зеленой щурки, низ тела голубой. *Б.* Сухие степные пространства с глинистыми и песчаными обрывами. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в норе. В кладке 5—6 белых яиц.

172. Зеленая щурка — Merops superciliosus L.

В. Со скворца. *ОП.* Держится обычно стайками. Во время полета видны длинные острые крылья и довольно длинный, с удлиненными узкими средними перьями хвост. Часто садится на провода и сухие ветки деревьев. Клюв длинный, слегка изогнутый вниз. Общая окраска ярко-зеленая. Лоб и полоса над глазом голубые. Горло ржаво-рыжее. *Г.* Звонкое «кири-кири». *От.* В отличие от золотистой щурки, окраска зеленая. *Б.* Степные и полупустынные пространства, изрезанные оврагами. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в норе. В кладке 4—6 белых яиц.

173. Козодой — Caprimulgus europaeus L.
Большой козодой — Caprimulgus indicus Lath.

В. Несколько крупнее скворца, но кажутся гораздо больше благодаря длинным крыльям и хвосту. *ОП.* Сумеречные и ночные





птицы. Полет бесшумный. Во время полета видны довольно длинный хвост и острые крылья. Днем сидят, плотно прижавшись к толстой ветви дерева или к земле. Ноги очень короткие. Окраска буровато-серая, со светлыми и темными полосками под цвет коры. У самцов на крыльях и хвосте большие белые пятна. *Г.* Гнусавое «кувык» и громкая сухая трель «трррр-ррр...», напоминающая шум мотора, длящаяся по нескольку минут, прерываясь иногда громким хлопаньем крыльев. *От.* В отличие от сов, крылья и хвост длинные. Между собой различаются с трудом. Большой козодой несколько крупнее и темнее. *Б.* Леса, рощи, заросли кустарников по сухим долинам рек. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда на земле. В кладках по 2 серовато-белых с серыми пятнами яйца.

174. Большой пестрый дятел — Dendrocopos major L.
Белокрылый дятел — Dendrocopos leucopterus Salvad.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Как все дятлы, хорошо лазают по стволам деревьев. Спина, верх головы и шеи, крылья, хвост и полосы от клюва к затылку черные. Щеки, горло, лоб, грудь, брюшко, полосы на крыльях, хвосте и плечах белые. Подхвостье красное. У самца затылок, а у молодых весь верх головы красные. У белокрылого дятла крылья белые, с черными полосами. *Г.* Резкое «кик». *От.* В отличие от белоспинного дят-

ла, спина черная. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Оседлые и кочующие птицы. *Гн.* Гнезда в дуплах. В кладках по 5—6 белых яиц.

175. Средний пестрый дятел — Dendrocopos medius L.

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Небольшой дятел. Спина и надхвостье черные. Крылья и хвост черные, с белыми полосками. Верх головы и подхвостье красные. Низ тела грязно-желтовато-белый, с редкими продольными темными пестринами на боках. *Г.* Громкое «кик-кик-кик». *От.* В отличие от молодых больших пестрых дятлов, брюхо желтоватое. *Б.* Высокоствольные леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—6 белых яиц.

176. Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos Bechst.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Средней величины дятел. Верх тела белый, с черными пятнами и полосами. Низ тела белый. Шапочка на головке и подхвостье красные. Крылья и хвост черные, с белыми полосками. *Г.* Громкое «кик-кик» и скрипящий протяжный крик. *От.* В отличие от пестрых дятлов, спина белая. *Б.* Светлые лиственные и смешанные леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 4—6 белых яиц.

177. Сирийский дятел — Dendrocopos syriacus Hempr. et Ehr.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Небольшой дятел. Окраска пестрая, черно-белая. Верх тела черный, с широкими белыми полосами на плечах. Крылья и хвост черные, с белыми полосами. От клюва вдоль шеи к зобу идет черная полоска. Низ тела белый. У самца подхвостье и затылок красные. Лоб грязно-белый. У молодых темя и затылок красные. *Г.* Громкое «кик». *От.* На расстоянии неотличим от большого пестрого дятла. Вблизи видно, что черная полоса на шее не доходит до затылка. *Б.* Лиственные и смешанные леса, сады и парки. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 6—11 белых яиц.

178. Трехпалый, или желтоголовый, дятел — Picoides tridactylus L.

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Небольшой дятел. Верх тела черный, с белыми пестринами. Низ тела белый, с редкими продольными темными пестринами. У самца на голове золотисто-желтая шапочка, у самки она грязно-белая. *Г.* Громкий протяжный крик и негромкое стрекотание. *От.* В отличие от других дятлов, у самцов шапочка на голове желтая, в оперении отсутствует красный цвет. *Б.* Старые хвойные леса. *ХП.* Оседлая и отчасти кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 3—5 белых яиц.



179. Большой черноголовый дубонос — Eophona personata Temm. et Schleg.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Плотного телосложения птица, с очень толстым желтым клювом. Держится обычно в кронах деревьев. Окраска буровато-серая. Подхвостье белое. Верх головы, крылья и довольно длинный хвост черные. На крыле небольшое белое пятно. У молодых птиц голова серая. *Г.* Негромкие звуки «дык-дык» или «так-так». Песня — несколько громких флейтовых свистов. *От.* В отличие от малых черноголовых дубоносов, размер крупный. *Б.* Широколиственные и смешанные леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—4 голубоватых с темными пятнами яйца.





180. Арчовый дубонос — Mycerobas carnipes Hodgs.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Небольшая, плотного сложения птица, с очень толстым черным клювом. Держится обычно на деревьях и кустах арчи или под ними. У самца голова, грудь, хвост и крылья матово-черные, надхвостье и брюшко зеленовато-желтые, на крыле небольшое белое пятно. У самок и молодых вместо черного цвета серый. *Г.* Громкий каркающий и скрипящий крик. *От.* В отличие от обыкновенного дубоноса, окраска черно-желтая. *Б.* Заросли древесной и кустарниковой арчи в горах. *ХП.* Оседлая



птица. *Гн.* Гнездо на дереве или кусте. В кладке 3—5 белых с лилово-бурыми крапинками яиц.



181. Дубонос — Coccothraustes coccothraustes L.

В. Со скворца или несколько мельче. *ОП.* Малоподвижная птица плотного телосложения, с очень толстым клювом. Хвост довольно короткий. Общий тон окраски самца розовато-рыжеватый, крылья и хвост черные, с металлическим блеском и белыми пятнами. У самки вместо розовых и рыжеватых тонов серый. Молодые желтовато-бурые, с темными пестринами. Клюв весной голубой, осенью желтоватый. *Г.* Громкое «цик-цик». Песня — набор трескучих звуков. *От.* В отличие от других дубоносов, хвост короткий. *Б.* Лиственный лес. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—5 серовато-зеленых с темными пятнами и завитками яиц.

182. Щур — Pinicola enucleator L.

В. Со скворца. *ОП.* Держится парами и стаями. Обычно виден осенью и зимой на елях, пихтах, кедровом стланце, рябине. Хвост довольно длинный. Общий тон окраски самца малиново-красный, крылья и хвост буровато-черные, на плечах две белые поперечные полоски. У самок и молодых вместо красного цвета грязно-оранжевый. *Г.* Мелодичный свист «пьюю-лиии». *От.* В отличие от клестов, размер более крупный, хвост относительно длинный. Клюв не перекрещен. *Б.* Хвойные леса с примесью березы и ольхи. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—5 голубых с темными крапинками яиц.

183. Большая чечевица — Carpodacus rubicilla Güld.

В. Со скворца. *ОП.* Держится стайками и парами на кампях, на земле и кустиках. Общий тон окраски взрослых самцов малиново-красный. Самки и молодые буровато-серые, с темными пестринами. *Г.* Негромкий свист «фьююин-фьююин». Песня — набор громких свистов. *От.* В отличие от красного вьюрка, клюв толстый, конический. *Б.* Открытые пространства верхнего пояса гор. Зимой — долины горных рек с зарослями ягодных кустарников. *ХП.* Оседлая, отчасти кочующая птица. *Гн.* Гнездо на уступе скалы. В кладке 5 голубых с темными крапинками яиц.



Таблица 20

1. Фифи. 2. Черныш. 3. Большой песочник. 4. Мородушка. 5.Перевозчик. 6. Малый зуек. 7. Короткоклювый зуек. 8. Большеклювый зуек.



Таблица 21

1. Дупель. 2. Бекас. 3. Бекас-отшельник. 4. Гаршнеп. 5. Хвост азиатского бекаса. 6. Хвост лесного дупеля.



184. Красный вьюрок — Pyrrhospiza punicea Hume

В. Со скворца. *ОП.* Держится небольшими стайками и парами на земле или на камнях. Клюв довольно длинный. Окраска самца сверху буровато-серая, надхвостье и подхвостье розовые, крылья и хвост бурые, бока сероватые, брюхо грязно-желтоватое, лоб, бока головы, горло, зоб и грудь красные. У самки красного цвета нет. Она вся буровато-серая, с темными продольными пестринами, надхвостье и грудь золотисто-желтые. Молодые окрашены так же, как самка, но без желтого цвета. *Г.* Резкое «джиув-джиув». Песня — набор громких свистов. *От.* В отличие от большой чечевицы, клюв более тонкий. *Б.* Скалы, морены ледников и осыпи в самых верхних зонах гор. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в щелях скал. В кладке 4 белых с темными крапинками яйца. *РОВ.*





185. Серый сорокопут — Lanius excubitor L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Обычно виден сидящим неподвижно на сухой ветке дерева или куста. Слетев, летит низко над землей, затем круто взлетает вверх и снова садится. Окраска верха тела пепельно-серая. Полоса через глаз, крылья и довольно длинный хвост черные. Низ тела, пятна на крыльях и широкие полосы по бокам хвоста белые. *Г.* Резкое, грубое «чэк-чэк».



От. В отличие от клинохвостого сорокопута, величина меньшая. *Б.* Открытые пространства с отдельными группами деревьев и кустарников и опушки леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на кусте. В кладке 5—6 беловато-зеленых с темными крапинками яиц.



186. Клинохвостый сорокопут — Lanius sphenocercus Cab.

В. Заметно крупнее скворца. *ОП.* Обычно виден сидящим на проводе или сухой ветке неподвижно. Верх тела серый, полоса через глаз, крылья и хвост черные. По краям хвоста белые полосы. Низ тела белый. *Г.* Резкое «чок-чок». *От.* В отличие от серого сорокопута, величина бо́льшая, хвост длинный. *Б.* Отдельные группы деревьев или кустарников среди степи. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте или на дереве. В кладке 5—6 бледно-зеленоватых с бурыми или фиолетово-бурыми пятнами яиц.

187. Чернолобый сорокопут — Lanius minor Gm.

В. Со скворца. *ОП.* Обычно виден неподвижно сидящим на телефонном проводе или сухой ветке куста. Окраска верха тела пепельно-серая. Лоб, полоса через глаз, крылья и хвост черные. Пятна на крыльях и полоски по бокам хвоста белые. Низ тела розовато-белый. *Г.* Резкое «чэк-чэк». *От.* В отличие от серого сорокопута, лоб черный, величина меньшая. *Б.* Сухие степные пространства с отдельными группами кустов или деревьев. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте или на дереве. В кладке 4—6 серовато-зеленоватых с бурыми пятнами яиц.

188. Толстоклювая камышовка — Phragamaticola aêdon Pall.

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Подвижная, заметная птица. С пением взлетает на вершины деревьев или кустов. Хорошо виден довольно длинный ступенчатый хвост. Окраска верха тела рыжевато-бурая, брюшка — грязно-белая. *Г.* Резкое «чок-чок» или «чок-чок-черрре-чок-чок». Песня громкая, с красивыми свистами. *От.* В отличие от дроздовидной камышовки, хвост более длинный. *Б.* Речные долины, заросшие кустарником, опушки лесов и сады. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 5—6 розоватых или желтоватых с бурыми линиями и завитками яиц.







189. Дроздовидная камышовка — Acrocephalus arundinaceus L.

В. Со скворца. *ОП.* Подвижная крикливая птица. Держится в зарослях тростника или прибрежных кустарниках. Окраска верха тела буровато-коричневая, брюшка — грязно-белая. *Г.* Резкое «чок-чок». Песня — набор грубых, трескучих звуков вроде «длин-длин-карас-карас-беч-беч-вэйк-вэйк». *От.* В отличие от толстоклювой камышовки, величина бóльшая, а хвост короче. *Б.* Заросли на водоемах и по их берегам. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на стеблях тростника. В кладке 3—6 зеленовато-белых с бурыми крапинками яиц.

190. Пестрый, или земляной, дрозд — Zootera dauma Lath.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Крупный дрозд. Держится обычно на земле. Вспугнутая птица с шумом взлетает и садится на дерево. Полет быстрый. Хвост довольно короткий, у летящей птицы по бокам его видны белые полоски. Окраска верха тела золотисто-оливковая, с широкими поперечными темными пестринами. Низ тела белый, с крупными черными пестринами. *Г.* Глухое «хорр-хорр». Песня — тихое щебетание и громкий печальный свист. *От.* В отличие от других дроздов, верх тела золотисто-пестрый. *Б.* Различные типы леса. Чаще встречается в тайге по берегам ручьев. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на земле.

В кладке 4—5 бледно-оливковых с ржавчатыми пятнами яиц.



191. Сибирский дрозд — Turdus sibiricus Pall.

В. Со скворца. *ОП.* Держится на земле и на деревьях. Окраска взрослого самца черно-сизая. Брюхо и широкая бровь над глазом белые. Самка и молодые оливково-бурые сверху и белые, с рыжеватыми поперечными пестринами снизу. *Г.* Громкий треск. Песня — тихое щебетание и двусложный свист. *От.* В отличие от дрозда-белобровика, у самок бока светлые. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве или кусте. В кладке 4—6 голубоватых с темными пятнами яиц.

192. Дрозд-деряба — Turdus viscivorus L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Крупный дрозд. Держится в одиночку и стаями. Окраска верха тела оливково-серая. Нижняя сторона тела белая, с крупными каплевидными черными пестринами. *Г.* Громкий треск «трррр». Песня — набор красивых флейтовых свистов. *От.* В отличие от певчего дрозда, размер более крупный. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Перелетная и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—5 голубовато-зеленых с темными крапинами яиц.

193. Дрозд-рябинник — Turdus pilaris L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Крупный дрозд. Заметная, довольно крикливая птица. Держится стаями. Кормится на деревьях и на земле. Верх головы и надхвостье пепельно-серые. Спина каштаново-бурая. Низ тела охристый, с крупными черными каплевидными пестринами. Брюшко белое. *Г.* Громкий треск. Песня состоит из трещащих звуков. *От.* В отличие от других дроздов, надхвостье и верх головы пепельно-серые. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездится колониями на деревьях. В кладке 4—6 зеленоватых с бурыми пятнами яиц.

194. Певчий дрозд — Turdus philomelos Brehm

В. Со скворца. *ОП.* Средней величины дрозд. Держится на деревьях и на земле в одиночку и стайками. Поет, сидя на дереве. Окраска верхней стороны тела однотонная, оливково-серая,



Таблица 22

1. Домовый сыч. 2. Мохноногий сыч. 3. Сплюшка. 4. Буланая совка. 5. Воробьиный сыч. 6. Ошейниковая совка.



Таблица 23

1. Малый стриж. 2. Черный стриж. 3. Белопоясный стриж. 4. Белобрюхий стриж. 5. Иглохвостый стриж.









низ тела белый, с крупными черными каплевидными пестринами. *Г.* Резкое «тьюк-тьок» или «циии». Песня громкая, звучная, передается как «спиридон - спиридон - чайпить - чайпить-витью-витью». *От.* В отличие от дерябы, размер меньше. В отличие от белобровика, бока тела светлые. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке обычно 5 голубых с черными пятнами яиц.

195. Дрозд-белобровик — Turdus iliacus L.

В. Со скворца. *ОП.* Держится в одиночку и стайками. Похож на певчего дрозда, но над глазом широкая охристо-белая бровь, бока ржаво-рыжие. *Г.* Резкий треск «тцетек-тек». Песня —трещащее щебетание и громкий свист «итю-тю-тю». *От.* В отличие от певчего дрозда, бока рыжие, брови светлые. *Б.* Различные типы леса и заросли кустарников по берегам рек. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо низко над землей, на деревьях, кустах или пеньках. В кладке 5—6 голубовато-зеленых с красновато-бурыми крапинами яиц.

196. Дрозд Науманна — Turdus naumanni Temm.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Держится парами и стайками на деревьях. Кормится на земле. Окраска двух типов. У птиц темной окраски верх головы, спина и надхвостье черные,с примесью ржаво-коричневых тонов. Крылья

ржаво-коричневые. На боках головы черные полоски. Низ тела белый, с черными пестринами. У птиц рыжей окраски черные тона в оперении отсутствуют. Верх тела серовато-бурый. Горло, щеки, зоб, бока и подхвостье ржаво-рыжие. Брюхо белое. *Г.* Резкое «чак-чак», «цепить-чак-чак» или «клевеч». Песня — красивые громкие свисты. *От.* В отличие от темнозобого дрозда, подхвостье и бока тела рыжие. *Б.* Различные типы леса и кустарники. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на горизонтальной ветви дерева, на пеньках или кустах. В кладке 4—5 голубовато-зеленых с бурыми крапинками яиц.

197. Темнозобый дрозд — Turdus ruficollis Pall.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Держится парами и стайками на деревьях, кустах и на земле. Окраска верхней стороны тела оливково-серая. Низ тела охристо-белый. Горло и зоб у самцов черные или рыжие. У самок и молодых зоб и горло с белыми пестринами. *Г.* Резкий треск. Песня — набор скрипящих и трещащих звуков. *От.* В отличие от дрозда Науманна, подхвостье и бока тела белые. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо невысоко на дереве, на кусте, пеньке или на земле. В кладке 4—7 бледно-голубых с коричневатыми крапинами яиц.

198. Сизый дрозд — Turdus hortulorum Sclat.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Держится парами и стайками на деревьях. Кормится на земле. Поет, сидя на вершине дерева. Окраска верхней стороны тела темная, пепельно-серая. Горло белое, слегка охристое, по краям с редкими темными пестринами. Зоб серый. Грудь и бока тела рыжие. Брюхо белое. Самка и молодые более тусклые. *Г.* Громкое «чак-чак». Песня — красивые громкие свисты. *От.* В отличие от бледного дрозда, оперение более яркое. *Б.* Лиственные и смешанные леса и пойменные заросли. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте, дереве или на пеньке. В кладке 5 бледно-зеленых с рыжеватыми пятнами яиц.

199. Малый дрозд — Catharus minimus Lafresn.

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Держится в кустах и на земле. Самец поет на вершинах деревьев. Окраска верхней стороны тела однотонная, оливково-серая. Низ тела белый. Бока и зоб серые, с мелкими бурыми пестринами. *Г.* Резкое «држи» и звонкое «цьох». Песня — повторение этих звуков. *От.* В отличие от белобровика, бока тела серые. *Б.* Лесотундра и верхняя граница тайги. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кустах или на деревьях. В кладке 5—6 зеленовато-голубых с красновато- или желтовато-бурыми пятнами яиц.









200. Бледный дрозд — Turdus pallidus Gm.

В. Со скворца. *ОП.* Небольшой дрозд. Держится в одиночку, парами и стайками на деревьях и на земле. Верх тела оливково-бурый, с рыжеватым оттенком. Голова и надхвостье сероватые. Горло и брюшко белые. Шея и зоб серые или желтовато-рыжие. Бока светло-рыжеватые. Над глазом светлая бровь. *Г.* Громкое «ци» и сухой треск. Песня — однообразный громкий свист «тюви-тюлид, тюлид-тюви». *От.* В отличие от сизого дрозда, низ тела бледный. *Б.* Различные типы леса и заросли кустарников. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 5—6 зеленоватых с красно-бурыми пятнышками яиц.

201. Белозобый дрозд — Turdus torquatus L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Довольно крупный дрозд. Держится в одиночку, парами и стайками, перелетая по скалам или прыгая в кустах по земле. Во время полета хорошо заметны беловатые крылья и довольно длинный хвост. Общая окраска матово-черная, на зобе большое белое полукруглое пятно. У молодых птиц белого пятна нет, и общая окраска их серовато-бурая, с темными поперечными пестринами. *Г.* Резкое «трек-чек-чек» или протяжное «циии». Песня — громкие красивые свисты. *От.* В отличие от черного дрозда, крылья беловатые, на зобе белое пят-

по. *Б.* Горные кустарники и верхняя часть леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле, на кусте или на дереве. В кладке 4—5 голубовато-зеленых с ржавыми пятнами яиц.

202. Черный дрозд — Turdus merula L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Довольно крупный дрозд. Окраска взрослого самца сплошь черная. Клюв и голое кольцо вокруг глаза оранжево-желтые. Самка и молодые серовато-бурые, с рыжеватым налетом, горло беловатое. *Г.* Громкое «чок-чок» или «терре-чок-чок». Песня — красивые печальные флейтовые свисты. *От.* В отличие от других дроздов, окраска черная. *Б.* Различные типы леса и кустарники. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве, на кустах или на земле. В кладке 4—7 голубовато-зеленых с ржаво-бурыми пятнами яиц.

203. Обыкновенная оляпка — Cinclus cinclus L.
Бурая оляпка — Cinclus pallasii Temm.

В. Со скворца. *ОП.* Небольшие, плотного телосложения короткохвостые птицы. Держатся всегда у воды. Летают тяжело, низко над водой. Часто ныряют и бегают по дну. Бурая оляпка однотонного бурого цвета. У обыкновенной оляпки верх тела серовато-бурый. Весь низ тела белый. У европейских обыкновенных оляпок брюшко бурое. *Г.* Резкое «дзит-дзит». Песня — звонкая трель. *От.* Настолько своеобразные птицы, что спутать с другими нельзя. *Б.* Быстрые, бурные, прозрачные речки. *ХП.* Оседлые птицы. *Гн.* Гнездо — массивная постройка из мха — помещается у воды, чаще всего под водопадами. В кладке 4—6 белых яиц.

204. Пестрый каменный дрозд — Monticola saxatilis L.

В. Со скворца. *ОП.* Держится на земле или на камнях. Часто приседает и вздергивает хвостом. У самца голова и шея серо-голубоватые, спина и крылья темно-бурые, надхвостье белое, грудь, брюшко и хвост ржаво-рыжие. Самка и молодые птицы светлые, рыжевато-серые, с частыми поперечными бурыми пестринами. *Г.* Резкое «чак-чак» и свист. Песня звонкая, разнообразная, с подражаниями голосам других птиц. *От.* У самки, в отличие от самки синего каменного дрозда, окраска более светлая. В любом наряде отличается от синего каменного дрозда рыжим цветом рулевых перьев. *Б.* Сухие каменистые склоны гор с редкой растительностью и выходами скал. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в трещине скалы или между камнями. В кладке 4—6 голубовато-зеленоватых яиц.









205. Синий каменный дрозд — Monticola solitarius L.

В. Со скворца. *ОП.* Перелетает с камня на камень или прыгает по земле, часто поднимая и опуская довольно короткий хвост. Окраска самца однотонная, серовато-голубая, хвост и крылья бурые. Самка и молодые серо-бурые, с более темными поперечными полосками и светлым горлом. У самцов дальневосточного синего каменного дрозда брюшко ржаво-коричневое. *Г.* Резкое «чек-чек». Песня громкая, красивая, со свистом. *От.* У самок, в отличие от самок пестрого каменного дрозда, окраска более темная. *Б.* Сухие степные склоны гор с выходами скал и осыпями. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в трещинах скал и между камнями. В кладке 4—6 голубовато-зеленоватых, иногда с буро-красными пятнами яиц.

206. Белогорлый дрозд — Orocetes gularis Swinh.

В. Со скворца. *ОП.* Держится на деревьях и на земле. Самец поет, сидя на вершине дерева. У самца верх головы голубой, спина, бока головы, крылья и хвост бурочерные, надхвостье и низ тела ржаво-коричневые, горло и пятно на крыльях белые. Самка и молодые сверху буровато-серые, с черным поперечным рисунком, снизу белые, с широкими черными поперечными пестринами. *Г.* Резкое «чек-чек». Песня очень громкая, звучная, состоит из

флейтовых свистов. *От.* В отличие от пестрого каменного дрозда, горло белое. *Б.* Покрытые лесом склоны гор. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 6—7 белых, иногда с мелкими ржавыми точками яиц.

207. Свиристель — Bombycilla garrulus L.

В. Со скворца. *ОП.* Малоподвижная птица. Держится обычно стаями. На голове длинный хохол. Общая окраска розовато-серая. Крылья черные, с продольными желтыми и белыми полосками. Поперек крыла расположены перья, имеющие на концах красные роговые бляшки. Хвост черный, с поперечной желтой полосой на конце. Горло и полоска от клюва к глазу черные. Подхвостье коричневое. *Г.* Нежное «свирири-свирири». *От.* В отличие от амурского свиристеля, полоска на хвосте желтая. *Б.* Хвойные и березовые леса. Осенью и зимой различные типы леса. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 5 серовато-голубых с черными пятнышками яиц.

208. Амурский свиристель — Bombycilla japonica Sieb.

В. Со скворца. *ОП.* Держится парами и стаями. Осенью и зимой кормится на ягодных кустах и деревьях. У сидящей птицы виден длинный хохол на голове. Общая окраска темная, розовато-серая. Горло, полоска от клюва через глаз и до затылка, крылья и хвост черные. Плечи каштановые около спины и сизые на крыле. Подхвостье красное. На конце хвоста розово-красная полоса. *Г.* Нежная, серебристая трель. *От.* В отличие от обыкновенного свиристеля, на хвосте красная полоса. *Б.* Тайга: лиственничники и кедрачи с голубикой. Осенью посещает различные типы леса. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—5 беловатых с темными крапинками яиц.

209. Погоныш — Porzana porzana L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Очень скрытная птица. Держится на земле в густой траве или в зарослях около воды. Летает плохо и неохотно, предпочитая убегать. У летящей птицы ноги висят. Хвост короткий. Окраска верха тела оливково-бурая, с темными и светлыми пестринами. Нижняя сторона голубовато-серая, с мелкими беловатыми пятнышками. Основание клюва красное, конец его зеленовато-желтый. Ноги длинные, с длинными пальцами, зеленоватые. *Г.* Резкое посвистывание «квык-квык». *От.* В отличие от малого погоныша, размер более крупный. *Б.* Прибрежные луга и заросли. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. *В* кладке 10—15 охристых и бледно-зеленых с бурыми крапинками яиц.





210. Коростель, или дергач — Crex crex L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Очень скрытная птица. Держится в густой траве или зарослях на земле. Полет слабый, тяжелый. У летящей птицы видны болтающиеся длинные ноги. Легко обнаруживается по голосу. Окраска рыжевато-коричневая. *Г.* Напоминающее скрип сухого дерева резкое «крэк-крэк». *От.* В отличие от погоныша, спина рыжевато-коричневая. *Б.* Луга и заросли ивняка по берегам рек и болот. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 9—10 глинисто-охристых или молочно-голубых с бурыми крапинками яиц.

211. Большой погоныш — Porzana paykullii Ljugh.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Скрытная птица. Держится на земле в густых зарослях травы или ивняка. Весной и в начале лета легко обнаруживается по голосу. Общая окраска каштаново-бурая, переходящая в бурую на спине. Бока тела серые, с резкими поперечными темными полосами. Брюхо белое. *Г.* Металлические звуки, сливающиеся в глухую трель «урррр». *От.* В отличие от других погонышей и коростеля, окраска ярко-каштановая. *Б.* Сырые луговины с кустарником и деревьями. Избегает широких открытых пространств. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 6—9 беловато-охристых с бледно-серыми пятнами яиц.

212. Малый погоныш — Porzana parva Scop.
Погоныш-крошка — Porzana pusilla Pall.

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Очень скрытные птицы. Держатся на земле или на мелкой воде в зарослях. Быстро бегают. Летают редко. Полет тихий, тяжелый, у летящих птиц ноги опущены. Могут плавать. Иногда взбираются высоко на стебли тростника. Ноги длинные, с длинными пальцами, зеленовато-бурые. Клюв довольно длинный, зеленоватый, у малого погоныша с красным основанием. Окраска верха тела оливково-буроватая, с широкими продольными бурыми пестринами. Нижняя сторона голубовато-серая. У погоныша-крошки на боках широкие поперечные беловатые полосы. У молодых нижняя сторона тела грязно-белая, с коричневатым налетом на боках. *Г.* Малый погоныш издает своеобразные звуки «вот-вот-вотт» и «вьиитт-кворр». Голос погоныша-крошки — своеобразный свист. *От.* В отличие от других погонышей, размер более мелкий. *Б.* Прибрежные тростниковые, кустарниковые и травянистые заросли. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда на стеблях камыша среди воды или на кочках. В кладках по 6—9 желтовато- или глинисто-серых с красновато-рыжими крапинками яиц.

213. Пастушок — Rallus aquaticus L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Скрытная сумеречная и ночная птица. Держится в зарослях травы вблизи воды. Может плавать. Клюв и ноги длинные. На ногах пальцы очень длинные. При ходьбе подергивает поднятым кверху коротким хвостом. Окраска верхней стороны тела оливково-бурая, с большими черными продольными пестринами. Нижняя сторона тела темная, голубовато-серая, с широкими темными поперечными полосами на боках. Верх клюва бурый, низ оранжево-красный. Ноги красновато-бурые. *Г.* Постепенно стихающий визгливый крик «уить, уить-уить» и резкий писк «тильк». *От.* В отличие от погонышей, величина бо́льшая, клюв длинный. *Б.* Прибрежные заросли. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 7—9 бледно-желтоватых или серовато-белых яиц.

214. Перепел — Coturnix coturnix L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Напоминает маленькую курочку. Держится скрытно на земле. Легко обнаруживается весной и в начале лета по крику. Вспугнутый, летит низко над землей. Полет довольно быстрый, прямой. Окраска рыжевато-серая. На спине продольные темные и светлые полоски. У самца весной горло черное, осенью белое. Грудь и зоб охристо-рыжие, без пятен. У самок и молодых зоб и грудь сероватые, с бурыми пятнышками. *Г.* Глухое «хва-ва, хва-ва» и









звонкое «пить-пить-бить». Голос японского перепела — глухое «чу-пить-трр». *От.* В отличие от других куриных птиц, размер меньше. Очень похож на обыкновенного перепела живущий на юго-востоке нашей страны японский, или немой, перепел, отличающийся несколько меньшей величиной и ржаво-коричневой окраской головы. *Б.* Сухие луга и посевы. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 8—15 беловатых или глинисто-буроватых с темными крапинами яиц.

215. Черныш —
Tringa ochropus L.

В. Со скворца. *ОП.* Небольшой кулик. Держится в одиночку и небольшими стайками на земле, иногда садится на деревья. Обычно виден ходящим по берегам ручьев или с криком летающим около них. Спина и крылья черно-бурые, нижняя сторона тела и надхвостье белые. На зобе и груди мелкие темные пестрины. *Г.* Звонкий металлический свист «тлюи-тлюи» или «тлюи-титит-тлюи». *От.* В отличие от перевозчика, спина более темная, надхвостье белое. *Б.* Лесные болота, заводи и речки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве в старых гнездах дроздов, соек и других птиц. В кладке 4 светло-коричневых с бурыми пятнами яйца.

216. Перевозчик —
Tringa hypoleucos L.

В. Со скворца. *ОП.* Небольшой кулик. Держится по бере-

гам рек. Летает обычно низко над водой. Во время полета видны белые полосы по краю крыльев и по бокам хвоста. Сидя, покачивает вверх и вниз задней частью тела. Окраска верха буровато-серая. Нижняя сторона тела белая, с размытыми темными пестринами по бокам груди и зоба. *Г.* Звонкий свист «тиви-тили-тили-титит». *От.* В отличие от черныша, спина и надхвостье серые. *Б.* Берега рек. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 коричневатых с бурыми пятнами яйца.

217. Фифи — Tringa glareola L.

В. Со скворца. *ОП.* Небольшой кулик. Сидящая птица часто поднимает и опускает заднюю часть тела. Окраска верха тела буровато-серая, с мелкими светлыми крапинками. Нижняя сторона тела белая, с темными пестринами на шее и зобе. *Г.* Негромкое мелодичное «фи-фи-фи». Весной, кроме того, самцы издают громкую трель «тюли-тюли-тюлюлюлю». *От.* В отличие от черныша, спина серая. В отличие от перевозчика, надхвостье белое. *Б.* Болота, долины таежных рек, болотистые берега озер. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 светлых, оливково-зеленых с бурыми пятнами яйца.

218. Мородунка — Terekia cinerea Güld.

В. Со скворца. *ОП.* Небольшой кулик. Держится на земле, иногда садится на прибрежные кусты и коряги. Клюв слегка изогнутый кверху. Окраска верхней стороны тела светлая, буровато-серая. Нижняя сторона белая, с темными пестринами на зобе. Ноги светлые, желтоватые. *Г.* Звонкое «ти-ли-ли». Весной, кроме того, самец издает громкую трель «тю-ррюи-тю-ррюи-тю-ррюи». *От.* В отличие от фифи и перевозчика, клюв изогнутый кверху. *Б.* Лесные болота, болотистые берега рек и озер. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 коричневато-желтых с бурыми пятнами и точками яиц.

219. Малый зуек — Charadrius dubius Scop.

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Маленький куличок с довольно короткими ногами и клювом. Быстро бегает по земле, приседая и кланяясь. Окраска пестрая, надклювье целиком черное, вокруг глаза желтое кольцо, черная полоска на лбу сверху ограничена белой, ноги мясного цвета. *Г.* Печальный свист «тююю». *От.* В отличие от других мелких куликов, верх тела однотонный, глинистый, на зобе черная повязка. *Б.* Сухие песчаные и галечниковые отмели по берегам рек и озер. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 голубых или зеленоватых с черно-бурыми пятнышками яйца.







220. Большеклювый зуек — Charadrius leschenaultii Less.

В. Со скворца. *ОП.* Небольшой кулик с довольно длинными ногами и коротким клювом. Держится на земле парами и стайками. Окраска верхней стороны тела буровато-серая. Лоб, горло и брюшко белые. На темени и через глаз идут черновато-бурые полоски. Грудь и верх брюшка ржаво-рыжие. *Г.* Трескучая глухая трель. *От.* Очень похож на короткоклювого зуйка, и в полевых условиях различить их практически невозможно. *Б.* Глинистые солонцеватые площади. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3, редко 4 охристо-глинистых или зеленоватых с бурыми пятнами яйца.

221. Короткоклювый зуек — Charadrius mongolus Pall.

В. Со скворца. *ОП.* Небольшой кулик с довольно длинными ногами и коротким клювом. Держится парами и стайками на земле. Окраска верхней стороны тела серовато-бурая. Лоб, горло, нижняя сторона шеи и брюшко белые. Поперек зоба идет широкая рыжая полоса. *Г.* Негромкое «тр-тр». *От.* Практически неотличим в полевых условиях от большеклювого зуйка, но в общем окраска более яркая. *Б.* Альпийские высокогорья и горная тундра. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Не изучено.

222. Большой песочник — Calidris tenuirostris Horsf.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Небольшой кулик с короткими ногами. Держится парами и стайками на земле. Общая окраска темная. Спина черная, с ржавыми и светлыми буроватыми пятнами. Низ тела белый. Бока груди и зоб в черных пятнах, образующих как бы полосы. *Г.* Довольно громкая щебечущая трель. *От.* В отличие от улитов, ноги более короткие, спина темной окраски. *Б.* Щебнистые россыпи в горной тундре. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 серовато-желтых с красновато-бурыми пятнами яйца.

223. Бекас — Gallinago gallinago L.

В. Со скворца. *ОП.* Небольшой кулик с короткими ногами и очень длинным клювом. Держится скрытно на земле. Вылетает обычно из-под ног с характерным крякающим звуком. Полет очень быстрый, разнообразный. Весной хорошо заметен во время тока, летает высоко, резко бросаясь вниз со своеобразным блеющим звуком. Окраска верха тела рыжевато-бурая, с продольными широкими темно-бурыми и светлыми, желтоватыми полосами. Хвост и надхвостье рыжие. Низ тела белый. На шее и на зобе частые мелкие бурые пестрины. Глаза большие, сдвинутые к затылку. *Г.* В момент взлета резкое «чжэч». Весной в воздухе во время тока — «блеяние» (происходящее от прохождения воздуха между распущенными перьями хвоста), на земле — своеобразные звуки «чэ-кэ-чэ-кэ-чэ-кэ». *От.* В отличие от дупеля, величина меньшая, хвост рыжий, брюшко чисто-белое. От азиатского бекаса издали неотличим. *Б.* Болота и мочажины с топким дном, болотистые берега рек и озер. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 желтовато- или оливково-бурых с темными, бурыми и серыми пятнами яйца.

224. Дупель — Gallinago media Lath.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Небольшой кулик с длинным клювом. Обычно вылетает из-под ног с характерным покряхтыванием. Полет прямой, птица летит низко над землей. При взлете хорошо видны белые перья по краям хвоста. Во время весеннего тока дупели собираются группами на кочковатых лугах. Ток начинается с заходом солнца и длится всю ночь. Верх тела рыжевато-бурый, с продольными широкими темными и светлыми полосами. Низ тела серовато-белый, с частыми поперечными пестринами. Глаза большие, сдвинутые к затылку. *Г.* При взлете — тихое покряхтывание. Во время тока — непередаваемые журчащие звуки. *От.* В отличие от бекаса, величина несколько бóльшая, по бокам хвоста перья белые, брюшко с поперечными серыми пестринами. *Б.* Сырые



луга и луговины среди мелколесья. *ХП*. Перелетная птица. *Гн*. Гнездо на земле. В кладке 4 серых или желтовато-серых с крупными бурыми пятнами яйца.

225. Бекас-отшельник, или горный дупель — Gallinago solitaria Hodgs.



В. Несколько крупнее скворца. *ОП*. Небольшой, с короткими ногами и длинным клювом кулик. Держится в одиночку, скрытно. Летит обычно низко над землей, довольно бесшумно, иногда взлетает на скалы. Окраска верхней стороны тела коричневато-бурая, со светлыми пятнышками. Зоб, грудь и бока тела беловатые, с частыми размытыми коричневато-серыми пестринами. Брюшко беловатое. *Г*. Во время тока издает резкое «жжжж-чок-чокчааа». *От*. В отличие от бекаса и дупеля, размер несколько более крупный, общая окраска темно-коричневая. *Б*. Берега горных рек, ручьев и болотца. *ХП*. Оседлая и кочующая птица. *Гн*. Гнездо на земле. В кладке 4 коричневатых с бурыми пятнами яйца.



226. Азиатский бекас — Gallinago stenura Bp.



В. Со скворца. *ОП*. Небольшой, с короткими ногами и длинным клювом кулик. Держится скрытно на земле. Хорошо заметен во время весеннего тока, когда с криком летает высоко в воздухе, то

резко взмывая вверх, то падая вниз. Окраска верхней стороны тела серовато-рыжеватая, с темными и светлыми полосами. Нижняя сторона тела белая, с частыми мелкими темными пестринами на зобе и груди. *Г.* Довольно громкое «чвинь-чвинь-чвинь-чинь-чинь», заканчивающееся резким звуком «вжжжи», напоминающим шум реактивного самолета. *От.* Очень похож на обыкновенного бекаса и в полевых условиях от него практически неотличим. Взяв птицу в руки, легко заметить, что крайние перья хвоста азиатского бекаса очень узкие. *Б.* Горная и равнинная тундра с болотцами и болотистая тайга. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 охристо-оливковых с бурыми пятнами яйца.

227. Лесной дупель — Gallinago megala Swinh.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Небольшой кулик с довольно короткими ногами и длинным клювом. Держится скрытно на земле. Хорошо заметен во время тока, когда летает высоко в воздухе с характерными звуками. Окраска верхней стороны тела серовато-бурая, со светлыми и темными пестринами. Нижняя сторона тела серовато-белая. Грудь и зоб покрыты мелкими продольными пестринами. *Г.* Негромкие звуки «чч-ви-чч-ви-ззиу» и «вак-вак-вак». *От.* В полевых условиях практически неотличим от азиатского и обыкновенного бекасов. Вблизи видно, что у него бурый с белой полоской на конце хвост. *Б.* Болота и заболоченные редколесья. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 зеленоватых с темными пятнами яйца.

228. Гаршнеп — Lymnocryptes minima Brünn.

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Мелкий кулик с довольно короткими ногами и длинным клювом. Держится скрытно на земле. Вылетает обычно из-под ног свечой вверх, а затем летит прямо. Окраска верхней стороны тела темная, рыжевато-бурая, со светлыми и черными продольными полосами. На спине тонкие волосовидные блестяще-черные перья. Нижняя сторона тела белая. Зоб серый от частых продольных сероватых пестрин. *Г.* В момент взлета тихое покрякивание. Во время тока гаршнеп летает высоко, издавая звуки, напоминающие топот копыт,— «топ-топ-топ... топ-топ-топ». *От.* В отличие от бекаса, размер меньший. *Б.* Торфяные болота, грязные топкие берега рек и озер. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4 буроватых с редкими темными пятнами яйца.









229. Сплюшка — Otus scops L.

В. Со скворца. *ОП.* Маленькая сова. На голове видны торчащие пучки перьев — «уши». Окраска охристо-серая, с темными и светлыми пестринами. Глаза желтые. Ночная птица. Во время полета видны довольно длинные широкие крылья и сравнительно короткий хвост. Днем обычно сидит на ветке дерева у самого ствола. *Г.* Громкий свист «тю-тюю» или «фю-тюю». *От.* В отличие от буланой совки, окраска более темная. В отличие от ошейниковой совки, нет рыжеватого «ошейника». *Б.* Лиственные и смешанные леса, парки и сады. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле, реже в расщелине скалы или в норе. В кладке 2—5 белых яиц.

230. Ошейниковая совка — Otus bakkamoena Penn.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Маленькая сова с хорошо заметными пучками перьев — «ушками» — на голове. Ночная и сумеречная птица. Общая окраска буровато-желтоватая, с темными широкими продольными и тонкими поперечными пестринами. На задней стороне шеи светлый, рыжеватый неполный «ошейник». Глаза желтые. *Г.* Двусложное «ху-кхуу». *От.* В отличие от обыкновенной и восточноазиатской совок имеет «ошейник». *Б.* Лиственные леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—6 белых яиц.

31. Восточноазиатская совка — Otus sunia Hodgs.



В. Со скворца. *ОП.* Маленькая сова с хорошо заметными пучками перьев —«ушами»— на голове. Ночная и сумеречная птица. На спине продольные светлые и темные полосы. Нижняя сторона тела покрыта мелкими поперечными и редкими продольными полосками. Общая окраска охристо-серая. *Г.* громкое «ке-вюю» и «тьюк-клок-клок». *От.* В отличие от ошейниковой совки, величина меньшая, рыжеватый «ошейник» отсутствует. *Б.* Лиственные и хвойные леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—6 белых яиц.

32. Буланая, или пустынная, совка — Otus brucei Hume

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Маленькая сова с хорошо заметными «ушками» на голове. Общая окраска светлая, пепельно-серая, с легким рыжеватым налетом. По всему телу разбросаны редкие продольные темные пестрины. На нижней стороне тела тонкие струйчатые темные поперечные полоски. Глаза желтые. Ночная птица. *Г.* Громкий крик «ух-ух», начинающийся трелью «цирр-а-ва». *От.* В отличие от обыкновенной сплюшки, окраска светлая. *Б.* Тугайные леса, сады и парки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 4—6 белых яиц.

33. Мохноногий сыч — Aegolius funereus L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Маленькая сова. В полете видны широкие длинные крылья и довольно короткий хвост. Голова большая, круглая, без «ушек». Ночная птица. Верхняя сторона тела шоколадного цвета, с большими белыми пятнами. Низ тела беловатый, с бурыми продольными пестринами. Глаза желтые. *Г.* Довольно громкое «уп-уп-уп-уп» и «ва-ва-ваа». *От.* От домового сыча отличается несколько большей величиной и более светлой, от белых пятен на спине, окраской. *Б.* Хвойные и смешанные леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—6 белых яиц.



234. Домовый сыч — Athene noctua Scop.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Маленькая сова с круглой головой без «ушек». Ведет ночной образ жизни, хотя часто видна и днем сидящей на освещенных солнцем местах. При виде человека начинает вытягиваться «столбиком» и кланяться. Во время полета видны широкие крылья и довольно короткий хвост. Окраска верхней стороны тела бурая, со светлыми пятнами. Низ тела беловатый, с продольными бурыми пестринами. *Г.* Негромкое «кувит» и «кьюкьюю». *От.* В отличие от мохноногого сыча, величина несколько меньшая. *Б.* Открытые пространства с оврагами, выходами скал, осыпями, а также различные постройки. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в норе, трещине скалы, на чердаках домов. В кладке 4—5 белых яиц.



235. Воробьиный сыч — Glaucidium passerinum L.

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Очень маленькая сова с круглой головой без «ушек». Ведет ночной образ жизни, хотя иногда встречается и днем. Сидя, часто поднимает кверху хвост и поворачивается из стороны в сторону. Во время полета видны широкие крылья и довольно короткий хвост. Окраска верхней стороны тела темно-бурая, с мелкими белыми пятнами. Низ тела белый, с бурыми продольными пестринами. *Г.* Громкий свист «тю-тю-тюю» и глухое «кувит».

От. В отличие от других сычей, размер меньший. *Б.* Высокоствольный лес. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 4—6 белых яиц.



236. Черный стриж — Apus apus L.

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Держится стаями. Почти все время проводит в воздухе, никогда не садясь на землю. Крылья длинные, узкие, серповидные. Полет быстрый. Хвост во время полета кажется клиновидным. Окраска буро-черная, горло грязно-белое. Ноги очень короткие, все четыре пальца направлены вперед. *Г.* Резкий визг «стрии-ии». *От.* В отличие от других стрижей, окраска темная, однотонная. В отличие от ласточек, крылья длинные, серповидные, хвост в полете клиновидный. *Б.* Скалы, каменные высокие постройки, иногда высокоствольный лес. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в трещине скалы, в щелях домов, реже в дуплах. В кладке 2—3 белых яйца.

237. Белопоясный стриж —Apus pacificus Lath.
Малый стриж —Apus affinis Gray

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Небольшие темные птицы, стаями носящиеся в воздухе. Крылья длинные, серповидные. Общая окраска черно-бурая. Горло и надхвостье белые. Малый стриж несколько мельче белопоясного. *Г.* Крик белопоясного стрижа — резкое «сии-иир», малого — «стри-ий». *От.* В отличие от черного стрижа, надхвостье белое. *Б.* Скалы, обрывы и каменные постройки. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнездо в трещине скалы или в нише постройки. В кладке 2—3 белых яйца.

238. Белобрюхий стриж — Apus melba L.

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Держится стаями. Почти все время находится в воздухе, не садясь на землю. Крылья длинные, серповидные. Ноги очень короткие. Окраска верхней стороны тела и полоса вокруг шеи глинисто-серые. Низ тела белый. *Г.* Громкий визг «скри-и-скрии-и». *От.* В отличие от других стрижей, брюхо белое. *Б.* Скалы, обрывы и каменные постройки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в трещине скалы или в нише постройки. В кладке 2—3 белых яйца.



239. Иглохвостый стриж — Hirundapus caudacutus Lath.

В. Со скворца. *ОП.* Держится стаями. Почти все время находится в воздухе, никогда не садясь на землю. Полет быстрый, стремительный. Крылья длинные, серповидные. Каждое перо хвоста имеет посредине острую выступающую иголочку. Лоб, горло и подхвостье белые. Спина глинисто-серая. Грудь и брюшко темно-бурые. Крылья и хвост блестящие, черные. *Г.* Негромкий, дребезжащий крик. *От.* В отличие от белобрюхого стрижа, брюхо темное. В отличие от других стрижей, размер крупный. *Б.* Лес и горные луга со скалами. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле или трещине скалы. В кладке 2—6 белых яиц.

ПТИЦЫ
ВЕЛИЧИНОЙ С ВОРОБЬЯ И МЕЛЬЧЕ



Цветные таблицы XXIV — XLVIII









240. Домовый воробей — Passer domesticus L.

В. Общеизвестна. *ОП.* Держится стайками в городах и поселках. У самца верх головы серый, горло и верхняя часть груди черные, от клюва через глаз к уху идет коричневая полоса, брюшко и полосы на плечах беловатые. Самки и молодые буроватые, с темными продольными пестринами. *Г.* Громкое «джив-джив». *От.* В отличие от полевого воробья, голова серая. В отличие от черногрудого воробья, на спине черный цвет отсутствует. Самки домового воробья от самок черногрудого воробья на расстоянии практически неотличимы. *Б.* Города, поселки, в Средней Азии — рощи, обрывы и овраги. *ХП.* Оседлая, в Средней Азии — перелетная птица. *Гн.* Гнездо в щелях домов, на деревьях, в норах. В кладке 5—6 матово-белых или серовато-голубых с бурыми крапинками яиц.

241. Черногрудый воробей — Passer hispaniolensis Temm.

В. С домового воробья. *ОП.* Держится стаями. Гнездится колониями. У самцов грудь и спина черные, верх головы, шеи и пестрины на спине коричневые, низ тела белый. Самки и молодые буро-серые, с более светлой нижней стороной тела. *Г.* Резкое «джив-джив». От. У самцов, в отличие от самцов домового воробья, спина и грудь черные. Самки и молодые от домового воробья на расстоянии прак-

тически неотличимы. *Б.* Посадки деревьев близ городов и поселков. *ХП.* В Средней Азии—перелетная, в остальных местах — оседлая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 5—6 голубовато-белых с серыми крапинками яиц.



242. Полевой воробей — Passer montanus L.

В. С домового воробья. *ОП.* Держится стаями. Шумливая заметная птица. Голова сверху ярко-коричневая, щеки и низ тела грязно-белые. Горло и пятно на щеке черные. Верхняя сторона тела охристо-коричневая, с темными продольными пестринами. *Г.* Резкое «чир-чирр». *От.* В отличие от домового воробья, верх головы коричневый, на щеках черные пятна. *Б.* Поселки и древесные насаждения вблизи них. Иногда селится в обрывах. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дуплах, под крышами домов, в норах. В кладке 5—6 матово-белых или сероватых с темными крапинками яиц.

243. Каменный воробей — Petronia petronia L.

В. С домового воробья. *ОП.* Держится стайками, парами и в одиночку. Полет быстрый, может планировать. Крылья в полете кажутся довольно длинными. Общая окраска буровато-серая. Над глазом светлая бровь. На зобе желтое пятно. По бокам хвоста белые пятна. *Г.* Громкое «ги-ю-иб». *От.* В отличие от короткопалого воробья, на зобе желтое пятно. *Б.* Сухие склоны гор, скалы, обрывы и осыпи. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в трещине скалы, в нишах обрывов и построек. В кладке 4—7 зеленовато-белых с буроватыми крапинками яиц.

244. Короткопалый воробей — Carpospiza brachydactyla Bp.

В. С домового воробья. *ОП.* Держится стайками на земле, травинках, кустиках и камнях. Окраска однотонная, серовато-бурая, без пестрин. На конце хвоста светлые пятна. *Г.* Протяжное чириканье. *От.* В отличие от каменного воробья, на зобе нет желтого пятна. В отличие от самки домового воробья, на хвосте светлые пятна. *Б.* Сухие пустынные горные склоны с редкой растительностью. *ХП.* Не описан. Вероятно, перелетная птица. *Гн.* Гнездо обычно на кустах. В кладке 4—5 белых с темными крапинками яиц.









245. Малый черноголовый дубонос — Eophona migratoria Hart.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками. Клюв желтый, большой, толстый. У самца общая окраска серая, подхвостье белое. Голова, крылья и хвост черные. У самки и молодых голова серая. *Г.* Довольно громкая трель. *От.* В отличие от большого черноголового дубоноса, размер меньше. *Б.* Лиственный и смешанный лес. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на кусте. В кладке 4—5 бледно-голубых с черноватыми пятнами яиц.

246. Щегол — Carduelis carduelis L.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая пестрая птица. Держится обычно стаями. Кормится на репейнике. На ночевку стаи собираются на высоких деревьях. Во время пения птица поворачивается из стороны в сторону. У взрослых птиц верх головы, крылья и хвост черные. Щеки, лоб, брюшко, пятна на хвосте и на кончиках крыльев белые. На крыльях поперечная желтая полоса. Вокруг клюва широкая красная полоса. Спина и пятна по бокам груди коричневые. У среднеазиатских (седоголовых) щеглов нет черного цвета на голове и вместо коричневого цвета буровато-серый. Молодые буровато-серые, с темными пестринами. Крылья и хвост у них такие же, как и у взрослых птиц. *Г.*

Звонкое «пить-пили-пить». Песня состоит из звонких трелей. *От.* У молодых, в отличие от молодых коноплянок, на крыльях желтые полосы. *Б.* Светлые лиственные и смешанные леса, сады и парки. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на кусте. В кладке 4—5 голубых с буро-красными крапинками яиц.

247. Зеленушка — Chloris chloris L.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками на деревьях, кустах и посевах подсолнечника и конопли. Кормится часто на земле. У самца спина зеленая, верх шеи серый, крылья и хвост черные, с желтыми полосами, нижняя сторона тела желто-зеленая. Самки и молодые сверху грязно-зеленые, снизу беловато-сероватые, с продольными темными пестринами. *Г.* Звонкая, журчащая трель. Песня состоит из нескольких трелей и заканчивается резким «ижжжж». *От.* В отличие от самки домового воробья, у самки спина зеленоватая, на хвосте желтые полосы. *Б.* Различные типы леса, сады и парки. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на кусте. В кладке 4—6 голубовато-белых с черноватыми или красноватыми крапинками яиц.

248. Китайская зеленушка — Chloris sinica L.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками на деревьях, кустах и земле. Голова серая, спина каштаново-коричневая. Грудь, зоб и бока рыжевато-желтые. Хвост и крылья черные, с желтыми полосами. *Г.* Своеобразная, звонкая трель. *От.* В отличие от обыкновенной зеленушки, спина каштановая. *Б.* Различные типы леса, сады и парки. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке обычно 5 голубоватых с фиолетовыми и коричневыми крапинками яиц.

249. Чиж — Spinus spinus L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится чаще всего стайками, реже в одиночку и парами. Кормится на ольхе и березе, подвешиваясь к их шишечкам. Летящие и сидящие птицы беспрерывно перекликаются. У самца спина зеленая, пятнышко на горле, шапочка на голове, крылья и хвост черные. Брюшко белое, все остальное оперение низа и полосы на крыльях и хвосте желтые. На боках неясные темные пестринки. Самка и молодые сверху зеленовато-серые, снизу грязно-белые, с продольными темными пестринами на груди. *Г.* Звонкое «тиилли-тиии». Песня довольно разнообразная, но основными в ней являются звуки «циви-тиви-циви-тивикее». *От.* В отличие от канареечного вьюрка, шапочка черная.

В отличие от чечетки, в оперении отсутствует красный цвет. *Б.* Гнездится в хвойных лесах. В остальное время чаще всего встречается в ольховых рощах. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на деревэ. В кладке 5—6 голубоватых с красноватыми крапинками яиц.

250. Коноплянка, или реполов— Acanthis cannabina L.



В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится парами и стайками на земле, на высокой траве и на кустах. Окраска спины коричневая, голова сверху серая, надхвостье розовато-серое. На крыльях и хвосте продольные широкие черные и узкие белые полоски. У самца по бокам груди большие красные пятна, на лбу малиновое пятно. У самок и молодых красного оперения нет. Низ беловатый, с продольными бурыми пестринами. У самца пестрин нет. *Г.* Щебечущие звуки «тк-тк-тк». Песня — звонкие свисты и щебетание. *От.* В отличие от чечетки, спина коричневая. *Б.* Опушки лесов, группы кустов, посадки вдоль дорог и сухие горные степи с кустами можжевельника. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 4—6 зеленовато-голубых с красновато-бурыми крапинками яиц.



251. Горная чечетка — Acanthis flavirostris L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится парами и стайками. Кормится на земле или на кустиках травы. Во

время полета кажется белой. Верхняя сторона тела буровато-серая, с продольными темными пестринами. Нижняя сторона тела белая. Зоб и грудь охристо-белые, с неясными продольными темными пестринами. Хвост довольно длинный, бурый, с белыми полосками по бокам. У самца надхвостье ярко-розовое. *Г.* Звонкое «пиии-ти-ти». Песня — набор щебечущих звуков. *От.* В отличие от обыкновенной чечетки, хвост более длинный, красной шапочки нет. В отличие от реполова, спина серая. *Б.* Весной и летом субальпийские и альпийские луга с кустарником, горная тундра. Осенью и зимой — горная степь. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 4—6 голубовато-зеленых с красновато-коричневыми крапинками яиц.

252. Чечетка — Acanthis flammea L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится обычно стайками. Кормится на земле, кустиках травы и на деревьях. Окраска верхней стороны тела серовато-бурая, с продольными темными пестринами. На горле, под клювом, черное пятно. Брюшко белое. Лоб и темя малиновые. На боках тела продольные темные пестрины. У самца грудь малиново-красная, у самок и молодых — беловатая, с темными пестринами. У пепельной чечетки спина светлая, пепельно-серая, надхвостье белое, а грудь у самцов нежно-розовая. *Г.* Звонкое «че-чет, че-чет» и «пи-ю-ии». Песня — набор щебечущих звуков. *От.* В отличие от коноплянки, спина серая. В отличие от горной чечетки, шапочка малиновая. *Б.* Северное редколесье и горная каменистая тундра. Осенью и зимой — самые различные ландшафты. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на кусте, иногда в щелях между камнями. В кладке 4—5 голубоватых с бурыми крапинками яиц.

253. Королевский, или корольковый, вьюрок — Serinus pusillus Pall.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится обычно стайками на земле и на кустах. У взрослых птиц лоб и темя огненно-красные. Горло, зоб, грудь и голова черные. У молодых голова коричневая, без красной шапочки. *Г.* Звонкая, мелодичная трель. Песня состоит из набора трелей и щебетания. *От.* В отличие от канареечного вьюрка, окраска черно-желтая и на голове красная шапочка. *Б.* Субальпийские луга со скалами и осыпями и верхняя часть лесного пояса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на кустах, деревьях и в трещинах скал. В кладке 3—5 бледно-голубых с коричневыми пятнышками яиц.











254. Канареечный вьюрок — Serinus canaria L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится парами и стайками на деревьях и на земле. Часто поет, даже в самые жаркие часы дня. Спина, крылья и хвост бурые, на спине продольные темные пестрины. Брюшко бловатое. Верх головы, горло и грудь зеленовато-желтые. У самки и молодых вместо желтого цвета грязно-беловатый, на груди продольные бурые пестрины. *Г.* Короткая трель. Песня состоит из коротких трелей. *От.* В отличие от чижа, черная шапочка отсутствует. *Б.* Рощи, редкие леса, сады и парки. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—5 голубоватых с бурыми пятнышками яиц.

255. Длиннохвостый снегирь — Uragus sibiricus Pall.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Довольно подвижная пушистая птичка с длинным хвостом и коротким толстым клювом. Держится парами, стайками, ловко лазая по кустам. Во время пения самец обычно взлетает на верхушки кустов. У самца спина серая или красновато-бурая, с продольными черноватыми пестринами, хвост и крылья черно-бурые, брюшко, полосы по бокам хвоста и на крыльях белые, на голове и горле серебристые перья, остальное оперение малиново-розовое. Самки и молодые серые, с продольными темными пестринами. *Г.* Звонкое «пью-инь». Песня состоит из трелей и свистов. *От.* В отли-

чие от сибирской чечевицы, размеры мелкие, хвост длинный. *Б.* Заросли кустарников по берегам рек. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 4—5 сине-зеленых с темными пятнышками яиц.

256. Сибирская чечевица — Carpodacus roseus Pall.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками. Кормится обычно на земле, реже на деревьях и кустах. Во время пения самец распускает крылья, втягивает в плечи шею, трепещет крыльями и подергивает поднятым хвостом. Окраска самца в основном малиново-розовая. Спина буровато-красная, с темными продольными пестринами. Крылья и хвост черно-бурые, со светлыми беловатыми полосками по бокам хвоста и поперек крыльев. Голова и горло серебристые. Брюшко белое. Самки и молодые серые, с красновато-оранжевым налетом и продольными бурыми пестринами на спине и нижней стороне тела. *Г.* Короткий тихий свист. Песня — повторение этих свистов. *От.* В отличие от длиннохвостого снегиря, величина бóльшая, хвост более короткий. *Б.* Во время гнездования — верхняя часть леса в горах, в остальное время — различные типы леса. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* На территории СССР кладки не описаны.

257. Снегирь — Pyrrhula pyrrhula L.

В. С воробья. *ОП.* Держится весной и летом парами, в остальное время года — стайками. Кормится на деревьях и на земле. У самца верх головы, крылья, хвост и пятно под клювом блестяще-черные, спина голубовато-серая, подхвостье и надхвостье белые, нижняя сторона тела красная. У самок и молодых вместо красного цвета серовато-бурый, у молодых на голове нет черной шапочки. У восточносибирских (серых) снегирей цвет нижней стороны тела (у самцов) серый, у курильских снегирей он розовато-серый. *Г.* Довольно громкий свист «фю-фью». Песня — набор скрипучих звуков. *От.* В отличие от чечевиц, на голове черная шапочка, спина голубовато-серая. *Б.* Хвойные и смешанные леса. Осенью и зимой — самые разнообразные ландшафты. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—6 светло-голубых с красновато-бурыми крапинками яиц.

258. Чечевица — Carpodacus erythrinus Pall.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку и парами. У взрослого самца спина, хвост и крылья буро-красноватые, брюшко розовато-белое, голова, зоб и грудь ярко-красные. Самка и молодые сверху серовато-зеленоватые, снизу грязно-белые, с продольными буроватыми пестринами. *Г.* Негромкое









«чуин». Песня — набор негромких свистов и громкое «чиувичиу». *От.* В отличие от других чечевиц, размер несколько меньший, у самцов ярко-красная окраска. В отличие от самки зеленушки, у самки на хвосте нет желтого цвета. *Б.* Опушки лесов, кустарники среди лугов и пойменные заросли. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кустах или на дереве. В кладке 5—6 зеленовато-голубых с бурыми крапинками яиц.

259. Розовая чечевица — Carpodacus rhodochlamys Bp.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится обычно в густых кустах, иногда на деревьях и на земле. Общий тон окраски самца сиренево-розовый. Самки и молодые буровато-серые, с продольными темно-бурыми пестринами на нижней стороне тела. *Г.* Резкое «ччижжж» или «ччуэей». *От.* В отличие от других чечевиц, самец сиреневато-розоватый. Самка, в отличие от самки большой чечевицы, меньшего размера. *Б.* Кустарники на субальпийских и альпийских лугах и верхняя часть леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на кустах или в трещинах скал. В кладке 4—6 голубых с коричневыми крапинками яиц.

260. Пустынный снегирь — Bucanetes githagineus Licht.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится стайками на земле, на скалах и реже

на мелких кустиках. Летает низко над землей. Окраска однотонная, глинисто-серая. Брюшко белое, бока груди и крылья розовые. *Г.* Частое «кэ-кэ-кэ». *От.* В отличие от буланого вьюрка, размер меньший, в окраске отсутствует черный цвет. *Б.* Пустынные и полупустынные участки гор с выходом скал и скудной растительностью. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в щели скалы или обрыва и в кучах камней. В кладке 4—5 светло-голубых с черными пятнышками яиц.

261. Буланый вьюрок — Rhodospiza obsoleta Licht.

В. С воробья. *ОП.* Держится весной парами, в остальное время — стайками на земле и на кустах. Общая окраска нежно-палевая. На крыльях широкая розовая и узкие черные и белые полосы. *Г.* Тихий посвист «финк-финк-финк». Песня — набор громких трелей. *От.* В отличие от пустынного снегиря, хвост и крылья черные. *Б.* Пустынные и полупустынные участки с кустарниками, чаще по берегам речек и арыков. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 5—6 светло-голубых с темными отметинками яиц.

262. Краснокрылый чечевичник — Rhodopechys sanguinea Gould

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится стайками на земле, иногда садится на кусты и деревья. Во время полета видны довольно длинные и широкие, черные, с розовой широкой полосой крылья. Верхняя сторона тела, бока и голова коричневые, с черноватыми пятнами. На голове черная шапочка. Хвост черный, с белыми продольными полосками. Перья вокруг клюва и перед глазом красные. Грудь и брюшко белые, с розовым налетом. Самка и молодые более тусклые. *Г.* Громкий флейтовый свист и негромкое чириканье. *От.* В отличие от буланого вьюрка, величина бо́льшая, окраска темная. *Б.* Каменистые степные и полупустынные участки гор со скудной растительностью. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* В кладке 4—5 бледно-голубых с коричневыми пятнышками яиц.

263. Зяблик — Fringilla coelebs L.

В. С воробья. *ОП.* Держится парами и стайками. Кормится на земле, реже на деревьях. У самца верх головы голубой, лоб черный, щеки, горло, зоб и грудь коричневато-красноватые. Спина каштановая, надхвостье зеленое. Хвост и крылья темно-бурые. По краям хвоста и поперек крыльев широкие белые полосы. Самка и молодые буровато-серые, с более светлой нижней стороной тела, хвост и крылья окрашены у них так же, как у самца. *Г.* Звонкое «пиньк-пиньк», «рю-рю-рю» или «фью-фью-фью». Песня — громкая трель «фьит-фьит-ля-ля-



Таблица 24

1. Лесной жаворонок, или юла. 2. Хохлатый жаворонок. 3. Пустынный жаворонок. 4. Полевой жаворонок. 5. Рогатый жаворонок. 6. Малый жаворонок.



Таблица 25

1. Лесной конек. 2. Полевой конек. 3. Горный конек. 4. Степной конек. 5. Краснозобый конек.









вичиу-кик». *От.* В отличие от вьюрка, в окраске нет оранжевых тонов. *Б.* Различные типы леса, сады и парки. *ХП.* Перелетная, на юге страны зимующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—7 голубовато-зеленых с розовато-фиолетовыми пятнами яиц.

264. Вьюрок, или юрок — Fringilla montifringilla L.

В. С воробья. *ОП.* Весной и летом держится парами, осенью и зимой — большими стаями. Кормится на земле, реже на деревьях. У самца голова, крылья и хвост черные. Надхвостье, брюшко и полосы на крыльях белые. Грудь, плечи и узкие полоски на крыле оранжевые. Самки и молодые более тусклые, у них вместо оранжевых тонов охристо-желтоватые. *Г.* Резкое «чжшээ». Во время полета — короткие звуки «тк-тк». Песня — резкое «чжжжж». *От.* В отличие от зяблика, в окраске есть оранжевые тона. *Б.* Различные типы леса, обычно с преобладанием березы. *ХП.* На севере перелетная, на юге зимующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—6 голубовато-зеленых с буроватыми крапинками яиц.

265. Гималайский вьюрок — Leucosticte nemoricola Hodgs.

В. С воробья. *ОП.* Держится парами и стаями. Кормится на земле. Общая окраска темная, буро-серая, на спине темные и охристые пестрины. На крыле светло-буроватые поперечные полоски. Хвост на

конце глубоко вырезан. *Г.* Звонкое «чууии» и негромкое чириканье. *От.* В отличие от самки домового воробья, окраска более темная, на хвосте глубокий вырез. *Б.* Субальпийские и альпийские луга с выходами скал и осыпями. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на кустике, под камнем, в норке. В кладке 3—5 белых яиц.



266. Сибирский вьюрок — Leucosticte arctoa Pall.

В. С воробья, а живущий на Командорских островах — со скворца. *ОП.* Держится стайками. Кормится на земле. Окраска темная, черно-бурая, с розовыми участками на брюхе, надхвостье и на крыльях. У саянских и алтайских птиц крылья и хвост серо-белые. *Г.* Громкое чириканье. *От.* В отличие от гималайского вьюрка, окраска более темная, с красноватыми тонами. *Б.* Субальпийские и альпийские луга и горные тундры с выходами скал и осыпями. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо в трещине скалы. В кладке 3—5 белых яиц.

267. Альпийский, или снежный, вьюрок — Montifringilla nivalis L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится стайками и парами на камнях, скалах и на земле. В полете кажется белым. Окраска спины бурая, крылья и хвост темно-бурые, с широкими белыми полосами. На горле черное пятно. Весь низ тела белый. Молодые буровато-серые. *Г.* Гнусавое «ввууэй». *От.* В отличие от жемчужного вьюрка, низ тела белый. *Б.* Скалы, осыпи и постройки среди субальпийских и альпийских лугов. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в трещинах скал и щелях построек. В кладке 4—5 белых яиц.

268. Жемчужный вьюрок — Leucosticte brandti Bp.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится стаями на камнях, скалах и на земле. В полете кажется почти белым. Общая окраска светло-серая. Крылья и хвост бурые, на сгибе крыла мелкие розовые перышки. Лоб черный. На крыльях светлые поперечные полосы. *Г.* Громкое чириканье. *От.* В отличие от снежного вьюрка, низ тела серый. *Б.* Верхний пояс гор. Альпийские луга, скалы, осыпи и морены ледников. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в нишах под камнями. В кладке 3—4 белых яйца.









269. Клёст-еловик —
Loxia curvirostra L.
Клёст-сосновик —
Loxia pytyopsittacus Borkh.
Белокрылый клёст —
Loxia leucoptera Gm.

В. С воробья. *ОП.* Держатся стаями в хвойных лесах. Во время полета все время перекликаются, сев на дерево, замолкают. Во время кормежки подвешиваются к шишкам, срывают их и часто роняют. Окраска самцов оранжево-красная, у белокрылого клеста — малиново-красная. Крылья и хвост буро-черные, а у белокрылого клеста — с двумя поперечными белыми полосами. Самки зеленовато-желтые. Молодые серовато-зеленые сверху и грязно-белые с продольными бурыми пестринами снизу. Верхняя и нижняя половинки клюва перекрещиваются на конце. У сосновика клюв очень массивный. *Г.* Звонкое «кле-кле-кле». Песня — щебетание с отдельными громкими свистами. *От.* В отличие от щура, величина меньшая, клюв перекрещенный, хвост относительно короткий. *Б.* Хвойные леса. *ХП.* Кочующие птицы. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—4 зеленовато-голубоватых с бурыми крапинками яйца.

270. Просянка —
Emberiza calandra L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками. Кормится на земле. Часто сидит на вершинках кустов или невысоких деревьев. Окраска сверху серовато-бурая, с тем-

ными и светлыми пестринами. Низ тела грязно-белый, с темно-бурыми продольными пестринами на груди и боках. *Г.* Резкое «цик-цик». Песня — короткая трель. *От.* В отличие от других овсянок, размер более крупный. *Б.* Открытые пространства с отдельными группами кустов. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле и в кустах. В кладке обычно 5 серовато-белых с розовым оттенком и бурыми пятнами и завитками яиц.

271. Обыкновенная овсянка — Emberiza citrinella L.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками. Кормится на земле. Хвост довольно длинный, буро-черный, с белыми полосками по бокам. Поет, сидя почти неподвижно на ветке, вершине куста или дерева. У самца спина и пятна по бокам груди коричневые, голова и нижняя сторона тела желтые, с редкими коричневыми пестринами на боках. У самки и молодых вместо желтого цвета желтовато-серый. Верх тела сероватый. На нижней стороне тела продольные бурые пестрины. *Г.* Негромкое «цик-цик». Песня — звонкое «зинь-зинь-зинь-зиии-циии». *От.* В отличие от белошапочной овсянки и просянки, низ тела желтый. *Б.* Опушки лесов, поляны и вырубки. Осенью и зимой вместе с воробьями держится у поселков и на скотных дворах. *ХП.* Перелетная и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—5 розовато-белых с ржаво-бурыми пятнами и завитками яиц.

272. Белошапочная овсянка — Emberiza leucocephalos Gm.

В. С воробья. *ОП.* Держится парами и стайками на деревьях, кустах и на земле. Кормится на земле. Хвост довольно длинный, с белыми полосами по бокам. Спина, грудь и щеки коричневые. Хвост и крылья бурые. Брюшко и шапочка на голове белые. Самка и молодые более тусклые. *Г.* Негромкое «цик-цик». Песня — «тинь-тинь-тиии». *От.* В отличие от красноухой овсянки, на голове белая шапочка. *Б.* Светлые леса, опушки и поляны. *ХП.* Перелетная и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—5 серовато-белых с ржаво-бурыми пятнами и завитками яиц.

273. Красноухая овсянка — Emberiza cioides Brandt

В. С воробья. *ОП.* Держится парами и стайками. Самец поет, сидя на вершине куста, дерева или травинки. Хвост довольно длинный, с белыми полосами по бокам. У самца верх головы, щеки, полоса через глаз, узкая полоска от края клюва вниз, широкий «ошейник» на груди и спина каштаново-рыжие. Горло, полоса над глазом, шея и брюшко белые. Самка и молодые более тусклые. *Г.* Негромкое «цик-цик». *От.*











В отличие от белошапочной овсянки, на голове нет белой шапочки. *Б.* Разреженные леса и открытые участки с разбросанными группами кустов. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле и в кустах. В кладке 4—5 грязно-белых с темными пятнами и завитками яиц.

274. Желчная овсянка — Emberiza bruniceps Brandt

В. С воробья. *ОП.* Держится парами и стайками. Самец поет, сидя на высокой травинке, кустике или на проводе. Кормится обычно на земле. У самца голова ярко-рыжая, спина зеленовато-коричневая, нижняя сторона тела ярко-желтая. Самки и молодые желтовато-серые, с более светлой нижней стороной тела. *Г.* Негромкое «цик-цик». Песня — громкое «чуть-чуть-чуть-три-уриури». *От.* Самка очень похожа на самку черноголовой овсянки, но в одних местах они почти никогда не встречаются. *Б.* Открытые степные пространства. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте или на дереве. В кладке 4—5 зеленовато-белых с темными крапинками яиц.

275. Рыжая овсянка — Emberiza rutila Pall.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится парами и небольшими стайками. У самца голова и спина яркие, каштаново-рыжие, нижняя сторона тела бледно-желтая. Самка и

молодые сверху зеленовато-серые, снизу желтовато-белые. На голове, груди и боках продольные темные пестрины. *Г.* Негромкое «тик-тик». Песня — звонкое «тей-тьой-тьоой-ойой-йой-йой си-си-си». *От.* Самки и молодые на расстоянии практически неотличимы от самок и молодых дубровника. *Б.* Тайга с зарослями багульника и голубики. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3—4 белых с серовато-голубым оттенком и бурыми пятнами и завитками яйца.

276. Дубровник — Emberiza aureola Pall.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку или парами, реже небольшими стайками. Во время пения самец сидит на высокой травинке или кустике. У самца верх тела каштановый, щеки и горло блестяще-черные. Поперек зоба проходит коричневая полоса. Крылья и хвост темно-бурые, на плечах две широкие белые полоски. Самки и молодые сверху серовато-бурые с темными пестринами, снизу желтоватые. *Г.* Негромкое «тик-тик». Песня состоит из нескольких красивых свистов — «филю-филю-фили-фили-фили-фили-тью-тью». *От.* Самки и молодые в полевых условиях почти неотличимы от самок и молодых рыжей овсянки. *Б.* Луга, гари с редкими березами, торфяные болота, ивняки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—5 зеленовато-серых или оливково-голубых с темными крапинками яиц.

277. Овсянка Стюарта — Emberiza stewarti Blyth

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится парами и стайками. Кормится на земле. У самца голова голубовато-серая, горло и полоса через глаз черные, спина и полоса поперек груди каштановые. Крылья и хвост бурые, по бокам хвоста белые полоски, нижняя сторона тела охристо-белая. Самка и молодые сверху коричневато-бурые, снизу беловато-охристые, с продольными бурыми пестринами. *Г.* Негромкое «цирк-чрк». Песня — короткая звонкая трель. *От.* Самка и молодые похожи на самок и молодых горной овсянки, но несколько мельче. *Б.* Скалистые склоны широких ущелий с редкими деревьями и кустарником. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке обычно 4 серовато-белых с серыми и коричневыми пятнами яйца.

278. Горная овсянка — Emberiza cia L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится стайками. Кормится на земле, часто в загонах для скота. Хвост довольно длинный, темно-бурый, с белыми полосками по бокам. Грудь и брюшко рыжевато-коричневые, голова и зоб серые. Над глазом светлая полоса, окаймленная сверху черным. От клюва через глаз, окаймляя щеки и кончаясь опять у клюва, проходит черная полоска.











У самки и молодых окраска тусклая и полоски на голове почти не видны, а на груди есть продольные узкие бурые пестрины. *Г.* Негромкое «циии-цик». Песня — короткая сухая трель. *От.* В отличие от скалистой овсянки, окраска более яркая, величина бо́льшая. Самки и молодые больше самок и молодых овсянки Стюарта. *Б.* Открытые пространства гор с выходами скал, осыпями и редкой растительностью. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—5 сероватобелых с темными пятнами и завитками яиц.

279. Садовая овсянка — Emberiza hortulana L.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками. Кормится на земле. Поет, сидя на дереве или на вершине куста. У самца голова и грудь светло-серые, горло желтое, остальное оперение коричневатое, на спине продольные бурые пестрины. Хвост буро-черный, с белыми полосками по бокам. Клюв красноватый. Самка и молодые окрашены бледнее, на груди у них бурые продольные мелкие пестрины. *Г.* Негромкое «цик-цик». Песня — громкое «тью-тью-тьюррр». *От.* Самка и молодые в полевых условиях почти неотличимы от самки и молодых скалистой овсянки. *Б.* Поймы рек и открытые пространства с редкими кустами и деревьями. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—6 грязнобелых с темными пятнами яиц.

280. Скалистая овсянка — Emberiza buchanani Blyth

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками. Кормится на земле. Верх головы и шея серые. Спина серовато-бурая, нижняя сторона тела светлая, рыжевато-коричневатая. Клюв красноватый. *Г.* Негромкое «ции-цик». *От.* На расстоянии почти неотличима от самки садовой овсянки. *Б.* Каменистые склоны гор с редкой растительностью. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—5 голубовато-зеленых с бурыми и серыми пятнами яиц.

281. Желтогорлая овсянка — Emberiza elegans Temm.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками. Хорошо заметен небольшой хохолок на голове. У самца верх головы, полоса от клюва через глаз к затылку и поперечная полоса на груди черные. Нижняя сторона тела, полоса над глазом и полосы по бокам хвоста белые. Горло желтое. Спина коричневатая, с продольными бурыми пестринами. Самка и молодые окрашены более тускло, у них вместо черного цвета бурый. *Г.* Негромкое «ции-ции». Песня — звонкие красивые трели. *От.* В отличие от желтобровой овсянки, горло желтое, на груди черная полоса. *Б.* Молодые лиственные леса и луга. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—5 грязно-белых с буроватыми крапинками яиц.

282. Желтобровая овсянка — Emberiza chrysophris Pall.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и реже стайками. Спина коричневатая, с продольными темными пестринками. Крылья и хвост черно-бурые, над глазом желтая бровь и белая полоска посреди головы сверху. Горло белое. Нижняя сторона тела грязно-белая, с продольными темными пестринами по бокам. *Г.* Нежный свист. *От.* В отличие от желтогорлой овсянки, горло белое. *Б.* Тайга с зарослями кустов. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4 серовато-белых с серыми и бурыми завитками и штрихами яйца.

283. Ошейниковая овсянка — Emberiza fucata Pall.

В. С воробья. *ОП.* Держится парами и стайками. Кормится обычно на земле. Поющий самец сидит на стебле высокой травинки или на вершине куста. Спина коричневая, с темными пестринами. Голова и шея серые, с черноватыми пятнышками. Нижняя сторона тела охристо-белая. Поперек груди рыжая полоса и полоса из черных пятен. *Г.* Своеобразная трель. *От.* В отличие от других овсянок, на груди двойная полоса. *Б.* Открытые пространства с группами кустов и деревьев. *ХП.*











Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке обычно 5 грязно-белых с буроватыми крапинками яиц.

284. Овсянка-крошка — Emberiza pusilla Pall.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится в одиночку и парами на кустиках, деревьях и на земле. Самец поет, сидя на вершине или на выступающей ветке куста или дерева. Верхняя сторона тела серовато-бурая, с продольными темными пестринами. Нижняя сторона белая, с продольными пестринами на груди и боках. Голова рыжая, с черной полосой над глазом. *Г.* Негромкое «циик-цик». Песня — довольно громкое «ти-ти-ти-тиирч». *От.* В отличие от других овсянок, размер меньше, на рыжей голове черная полоска. *Б.* Разреженные леса и лесотундра. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—6 беловатых с темными пятнышками яиц.

285. Полярная овсянка — Emberiza pallasi Cab.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится в одиночку или парами на кустах и на земле. Издали самец кажется белым, с черной головой. Спина буровато-серая, с черными продольными пестринами. Хвост и крылья темно-бурые. По бокам хвоста белые полоски. Весь низ тела белый. У самки и молодых нет черного цвета на голове. *Г.* Тихое «ци-си-ци-си». *От.* В отличие от камышовой овсянки, размер меньше. В от-

личие от рыжешейной овсянки, верх шеи серый. *Б.* Кустарники в тундре и по берегам рек в тайге. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле или на кусте. В кладке 4—5 беловатых с темными пятнышками яиц.

286. Камышовая овсянка — Emberiza schoeniclus L.

В. С воробья. *ОП.* Держится в зарослях по берегам водоемов. У самца голова черная, спина рыжевато-коричневая, с черно-бурыми продольными пестринами. Хвост и крылья бурые, по бокам хвоста белые полоски. Нижняя сторона тела белая. У самок и молодых нет черного оперения на голове. *Г.* Негромкое «ции-циииик». Песня — довольно громкое «шри-шри-тири-тири» или «ти-ти-тирич». *От.* В отличие от полярной овсянки, величина бóльшая. *Б.* Заросли по берегам водоемов. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 4—6 охристых или светло-оливковых с темными пятнами и завитками яиц.

287. Рыжешейная овсянка — Emberiza yessoënsis Swinh.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками в кустарнике или в высокой траве. Во время пения взлетает на вершину куста или на высокую травинку. У самца голова и горло черные. Спина черная, с коричневыми пестринами. Верх шеи и надхвостье каштаново-рыжие. Крылья и хвост бурые. По бокам хвоста белые полоски. Нижняя сторона тела белая, с легким рыжеватым налетом. У самки вместо черного цвета бурый. *Г.* Негромкое «цииии-циик». Песня — двусложная тихая трель. *От.* В отличие от камышовой и полярной овсянок, шея рыжая. *Б.* Болотистые, покрытые кустарником и высокой травой пространства. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте или в куртинке травы. В кладке обычно 5 охристо-беловатых с бурыми крапинками и черточками яиц.

288. Черноголовая овсянка — Emberiza melanocephala Scop.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и небольшими стайками. Кормится обычно на земле. Самец поет, сидя на вершине куста, на высокой травинке или на проводе. У самца верх и бока головы черные, спина коричневая, крылья и хвост буровато-серые. Вся нижняя сторона тела ярко-желтая. Самка и молодые сверху желтовато-серые, снизу грязно-белые. *Г.* Негромкое «цик-ци». Песня — звонкое «тит-ити-тиуриури». *От.* Самки и молодые очень похожи на самок и молодых желчной овсянки, но вместе эти виды не встречаются. *Б.* Открытые степные пространства. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле или в кустах. В кладке 4—5 голубовато-белых с темными крапинками яиц.



289. Овсянка-ремез — Emberiza rustica Pall.

В. С воробья. *ОП.* Скрытная птичка. Держится на земле и в кустах. У самца голова черная, горло и полоса над глазом белые, спина коричневая, с темными продольными пестринами, нижняя сторона тела белая, на груди поперечная коричневая полоса, на боках буровато-коричневые продольные пестрины. Самки и молодые окрашены тускло. *Г.* Негромкое «тит-ти». Песня — звонкая трель. *От.* В отличие от таежной овсянки, горло и низ тела белые. *Б.* Тайга. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле, реже на кусте или дереве. В кладке 4—5 серых с темными пятнами яиц.





290. Таежная, или черногорлая, овсянка — Emberiza tristrami Swinh.

В. С воробья. *ОП.* Скрытная птица. Окраска темная, рыжевато-бурая. Голова черная, со светлыми полосками над глазом, от клюва к шее и сверху посредине головы. Самка и молодые окрашены более тускло. *Г.* Тихое «цинн-цинн». *От.* В отличие от овсянки-ремеза, низ тела охристый, горло черное. *Б.* Елово-пихтовая тайга. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кустах. В кладке 4 розоватых с темными пятнами и штрихами яйца.

291. Японская овсянка — Emberiza variabilis Temm.



В. С воробья. *ОП.* Держится в чаще кустарников и зарослях карликового бамбука. Общая окраска взрослого самца темно-серая, с более темной головой и более светлой нижней стороной тела. На спине продольные темные широкие пестрины. Самка и молодые заметно бурее, с рыжеватым налетом на спине. *Г.* Негромкое «циии». Песня — короткое «юи-циие-циие». *От.* В отличие от седоголовой овсянки, на нижней стороне тела нет желтого, а на хвосте — белого цвета. *Б.* Различные типы леса и заросли карликового бамбука. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 5 белых с красновато-серыми черточками яиц.

292. Седоголовая овсянка — Emberiza spodocephala Pall.

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками. Самец поет, сидя на вершине или выступающей ветке куста. У него голова и зоб темно-серые, спина бурая, с продольными темными пестринами, хвост бурый, с белыми полосками по бокам, грудь и брюшко бледно-желтые. Самка и молодые сверху буровато-серые, снизу желтоватые, с темными продольными пестринами. *Г.* Негромкое «тик-тик». Песня — «ти-ти-тиии». *От.* В отличие от японской овсянки, брюшко желтое. *Б.* Опушки лесов и заросли по берегам рек. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле или на кусте. В кладке 4—5 бледно-голубых с буроватыми пятнами яиц.

293. Рогатый жаворонок — Eremophila alpestris L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится парами и стайками. По земле бегает. Окраска верхней стороны тела розовато-серая. Лоб, полоса через глаз к уху и поперек зоба черные. Горло желтоватое или белое. По бокам головы торчащие тонкие черные перья — «рога». Весь низ тела белый. *Г.* Тихий приятный свист «фьи-фи-тити». Песня — набор щебетаний с включением тихих свистов. *От.* В отличие от других жаворонков, на голове «рога». *Б.* Открытые степные пространства, тундра и горная тундра, альпийские и субальпийские луга. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3—5 грязно-белых с темными пятнами яиц.



294. Полевой жаворонок — Alauda arvensis L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится на земле. Полет медленный, трепещущий. Поет чаще всего в воздухе, трепеща на месте. Верхняя сторона тела глинисто-серая, с темными крупными пестринами. Нижняя сторона тела белая, на груди рыжеватая с мелкими бурыми продольными пестринами. По бокам хвоста белые полоски. *Г.* Довольно тихое «чри-ик» или «чрр-ик». Песня — звонкие трели. *От.* В отличие от хохлатого жаворонка, на голове нет длинного хохолка. *Б.* Открытые пространства и посевы. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—5 сероватых или красноватых с темными пятнышками яиц.

295. Хохлатый жаворонок — Galerida cristata L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится стайками на земле. Поет не только в воздухе, но и на земле. Хорошо заметен длинный заостренный хохол на голове. Полет медленный, трепещущий. Окраска буровато-серая, с продольными бурыми пестринами. *Г.* Мелодичное «ири-трирриэ» и тихое «джюи». Песня — набор тихих трелей. *От.* В отличие от других жаворонков, на голове длинный острый хохол. *Б.* Открытые пространства, обычно вблизи поселков. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3—5 беловатых с темными пятнами яиц.



296. Лесной жаворонок, или юла — Lulula arborea L.



В. С воробья. *ОП.* Держится на земле, иногда садится на деревья и кусты. Поет высоко в воздухе или сидя на дереве. Полет медленный, трепещущий. Верхняя сторона тела коричневато-бурая, с продольными темными пестринами. Нижняя сторона белая, на груди охристая, с продольными мелкими бурыми пестринами. Над глазом светлая бровь. На голове небольшой хохолок. *Г.* Короткие трели. Песня очень громкая, звучная, состоящая из чистых свистов «юли-юли-юли-юли-юли-юли-юлю». *От.* В отличие от полевого жаворонка, величина меньшая. *Б.* Опушки лесов и горная степь с отдельными кустами. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 5—6 белых с буроватыми или красноватыми крапинками яиц.

297. Малый жаворонок — Calandrella cinerea Gm.
Серый жаворонок — Calandrella rufescens Vieill.
Тонкоклювый жаворонок — Calandrella acutirostris Hume

В. С воробья. *ОП.* Держатся парами и стайками на земле. Поют, поднимаясь рывками вверх, в воздухе, иногда сидя на земле. Окраска верхней стороны тела глинисто-серая, с неясными темными пестринами. Нижняя сторона тела охристо-беловатая. По бокам шеи нерезкие темные пятна. По бокам бурого хвоста светлые полоски. *Г.* Сухая короткая трель. Песня — довольно громкое «вит-вит-ти-вит-ти-вит-тит-ири-тит-ти-ти». *От.* Между собой в полевых условиях не различаются. В отличие от других жаворонков, размер меньший. *Б.* Сухие открытые пространства и посевы. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда на земле. В кладке по 4—5 беловатых с темными крапинками яиц.

298. Пустынный, или вьюрковый, жаворонок — Ammomanes deserti Licht.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится парами и стайками на земле. Окраска однотонная, глинисто-серая, несколько более светлая на нижней стороне тела. *Г.* Короткое щебетание и свист. *От.* В отличие от других жаворонков, окраска однотонная. *Б.* Пустынные каменистые участки. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Кладки на территории СССР не описаны.









299. Белоножка, или пегий дрозд — Enicurus scouleri Vig.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая черно-белая пестрая птичка. Держится в одиночку и парами по бурным каменистым речкам. Может пролетать сквозь небольшие водопады. Полет легкий, трепещущий. Крылья широкие. Хвост во время полета распущен. Сидящая птица полуопускает крылья и все время покачивает хвостом. Лоб, широкая полоса на крыле, широкие полосы по бокам хвоста, надхвостье и брюшко белые. Остальное оперение черное. Ноги синевато-белые. Хвост глубоко вырезан посредине. *Г.* Звонкое «циииии». *От.* В отличие от белой трясогузки, хвост короткий. В отличие от оляпок, величина меньшая, окраска черно-белая. *Б.* Горные речки с водопадами и большими камнями. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в камнях и трещинах скал, у водопадов. В кладке 3—4 белых с красноватыми пятнышками яйца.

300. Древесная трясогузка — Dendronanthus indicus Gm.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая птичка с довольно длинным хвостом, которым она все время покачивает. Держится на деревьях. Верхняя сторона тела зеленовато-серая. Нижняя сторона тела и полоски по бокам хвоста белые. На зобе две поперечные черные полоски. *Г.* Довольно громкое «цень-пень».

От. В отличие от белой трясогузки, величина меньшая. *Б.* Светлые леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 5 голубовато-серых с бурыми пятнами яиц.

301. Белая трясогузка — Motacilla alba L.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая птичка с очень длинным прямым хвостом, которым она все время покачивает. Держится на земле, передвигаясь по ней мелкими шагами. Часто садится на деревья и крыши домов. Спина серая. Шапочка на голове, горло, зоб, крылья и хвост черные. Вся нижняя сторона тела, бока головы, полоски на крыльях и по бокам хвоста белые. У среднеазиатских и дальневосточных белых трясогузок спина, щеки, верх головы, горло и грудь черные. У птиц осенью остается только черное пятно на зобе. Молодые птицы серые. *Г.* Громкое «цитицюри» и короткое «чтреличь». *От.* В отличие от древесной трясогузки, величина бо́льшая. *Б.* Поймы и берега рек, поселки и города. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в щелях скал, в дуплах и полудуплах, под крышами домов и между камнями. В кладке 5—6 белых с серыми пятнами яиц.

302. Горная трясогузка — Motacilla cinerea Tunst.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая птичка с очень длинным хвостом, которым она все время покачивает. Держится по берегам рек и ручьев, иногда садится на деревья и провода. Окраска верхней стороны тела серая, надхвостье желтое. Нижняя сторона тела желтая, брюшко и горло беловатые. У самца весной горло черное. Хвост черный, с белыми полосами по бокам. *Г.* Громкое «цицитт». *От.* В отличие от желтой трясогузки, хвост очень длинный, надхвостье желтое. *Б.* Берега горных рек и ручьев. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в трещине скалы, между камнями, в нависших над водой корнях дерева. В кладке 4—6 желтовато-серых с темными пятнами яиц.

303. Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola Pall.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая птичка с довольно длинным, черным, с белыми полосками по бокам хвостом, которым она постоянно покачивает. Держится на земле, часто садится на травинки и кусты. Голова и вся нижняя сторона тела у самца желтая, спина серая, черная или зеленоватая. Самка окрашена гораздо бледнее. Молодые бурые, с буровато-черными пестринами на шее. *Г.* Звонкое «циии-ли». *От.* В отличие от желтой трясогузки, голова желтая. Молодые птицы этих видов в полевых условиях практически неотличимы. *Б.* Сырые луга и болота. *ХП.* Перелетная птица.





Гн. Гнездо на земле. В кладке 4—5 охристых с буроватыми пятнами яиц.

304. Желтая трясогузка — Motacilla flava L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая птичка с довольно длинным хвостом, которым она все время покачивает. Держится на земле, часто садится на травинки и кусты. Хвост буро-черный, с белыми полосками по бокам. Низ тела желтый. Спина зеленая. Верх головы серый или зеленоватый. Самки окрашены более бледно. Молодые буроватые, с бурочерными пестринами на шее. *Г.* Звонкое «псюйльи». *От.* В отличие от желтоголовой трясогузки, верх головы темный. В отличие от горной трясогузки, надхвостье зеленоватое, хвост более короткий. Молодые птицы желтой и желтоголовой трясогузок в полевых условиях практически неотличимы. *Б.* Сырые луга, болота и тундра. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 5—6 зеленовато-белых с темными крапинками яиц.

305. Коньки — Anthus

В. С воробья. *ОП.* Небольшие стройные птички. Держатся на земле. Иногда садятся на деревья, кусты и провода. В полевых условиях все коньки различаются с трудом, так как вылетают из-под ног и видны, как правило, сверху. Верхняя сторона тела у всех коньков буровато-серая, с

бо́льшим или меньшим развитием продольных бурых пестрин. Нижняя сторона тела светлая, беловатая, часто с бурыми пестринами. На хвосте по бокам белые полоски. У самца краснозобого конька щеки, горло и зоб красновато-коричневатые. Во время пения самцы взлетают в воздух и, описав крутую дугу, снова садятся на куст, дерево или землю. *Г.* Отрывистое «тви» или «цирлюй». *От.* В отличие от трясогузок, общая окраска буроватая, хвост более короткий. *Б.* Опушки лесов и открытые пространства. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда на земле. В кладке по 5—6 темных, буроватых или серых с темными пестринами яиц.

306. Стенолаз — Tichodroma muraria L.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая темно-серая птичка с длинным, тонким, несколько изогнутым вниз клювом. Обычно видна лазающей по отвесным стенам скал. При лазании помогает себе широкими крыльями. Полет тихий. Верх головы, спина, грудь и брюшко пепельно-серые, крылья и хвост темные, на крыльях широкая малиново-красная полоса, на конце хвоста и крыльев белые пятна. Весной и летом горло черное, осенью и зимой оно белое. *Г.* Громкий низкий свист «циииууу». *От.* Спутать с другой птицей нельзя. *Б.* Отвесные скалы и нагромождения крупных камней в горах. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в щели скалы. В кладке 3—4 белых с красно-бурыми пятнами яйца.

307. Пищуха — Certhia familiaris L.
Короткопалая пищуха — Certhia brachydactyla Brehm
Гималайская пищуха — Certhia himalayana Vig.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Мелкие, лазающие по стволам деревьев птички с довольно длинным, тонким, несколько изогнутым вниз клювом. Окраска верхней стороны тела коричневато- или серовато-бурая, с более темными пестринами и белыми пятнышками. Низ тела белый. *Г.* Тихое «тсии-тсии». Песня — звонкая, короткая трель. *От.* Друг от друга в полевых условиях отличаются с трудом. У гималайской пищухи более длинный клюв. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Оседлые и кочующие птицы. *Гн.* Гнезда за отставшей корой или в дуплах. В кладке по 5—7 белых с красноватыми крапинками яиц.

308. Поползень — Sitta europaea L.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая подвижная короткохвостая птичка. Держится в одиночку или парами, часто перемещаясь вниз головой по стволам деревьев. Клюв прямой, довольно









длинный. Верхняя сторона тела голубовато-серая. От клюва через глаз к затылку проходит черная полоска. Нижняя сторона тела белая (у кавказских, крымских и карпатских поползней нижняя сторона тела рыжая, а горло беловатое). *Г.* Звонкое «тьоч-тьоч-тьоч» или «тцитт-тцитт». Песня — несколько громких свистов. *От.* В отличие от скалистого поползня, подхвостье каштановое, величина меньшая. *Б.* Высокоствольные леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 7—8 белых с красноватыми крапинками яиц.

309. Скалистый поползень — Sitta tephronota Sharpe

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Небольшая подвижная короткохвостая птичка, ловко лазающая по скалам и камням, часто вниз головой. Верхняя сторона тела пепельно-серая. От клюва через глаз к затылку идет черная полоска. Нижняя часть тела белая. Клюв довольно длинный, прямой. *Г.* Громкий свист «прююй-тюй-тюй» или «сит-сит». Песня — набор громких свистов. *От.* В отличие от обыкновенного поползня, величина несколько бóльшая, подхвостье охристое. *Б.* Скалы и осыпи. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на скале, из глины. В кладке 6—10 белых с красноватыми крапинками яиц.

310. Черноголовый поползень — Sitta krüperi Pelz.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая подвижная короткохвостая птичка. Ловко лазает по стволам и веткам деревьев. Верхняя сторона тела пепельно-серая, на голове черная шапочка. Нижняя сторона тела беловатая, на груди рыжее пятно. У молодых голова и низ тела серые. *Г.* Громкое «чтшш-чтшш». Песня — печальный громкий прерывистый свист. *От.* В отличие от обыкновенного поползня, величина несколько меньшая, на голове черная шапочка, на груди рыжее пятно. *Б.* Горные хвойные леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—6 белых с красноватыми крапинками яиц.

311. Большая синица — Parus major L.

В. С воробья. *ОП.* Бойкая подвижная птица. Голова, поясок вдоль середины груди, горло, задняя часть брюшка и подхвостье черные. Щеки белые. Хвост и крылья серо-голубые, спина зеленая (у среднеазиатских больших синиц спина голубовато-серая). Нижняя сторона тела желтая (у дальневосточных и среднеазиатских птиц — белая). *Г.* Звонкое «пинь-пинь-чэржжж». Песня — громкие свисты «ци-пи-ци-пи-ци-пи-ин-ча-ин-ча». *От.* В отличие от других синиц, величина бóльшая. *Б.* Различные типы леса, парки и сады. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 9—13 белых с красноватыми крапинками яиц.

312. Лазоревка — Parus caeruleus L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Подвижная птичка, лазающая и прыгающая по кустам и ветвям деревьев. Шапочка на голове ярко-голубая, обведенная снизу белой полоской. Крылья и хвост голубые, спина зеленая. Щеки белые, обведенные вокруг черновато-синеватой полоской. Нижняя сторона тела желтая, посредине груди проходит прерывистая черная полоска. *Г.* Звонкое «ци-цинь-цирррззь». *От.* В отличие от других синиц, на голове голубая шапочка. *Б.* Лиственные леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 9—13 белых с красновато-коричневыми крапинками яиц.

313. Белая лазоревка — Parus cyanus Pall.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая подвижная белая птичка, ловко лазающая по кустам и среди ветвей деревьев. Общая окраска белая. Полоска через глаз синевато-черная, крылья и хвост голубые. Поперек крыла и по бокам







хвоста широкие белые полосы. Спина серовато-голубая. У среднеазиатских белых лазоревок верх головы и спина дымчато-голубоватые, грудь желтая. *Г.* Звонкое «ци-циинь-цирррзь». *От.* В отличие от обыкновенной лазоревки, окраска белая. *Б.* Лиственные и смешанные леса, заросли по берегам рек. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 9—11 белых с красноватыми крапинками яиц.

314. Черная синица, или московка — Parus ater L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Непоседливая небольшая птичка, держащаяся обычно парами или стайками в кронах деревьев. Часто подвешивается на концы веточек. Голова черная, с белыми щеками. Спина голубовато-серая, крылья и хвост голубовато-бурые. Нижняя сторона тела грязно-белая, с охристо-буроватыми боками. *Г.* Звонкое «ци-пи, ци-пи» или «ти-ти-тюй, ти-ти-тюй». *От.* В отличие от гаички, щеки белые, хвост довольно короткий. *Б.* Хвойные и смешанные леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 6—11 белых с красноватыми крапинками яиц.

315. Рыжешейная синица — Parus rufonuchalis Blyth

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Подвижная, темная, с белыми щеками птичка. Дер-

жится в одиночку и парами на деревьях или под ними. Голова и грудь черные. Щеки белые. Хвост и крылья буро-серые. Подхвостье, пятно на шее и перья под крылом ржаво-рыжие. На затылке белое пятно. Брюшко темное, голубовато-серое. *Г.* Звонкое «ци-фююю». Песня — громкая трель. *От.* В отличие от черной синицы, величина несколько бо́льшая, общая окраска серая. *Б.* Горные еловые и арчовые леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо под корнями деревьев, под камнями, в щелях скал. В кладке 4—6 яиц.

316. Японская, или тиссовая, синица — Parus varius Temm.et Schleg.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая подвижная птичка. Держится парами и стайками на деревьях. Спина, хвост и крылья голубовато-серые. Голова и горло черные. Лоб, щеки и нижняя сторона тела белые, с рыжим налетом. Бока тела ярко-рыжие. *Г.* Звонкое «ци-ци-ции» или «тжээ-тжээ». *От.* В отличие от черной синицы, бока рыжие. *Б.* Хвойные и смешанные леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Кладки на территории СССР не описаны.

317. Черноголовая гаичка — Parus palustris L.
Буроголовая гаичка, или пухляк — Parus montanus Bald.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Подвижные ловкие птички, держатся парами и стайками на кустах и деревьях. Окраска верхней стороны тела буровато-серая, нижней — грязно-беловатая. На голове черная шапочка, доходящая почти до спины, на горле черное пятно. *Г.* Звонкое «цици-чжжж-чжжж» и печальный свист «пюй-пююю-пюююю». *От.* Между собой в полевых условиях практически не различаются. В отличие от сероголовой гаички, есть черная шапочка. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Оседлые и кочующие птицы. *Гн.* Гнездо в дуплах. В кладке по 6—9 белых с красноватыми крапинками яиц.

318. Сероголовая гаичка — Parus cinctus Bodd.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая буроватая подвижная птичка. Держится парами и стайками, ловко лазает по ветвям. Окраска верхней стороны тела серовато-бурая, с рыжеватым оттенком на верхней части головы. Нижняя сторона тела буровато-беловатая. На горле черное пятно. *Г.* Звонкое «цинь-цинь». *От.* В отличие от других гаичек, голова буровато-серая. *Б.* Хвойные, реже смешанные леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 6—9 белых с красновато-коричневыми крапинками яиц.









319. Средиземноморская гаичка- Parus lugubris Temm.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая подвижная птичка. Держится обычно парами и стайками в кронах деревьев. Общая окраска буровато-серая, светлее на нижней стороне тела. Голова сверху, горло и верхняя часть зоба черные. Щеки белые, по бокам хвоста и поперек крыла белые полоски. *Г.* Звонкое «цици» или «ци-ци-ци». *От.* В отличие от других гаичек, щеки и полоски по бокам хвоста белые, на горле большое черное пятно. *Б.* Горные лиственные и хвойные леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—7 белых с красноватыми крапинками яиц.

320. Хохлатая синица, или гренадерка — Parus cristatus L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая подвижная птичка с большим заостренным хохлом на голове. Держится стайками и парами на деревьях, кустах и под ними. Окраска верхней стороны тела буровато-серая, нижняя сторона тела грязно-белая. Горло и полоска вокруг шеи черные. Хохол покрыт чередующимися белыми и черными пятнышками. *Г.* Звонкое «цици-трррч». *От.* В отличие от других синиц, на голове большой хохол. *Б.* Хвойные, преимущественно еловые и смешанные леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле.

В кладке 6—7 белых с красновато-коричневыми крапинками яиц.

321. Длиннохвостая синица — Aegithalos caudatus L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая пушистая птичка. Держится обычно стайками или парами. Птицы лазают по тонким ветвям деревьев и кустов, все время перекликаясь. Голова и грудь белые, спина черная. Хвост длинный, пестрый, по бокам хвоста белая полоска. На плечах розоватые полосы, задняя часть брюшка розоватая. У крымских и кавказских синиц верх головы и общий тон окраски нижней стороны тела буроватый. *Г.* Звонкое «чэррр-чэррр». *От.* В отличие от других синиц, хвост длинный. *Б.* Лиственные и смешанные леса. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на кусте. В кладке 10—12 белых с бледным, розовато-фиолетовым рисунком яиц.

322. Ремез — Remiz pendulinus L.

В. Значительно мельче воробья. *ОП.* Проворная маленькая птичка, ловко лазающая по тонким ветвям деревьев и кустов. Держится парами и стайками среди листвы. Легко обнаруживается по голосу. Верхняя часть тела каштановая, нижняя—розовато-белая. Голова черноватая или серая, с широкой черной полосой от клюва через глаз к уху. *Г.* Нежное «тсиии-тсиии». *От.* В отличие от пеночек, спина каштановая, на голове черная полоса. *Б.* Лиственные леса и рощи по берегам водоемов. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на тонких веточках над водой в виде мешочка. В кладке 4—7 белых яиц.

323. Желтоголовый королек — Regulus regulus L.
Красноголовый королек — Regulus ignicapillus Temm.

В. Значительно мельче воробья. *ОП.* Самые маленькие из наших птичек. Держатся стайками и парами в ветвях деревьев, предпочитая хвойные породы. Очень подвижны, часто трепещут на месте у конца ветки. Общая окраска зеленовато-серая, более светлая на нижней стороне тела. У красноголового королька спина с примесью оранжево-желтых тонов. На крыльях поперечные светлые полоски. На верхней стороне головы широкая оранжевая или желтая полоска, окаймленная по бокам широкими черными полосками. У красноголового королька от клюва к глазу идет черная полоска, щеки голубовато-серые, над глазом яркая белая бровь. *Г.* Тихое «ци-ци-ци». Песня очень тихая — «ци-фли-фин, ци-фли-фин». *От.*









У корольков, в отличие от пеночек, на голове есть черные и желтые полосы. *Б.* Хвойные и смешанные леса (красноголовый королек — только на Западном Кавказе и в Крыму). *ХП.* Оседлые и кочующие птицы. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке по 8—10 бледно-красных с буровато-красными крапинками яиц.

324. Расписная синичка — Leptopoecile sophiae Sew.

В. Значительно мельче воробья. *ОП.* Маленькая, очень подвижная птичка, ловко лазающая по кустам. Держится парами и стайками. У самца общая окраска сине-фиолетовая, на голове рыжая шапочка. Брюшко рыжевато-белое, над глазами светлые брови. У самки спина и нижняя сторона тела сероватые, надхвостье фиолетовое, на голове рыжеватая шапочка. По бокам хвоста у самца и самки белые полоски. *Г.* Тихое, протяжное «тсиии-тсиии». *От.* В отличие от корольков и пеночек, в окраске есть фиолетовый цвет. *Б.* Заросли стелющейся арчи в субальпийском поясе гор. Зимой — арчовый и хвойный лес. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 4—6 белых с красновато-бурыми пятнышками яиц.

325. Бурая сутора — Suthora webbiana Gray

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Юркая подвижная птичка с длинным ступенча-

тым хвостом. Держится стайками в зарослях. Окраска однотонная, охристо-буроватая. Клюв короткий, вздутый. *Г.* Звонкий свист и щебетание. *От.* В отличие от камышовок, клюв короткий, толстый. *Б.* Кустарники по опушкам лесов и долинам рек. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на кусте. Яйца голубые.

326. Буробокая белоглазка — Zosterops erythopleurus Swinh.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Юркая подвижная птичка. Держится в одиночку, парами и стаями на деревьях и кустах. Голова, спина, крылья и хвост желто-зеленые. Вокруг глаза белое кольцо, на боках тела коричневые пятна (иногда их не бывает). *Г.* Звонкое «ции-лиии». *От.* В отличие от пеночек, вокруг глаза белое кольцо. *Б.* Рощи и заросли по берегам рек. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке обычно 5 бледно-голубых яиц.

327. Серый личинкоед — Pericrocotus divaricatus Raffl.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая птичка с длинным ступенчатым хвостом. Держится парами и стайками в кронах деревьев, часто взлетает на сухие ветви. Окраска верхней стороны тела серая, нижняя сторона тела, лоб и полосы по бокам хвоста белые. Хвост черный. У самца верх головы черный. *Г.* Звонкая, мелодичная трель. *От.* В отличие от белой трясогузки, низ тела чисто-белый, поведение птицы иное. *Б.* Различные типы широколиственного леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—5 голубовато-серых с темными пятнами яиц.

328. Японский сорокопут — Lanius bucephalus Temm. et Schleg.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Обычно виден сидящим на сухой ветке дерева, вершине куста или на проводе. Хвост довольно длинный, ступенчатый, с белыми полосками по бокам. Лоб, спина и надхвостье серые. Верх головы и шеи ярко-рыжий. От клюва через глаз к уху идет широкая черная полоса. Горло и бока головы белые. Грудь и брюшко рыжеватые. Крылья и хвост буро-черные, на крыле белое пятно. Самка и молодые более тусклые. *Г.* Довольно громкое «чи-чи-чи-тьо-тьо-тьо». *От.* В отличие от жулана, величина несколько бо́льшая, грудь и брюшко рыжеватые. *Б.* Кустарниковые заросли на лугах и по речным долинам. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 4—6 зеленоватых с серыми пятнами яиц.



Таблица 26

1. Серая мухоловка. 2. Мухоловка-пеструшка. 3. Пестрогрудая мухоловка. 4. Мухоловка-белошейка, 5. Ширококлювая мухоловка.



Таблица 27

1. Речной сверчок. 2. Пятнистый сверчок. 3. Таежный сверчок. 4. Соловьиный сверчок. 5. Обыкновенный сверчок.







329. Длиннохвостый сорокопут — Lanius schach L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Виден чаще всего сидящим на сухой ветви дерева или куста. Хорошо заметен довольно длинный черный ступенчатый хвост. Крылья и широкая полоса от клюва через глаз к уху черные. Верх головы, шеи и надхвостье серые. Спина рыжая. Нижняя сторона тела белая, с рыжим налетом на боках. *Г.* Резкий, трещащий звук. *От.* В отличие от жулана, хвост длинный, ступенчатый. В отличие от индийского жулана, величина бóльшая, белое пятно на крыле отсутствует, хвост более длинный. *Б.* Заросли кустарников, отдельные рощи, сады и парки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте или на дереве. В кладке 4—6 зеленоватых с темными пятнами яиц.

330. Индийский жулан — Lanius vittatus Valenc.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Обычно виден неподвижно сидящим на выдающейся ветке куста или дерева. Хвост довольно длинный, ступенчатый, черный, с белыми полосками по бокам. Лоб, полоса через глаз к уху и крылья черные. Нижняя сторона тела и полоса на крыле белые. Голова серая. Спина и бока тела ржаво-рыжие. *Г.* Грубое «чирр-чирр». *От.* В отличие от длиннохвостого сорокопута, величина несколько меньшая, на крыльях белые полосы. *Б.*

Фисташковое редколесье. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на кусте. В кладке обычно 4 беловатых с лиловыми и рыжевато-бурыми пятнами яйца.

331. Красноголовый сорокопут — Lanius senator L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Обычно виден неподвижно сидящим на сухой ветке куста или дерева. Очень пестрая птица. Полоса от клюва через глаз к шее, лоб, спина, крылья и хвост черные. Нижняя сторона тела, широкая полоса на плечах, надхвостье и полосы по бокам хвоста белые. Верх головы красновато-коричневый. *Г.* Резкое «крекс-крекс» или «скерр-скерр». *От.* В отличие от жулана, спина черная, голова красноватая. *Б.* Кустарниковые заросли и отдельные рощи. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте или на дереве. В кладке 4—5 бледно-зеленоватых с темными пятнами яиц.

332. Жулан — Lanius cristatus L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Чаще всего виден неподвижно сидящим на выдающейся ветке куста или дерева или на проводе. Самец европейских жуланов имеет яркую, пеструю окраску. Верх головы пепельно-серый, спина каштановая. Хвост, крылья и широкая полоса от клюва через глаз к уху черные. По бокам хвоста широкие белые полосы. Нижняя сторона тела белая, с нежным розовым оттенком. Самка и молодые сверху рыжевато-коричневые, снизу сероватые, с тонким поперечным рисунком. У самцов азиатских жуланов верх головы, спина, крылья и хвост глинисто-коричневые различных оттенков, полоса через глаз бурая, а нижняя сторона тела охристо-беловатая. *Г.* Резкое «чек-чек» и громкое «чжаа-чжаа». Песня — подражание голосам других птиц. *От.* В отличие от индийского, японского жуланов и красноголового сорокопута, на крыльях отсутствуют белые полосы. *Б.* Заросли колючих кустарников и опушки лесов, сады и парки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо обычно на кусте. В кладке 4—6 зеленоватых с темными пятнами яиц.

333. Серая мухоловка — Muscicapa striata Pall.
Сибирская мухоловка — Muscicapa sibirica Gm.
Пестрогрудая мухоловка — Muscicapa griseisticta Swinh.
Ширококлювая мухоловка — Muscicapa latirostris Raffl.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшие птички. Чаще всего неподвижно сидят «столбиком» на сухих ветках дерева, иногда взмахивают крылышками. Время от времени взлетают в воздух, схватывая пролетающее насекомое, и вновь







садятся на прежнее место. Окраска верхней стороны тела буровато-серая. Нижняя сторона белая, с буроватыми продольными пестринами или буроватым налетом на груди и боках. *Г.* Негромкое «тцить-цици». *От.* От других мухоловок отличаются тусклой буроватой окраской. Между собой в полевых условиях различаются с трудом. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда в дуплах или в полудуплах, иногда на ветвях деревьев. В кладке по 4—6 грязно-зеленоватых с ржавчатыми пятнами яиц.

334. Мухоловка-пеструшка — Muscicapa hypoleuca Pall. **Мухоловка-белошейка** — Muscicapa albicollis Temm.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держатся в одиночку, неподвижно сидя на сухой ветке. Часто опускают крылья и приподнимают хвост. На короткое время взлетают в воздух за пролетающими насекомыми. Окраска верхней стороны тела у самцов черная, у самок и молодых бурая. Нижняя сторона тела, полосы на крыльях и по бокам хвоста белые. У белошейки шея отделена от спины белой полоской. *Г.* Громкое «пик-пиик». Песня пеструшки довольно громкая и состоит из звуков, напоминающих«пичи-пичи-кулиличи». *От.* Между собой на расстоянии различаются с трудом. В отличие от других мухоловок, окраска черно-белая. *Б.* Различные типы леса, парки и

рощи. *ХП*. Перелетные птицы. *Гн*. Гнезда в дуплах. В кладке по 5—7 светло-голубых яиц.

335. Желтоспинная мухоловка — Muscicapa narcissina Temm.

В. Несколько мельче воробья. *ОП*. Держится в одиночку и парами. Чаще всего сидит неподвижно, взлетая за пролетающими насекомыми. У самца верх головы, спина, крылья и хвост черные. Надхвостье и нижняя сторона тела желтые. Полосы над глазом и на крыле белые (у островных птиц бровь желтая). У самки и молодых верхняя сторона тела буроватая, надхвостье оливково-зеленое. Нижняя сторона тела грязно-белая. *Г*. Песня — быстрое «пипипитью-ито-фой». *От*. В отличие от других наших мухоловок, у самцов нижняя сторона тела желтая, у самки и молодых надхвостье зеленое. *Б*. Кусты и деревья в поймах рек. *ХП*. Перелетная птица. *Гн*. Гнездо в дупле. В кладке 4—7 белых с кирпично-красными крапинками яиц.

336. Малая мухоловка — Muscicapa parva Bechst.

В. Несколько мельче воробья. *ОП*. Держится в одиночку. Чаще всего видна сидящей на нижних ветвях деревьев с полураспущенными крыльями и приподнятым хвостом. Окраска верхней стороны тела однотонная, буровато-серая. Хвост буровато-черный, с большими белыми пятнами по бокам. Нижняя сторона тела белая. У самцов горло и верхняя часть зоба рыжие. *Г*. Сухой, трещащий звук «тррр» или «хи-ли-хи-ли». *От*. В отличие от мухоловки Мугимаки, на хвосте есть белые пятна. *Б*. Высокоствольные леса. *ХП*. Перелетная птица. *Гн*. Гнездо в дупле или полудупле. В кладке 5—6 розовато-желтых или зеленоватых с розовато-рыжими пятнами яиц.

337. Мухоловка Мугимаки, или таежная мухоловка — Muscicapa mugimaki Temm.

В. Несколько мельче воробья. *ОП*. Обычно видна неподвижно сидящей на ветке, иногда подергивающей хвостом. У самца окраска верхней стороны тела черная, за глазом и на плечах белые полосы, горло, зоб и грудь ржаво-рыжие, брюшко белое. У самок и молодых верхняя сторона тела буровато-серая, нижняя сторона беловатая, с бóльшим или меньшим развитием рыжего цвета на горле и зобе. *Г*. Трещащий звук «тррр». *От*. В отличие от малой мухоловки, на хвосте отсутствуют белые пятна, а самец черный. *Б*. Высокоствольная тайга. *ХП*. Перелетная птица. *Гн*. Гнездо на дереве. В клад-







ке 4—8 оливково-зеленых с красно-коричневыми крапинками яиц.

338. Рыжехвостая мухоловка — Muscicapa ruficauda Swains.

В. С воробья. *ОП.* Как и все мухоловки, чаще всего видна неподвижно сидящей на ветке, иногда с полураспущенными крыльями и приподнятым хвостом. Окраска верхней стороны тела буровато-серая, брюшко беловатое, надхвостье и хвост ржаво-рыжие. *Г.* Песня — звонкая трель «ии-тии-тии-тии». *От.* Очень похожа на самку обыкновенной горихвостки или горихвостки-чернушки, отличить ее можно на расстоянии только по манере держаться. *Б.* Горные леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 3—4 оливково-зеленых яйца.

339. Синяя мухоловка — Muscicapa cyanomelana Temm.

В. С воробья. *ОП.* Чаще всего видна сидящей почти неподвижно на выступающей ветке дерева. У самца окраска верхней стороны тела блестяще-синяя, горло, зоб и грудь черные, брюшко белое. У самки и молодых верхняя сторона тела бурая, нижняя — белая, с бурым налетом на груди и боках, подхвостье рыжеватое. *Г.* Песня разнообразная, с громкими красивыми свистами. *От.* В отличие от серой мухоловки, у самок и молодых на груди нет бурых пестрин. *Б.* Леса с

густым подлеском и прибрежные скалы. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве, в дупле или в скалах. В кладке 4—5 белых яиц.

340. Райская мухоловка — Terpsiphone paradisi L.

В. Несколько крупнее воробья, но кажется значительно больше благодаря длинному хвосту. *ОП.* Яркая подвижная птица. Держится в кронах деревьев и на кустах, все время перелетая с места на место с характерными криками. На голове большой заостренный хохол. Голова и горло черные, с металлическим блеском, спина, крылья и хвост ярко-рыжие. Вся нижняя сторона тела чисто-белая. Клюв и голое кольцо вокруг глаза голубые. Хвост длинный, особенно длинные 2 средних пера у взрослых самцов. У самки и молодых грудь и брюшко с серым налетом. У самцов передние перья крыла белые, с черными стержнями. *Г.* Громкие звуки «четрх-четр» и «дззи-дззи». Песня — громкий низкий свист «и-тю-люлю-гу». *От.* В отличие от других мухоловок, на голове большой хохол, хвост длинный, рыжий. *Б.* Широколиственные леса, тенистые сады и парки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—5 белых с красновато-коричневыми крапинками яиц.

341. Пеночки — Phylloscopus

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Мелкие подвижные птички. Держатся на деревьях и кустах, все время прыгая по веткам. Окраска верхней стороны тела зеленовато- или буровато-серая. Нижняя сторона тела желтовато- или буровато-белая. Над глазом часто имеется светлая бровь. *Г.* Почти у всех видов короткий посвист «тюить». Песня у разных видов различна. Например, у теньковки — «тень-тинь-тюнь-тень»; у трещотки — «сип-сип-сипсирррр» и т. д. *От.* Между собой в полевых условиях практически не различаются. В отличие от славок, верх тела у большинства видов зеленоватый, величина в большинстве случаев меньшая. От пересмешек в полевых условиях отличаются только по голосу. На очень близком расстоянии видно, что у пеночек тонкий и узкий клюв, а у пересмешек он у основания широкий. *Б.* Различные типы лесов и кустарников. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда на земле, реже на деревьях. В кладке по 6—7 розовато-белых, чаще с красноватыми крапинками яиц.







342. Сверчки — Locustella

В. С воробья или несколько мельче. Таежный сверчок несколько крупнее. *ОП.* Очень скрытные птицы. Держатся на земле и в густых зарослях. Летают редко, низко над землей. Крылья короткие, широкие, тело удлиненное, хвост округлоклиновидный. Окраска верхней стороны тела бурая, нижней — буровато-белая. У многих видов на голове, спине и груди продольные темные пестрины. *Г.* По песне все сверчки хорошо отличаются друг от друга. Песня речного сверчка — резкое «зер-зер-зер», продолжающееся иногда несколько минут. Песня обыкновенного сверчка — долгое «зи-зи-зи-зи». Пение пятнистого сверчка напоминает треск кузнечика с включением отдельных свистов. Песня певчего сверчка — звучная громкая трель, заканчивающаяся трещанием. Песня охотского сверчка — резкое «виче-вче-виче-вичь». Песня таежного сверчка — громкие флейтовые звуки «тутли-рути-рути-тути», напоминающие по тембру соловьиные. Песня соловьиного сверчка — отрывистые, чмокающие звуки, заканчивающиеся трещанием «зирррр». *От.* В отличие от камышовок, окраска более темная, тело заметно удлиненное, меньшая подвижность. Друг от друга сверчки в полевых условиях различаются с трудом по внешнему виду и легко — по пению. *Б.* Кустарниковые и травянистые заросли, часто около

воды. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда на земле или на кустах. В кладке по 4—6 буроватых с пятнами яиц.

343. Камышовки — Acrocephalus, Cettia, Bradypterus, Lusciniola

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Мелкие, очень подвижные птички. Окраска верхней стороны тела у большинства видов буровато-рыжеватая. Нижняя сторона охристо-белая. У многих видов над глазом светлая бровь. Хвост округлый, конусовидный. *Г.* Почти у всех видов резкое «чек-чек». Песня скрипучая, с подражаниями голосам других птиц, иногда с красивыми свистами. *От.* В отличие от славок, хвост клиновидный или ступенчатый. Между собой в полевых условиях различаются с трудом. *Б.* Заросли тростника, ивняков, кустарники, заросшие высокой травой межи, чаще всего вблизи воды. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнездо-корзиночка между стеблями. В кладке по 4—6 светлых с темными пятнами яиц.

344. Короткохвостка — Urosphena squameiceps Swinh.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Маленькая подвижная птичка, прыгающая в гущине кустов. Короткий хвост всегда вздернут кверху. Окраска верхней стороны тела оливково-бурая, нижняя сторона грязновато-белая. Над глазом беловатая бровь. *Г.* Негромкое «чмок-чмок». Песня — очень резкие звуки «тсци-тсци-тсци-тсци». *От.* В отличие от крапивника, бровь и нижняя сторона тела светлые. *Б.* Глухие чащи леса с завалами валежника. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле или в основании куста. В кладке 5—7 розовато-белых с розовыми и сиреневыми пятнышками яиц.

345. Крапивник — Troglodytes troglodytes L.

В. Значительно мельче воробья. *ОП.* Маленькая юркая птичка с вздернутым кверху коротким хвостиком, шныряющая в кучах хвороста и под кустами. Окраска верхней стороны тела каштановая. Нижняя сторона охристо-серая, с поперечным тонким темным рисунком. *Г.* Звонкое «черр-черр». Песня состоит из громких трелей. *От.* В отличие от короткохвостки, низ тела темный. *Б.* Различные типы леса с оврагами и буреломом. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Шарообразное гнездо помещается между корнями или в кучах хвороста. В кладке 5—6 белых с буро-красными пятнышками яиц.



Таблица 28

1. Широкохвостая камышовка. 2. Пестроголовая камышовка. 3. Садовая камышовка. 4. Камышовка-барсучок.



Таблица 29

1. Бледная пересмешка. 2. Зеленая пересмешка. 3. Короткохвостка. 4. Крапивник.

346. Пересмешки, или бормотушки — Hippolais

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Подвижные птицы, держатся на деревьях или на кустах. Окраска верхней стороны тела зеленоватая или буровато-оливковая. Нижняя сторона беловатая, часто с желтоватым налетом. Клюв широкий у основания. *Г.* Довольно громкое «вет-вет», «тце-тце-дедевин» или «чрэк-чрэк». Песня — подражание голосам других птиц и свои гнусавые или бормочущие звуки. *От.* От пеночек отличаются с трудом и притом только на очень близком расстоянии по широкому у основания клюву. *Б.* Светлые леса и заросли кустарников. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда на деревьях, кустах или на земле. В кладке зеленой пересмешки 4—6 розовых с красноватыми пятнышками яиц.





347. Ястребиная славка — Sylvia nisoria Bechst.

В. С воробья. *ОП.* Подвижная, прыгающая по ветвям деревьев и кустов птица. Самец пепельно-серый, с поперечным темным рисунком на нижней стороне тела. Самки и молодые сверху буровато-серые, снизу беловатые, обычно с неясным поперечным рисунком. Глаза желтые. *Г.* Сухое, резкое «чек-чек». Песня — щебетание и красивые флейтовые свисты. *От.* В отличие от других славок, на нижней стороне тела поперечные полоски. *Б.* Светлые леса, вырубки с зарослями кустарни-



ков и сады. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте или на дереве. В кладке 5—6 беловатых с сероватыми пятнышками яиц.



348. Садовая славка — Sylvia borin Bodd.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая подвижная птичка. Держится в ветвях деревьев и кустов. Общая окраска буровато-серая, несколько более светлая на нижней стороне тела и беловатая на брюшке. *Г.* Резкое «чек-чек». Песня довольно громкая, напоминающая журчание ручейка. *От.* В отличие от других славок, окраска однотонная, буровато-серая. *Б.* Пойменные леса и рощи, заросли кустарников. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте, реже на дереве. В кладке обычно 5 сероватых с темными пятнами яиц.

349. Певчая славка — Sylvia hortensis Gm.

В. С воробья. *ОП.* Быстрая подвижная птичка. Держится на кустах и деревьях. Верхняя сторона тела буровато-серая, нижняя — белая. По бокам хвоста белые полоски. Шапочка на голове и верхняя часть щек черные. *Г.* Песня негромкая, с отдельными свистами. *От.* В отличие от серой славки и славки-мельничка, величина бóльшая, на голове черная шапочка. В отличие от славки-черноголовки, по бокам хвоста белые полоски, на голове много черного цвéта. *Б.* Лес с подлеском из кустарников и кустарниковые заросли. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кустах. В кладке 4—6 зеленовато-белых с серыми, зеленоватыми и коричневыми пятнами яиц.

350. Славка-черноголовка — Sylvia atricapilla L.

В. С воробья. *ОП.* Подвижная серая птичка, держащаяся в кронах деревьев или на кустах. Во время пения прыгает по ветвям. Общая окраска буровато-серая, несколько более светлая на нижней стороне тела. Шапочка на голове у самца черная, у самки и молодых рыжевато-коричневая. *Г.* Резкое «чек-чек». Песня — звучные флейтовые свисты и негромкое щебетание. *От.* В отличие от певчей славки, на хвосте нет белых полосок. *Б.* Лиственные и смешанные леса с подлеском из кустарников, сады и парки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте, реже на дереве. В кладке обычно 5 грязновато-белых с бурыми пятнами яиц.



351. Серая славка — Sylvia communis Lath.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Маленькая подвижная птичка, ловко прыгающая по ветвям кустов. Во время пения часто взлетает в воздух. Окраска верхней стороны тела серовато-бурая, верх головы серый, на плечах рыжеватые перья. Нижняя сторона тела белая, с розоватым оттенком. *Г.* Довольно громкое «чек-чек». Песня щебечущая, приблизительно ее можно передать так — «тирли- витюрли-чет-чет-ти-тирли». *От.* В отличие от славки-мельничка, перья на плечах рыжеватые. *Б.* Кустарники среди открытых пространств. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке обычно 5 белых или зеленоватых с темными крапинками яиц.



352. Славка-мельничек, или славка-завирушка — Sylvia curruca L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая подвижная птичка. Окраска верхней стороны тела серая, буроватая на спине и пепельная на голове. Через глаз идет более темная полоска. Нижняя сторона тела белая, с розоватым оттенком. *Г.* Негромкое «чек-чек». Песня — щебетание с вставляющимися в него громкими звуками «кле-кле-кле». *От.* В отличие от серой славки, на плечах отсутствуют рыжеватые перья. *Б.* Различные типы леса и кустарники. *ХП.* Перелетная



птица. *Гн.* Гнездо на кусте или на дереве. В кладке обычно 5 серовато-белых с темными пятнами яиц.



353. Белоусая славка — Sylvia mystacea Menetr.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Мелкая подвижная птичка, ловко прыгающая по веткам кустов. Во время пения часто взлетает в воздух. Окраска самца довольно яркая: верхняя сторона тела темная, аспидно-серая, по бокам хвоста и от клюва вниз идут белые полоски, нижняя сторона тела винно-розовая, брюшко белое. Самка и молодые сверху серовато-бурые, снизу охристо-белые. *Г.* Довольно громкое трещание. Песня короткая, щебечущая. *От.* У самок и молодых, в отличие от скотоцерки, на голове отсутствуют пестрины. *Б.* Сухие степные пространства с кустарником. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 4—5 белых с розоватым оттенком и темными крапинками яиц.

354. Скотоцерка — Scotocerca inquieta Cretzschm.

В. Значительно мельче воробья. *ОП.* Маленькая подвижная птичка, ловко прыгающая по ветвям кустов. Окраска светло-охристая, нижняя сторона почти белая. На голове, спине и груди продольные бурые пестрины. *Г.* Громкий протяжный свист, переходящий в трещание. *От.* В отличие от самки белоусой славки, на голове есть пестрины. *Б.* Сухие пустынные участки с кустарником. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 6—8 розовато-белых с красновато-коричневыми крапинками яиц.

355. Златогузая каменка — Oenanthe xanthoprymna Hempr. et Ehr.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая, стройная, с длинными ногами птичка. Быстро перебегает по земле, покачивая хвостом. Общая окраска глинисто-серая. Надхвостье и большие пятна по бокам хвоста рыжие. Хвост и крылья темно-бурые. *Г.* Громкое «чек-чек». Песня состоит из подражаний голосам других птиц и разнообразным звукам. *От.* В отличие от других каменок, надхвостье рыжее. *Б.* Голые каменистые участки с редкой растительностью. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в трещине скалы или между камнями. В кладке 5 белых с редкими коричневато-красными крапинками яиц.





356. Каменка — Oenanthe oenanthe L.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая, с длинными ногами птичка. Держится на земле. Испуганная, отбегает, приседая, кланяясь и покачивая хвостом. Самец во время пения часто поднимается в воздух. У него верх тела пепельно-серый, низ охристо-белый. Крылья, хвост и широкая полоса от клюва через глаз к уху черные. Самка, молодые и самец осенью розовато-бурые, с более светлой нижней стороной тела. Крылья и хвост темно-бурые. Надхвостье и пятна по бокам хвоста белые. *Г.* Звонкое «чек-чек». Песня состоит из подражаний различным звукам и голосам других птиц. *От.* Самки, молодые и осенние птицы в полевых условиях практически неотличимы от самок других видов каменок. *Б.* Открытые пространства. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в норе или в глубокой щели между камнями. В кладке 5—6 светло-голубых яиц.

357. Каменка-плясунья — Oenanthe isabellina Temm.

В. С воробья. *ОП.* Стройная, с длинными ногами птичка. Держится на земле, часто кланяясь и покачивая хвостом. Общая окраска глинисто-серая. Хвост и крылья темно-бурые. Надхвостье и пятна по бокам хвоста белые. *Г.* Громкое «чек-чек». *От.* В полевых условиях практически неотличима от самок других каменок. *Б.* От-

крытые сухие пространства. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в норе и щелях между камнями. В кладке 4—6 светло-голубых яиц.

358. Пустынная каменка — Oenanthe deserti Temm.
Чернопегая каменка — Oenanthe hispanica L.
Черношейная каменка — Oenanthe finchii Heugl.
Черная каменка — Oenanthe picata Blyth

В. С воробья. *ОП.* Стройные, с длинными ногами птички. Держатся на земле или на камнях, часто покачивают хвостом. Самцы почти всех видов белые, крылья, горло и хвост у них черные. На хвосте по бокам имеются большие белые пятна. У черной каменки самцы иногда бывают сплошь черные, с белыми надхвостьем, подхвостьем и пятнами по бокам хвоста. У пустынной каменки спина глинисто-пепельная. Самки глинисто-серые, с белыми надхвостьем и пятнами по бокам хвоста, молодые пестрые. *Г.* У всех видов громкое «чек-чек». *От.* Молодые птицы и самки всех видов каменок в полевых условиях почти не отличаются друг от друга. *Б.* Открытые сухие пространства с редкой растительностью. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда в норах или в щелях между камнями. В кладке по 5—6 голубых или белых, с коричневатыми крапинками яиц.

359. Луговой чекан — Saxicola rubetra L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая птичка. Держится в одиночку или парами. Обычно виден сидящим на высокой травинке или на верхней веточке куста. Окраска верхней стороны тела бурая, со светлыми пестринами. Через глаз идет темно-бурая полоска, заканчивающаяся большим пятном на щеках. Основание хвоста, полоса на плечах и бровь белые. Горло и грудь охристо-рыжеватые. Брюшко белое. Молодые охристо-буроватые, со светлыми поперечными пестринами и белым основанием хвоста. *Г.* Громкое «тци-чек-чек». Песня короткая, щебечущая. *От.* Молодые птицы похожи на молодых черноголовых чеканов и в полевых условиях от них практически неотличимы. *Б.* Луга с отдельными кустами и большие вырубки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 5—6 зеленовато-голубых яиц.

360. Черноголовый чекан — Saxicola torquata L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Обычно виден сидящим на высокой травинке или на кустике. Подергивает хвостом. У самца голова, горло, спина, крылья и хвост черные. Полоса на плечах, надхвостье, брюшко и иногда основание







хвоста белые. Зоб и грудь ржаво-рыжие. Самки и самцы в осеннем наряде более тусклые, у них вместо черного цвета бурый. Молодые охристо-буроватые, со светлыми поперечными пестринами. *Г.* Звонкое «тцит-чек-чек». Песня — щебечущая трель. *От.* Молодые очень похожи на молодых луговых чеканов и на расстоянии от них неотличимы. *Б.* Сухие открытые места с редкими кустами. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 5—6 голубовато-зеленых с красноватыми крапинками яиц.

361. Синехвостка — Tarsiger cyanurus Pall.

В. С воробья. *ОП.* Подвижная стройная птичка. Держится на деревьях и на земле. Самец поет, сидя на вершине дерева. У него верхняя сторона тела синяя, бровь и нижняя сторона тела белые. Бока ярко-рыжие. Самки и молодые самцы тусклые, синий цвет у них сохраняется только в надхвостье. Верх головы, спина и зоб серовато-бурые. Горло и брюшко белые. Бока рыжеватые. У слетков нижняя сторона охристо-беловатая, с темными пестринами. *Г.* Довольно громкое «фьить-трр». Песня — отдельные негромкие трели. *От.* В отличие от синего соловья, бока рыжие. *Б.* Высокоствольная тайга. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в полудупле, на поваленном стволе дерева или на земле. В кладке 5—7 белых яиц.

362. Синий соловей — Luscinia cyane Pall.



В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Стройная птичка. Держится очень скрытно в густых зарослях. У самца верх тела темно-голубой, лоб, полоса от клюва через глаз и на боку шеи черные, нижняя сторона тела белая. У самки верх тела оливково-бурый,с синим оттенком, надхвостье и хвост синие. Молодые бурые, с охристыми пятнами и неясным темным чешуйчатым рисунком. *Г.* Довольно грубое «чок-чок». Песня — громкие, звучные свисты. *От.* В отличие от синехвостки, бока белые. *Б.* Тайга с валежником. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 5—6 голубых яиц.

363. Соловей-свистун — Luscinia sibilans Swinh.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая, скрытно держащаяся птица. Окраска верха тела рыжевато-бурая. Нижняя сторона беловатая, с неясным темным чешуйчатым рисунком. Над глазом светлая бровь. *Г.* Негромкий свист, заканчивающийся чоканьем. Песня — дрожащий, громкий свист, напоминающий ржание жеребенка. *От.* В отличие от обыкновенного соловья, величина меньшая, на нижней части тела чешуйчатый рисунок. *Б.* Сырые леса с кустарником и буреломом. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в пеньке, сверху открытое. В кладке 5—6 кремовых яиц.

364. Тугайный соловей — Erythropygia galactotes Temm.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Подвижная птица с широким, довольно длинным хвостом. Часто поднимает и опускает хвост, распуская его. Во время полета хвост распущен. Окраска верха тела рыжевато-коричневая, нижняя сторона охристо-беловатая. Хвост рыжий, с черной и белой полосами на конце. Над глазом светлая бровь. *Г.* Резкий писк «тции-тци». Песня громкая, звучная, с красивыми свистами. *От.* В отличие от южного соловья, на конце хвоста рыжие, черные и белые полосы. *Б.* Заросли кустарников. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кусте или на земле. В кладке 3—5 бледных, зеленоватых или голубоватых с бурыми пятнышками яиц.

365. Соловей-белошейка — Irania gutturalis Guér.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Стройная, с длинными ногами птица. Сидя, плавно покачивает хвостом. Самец свер-



ху пепельно-серый. Бока головы и шеи, крылья и хвост черные. Бровь, горло и брюшко белые. Грудь и бока оранжевые. У самки оранжевый цвет заменен серым и сохраняется только на боках. Молодые темно-бурые, со светлыми пестринами. *Г.* Негромкий свист, заканчивающийся трещанием. Песня — набор громких трелей. *От.* В отличие от горихвосток, хвост черный. *Б.* Сухие горные склоны с кустарниками и камнями. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле и в кустах. В кладке 4—5 зеленовато-голубых с ржавчато-бурыми пятнами яиц.



366. Соловей —
Luscinia luscinia L.
Южный соловей —
Luscinia megarhynchos L.



В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Стройные, с довольно длинными ногами птички. Держатся на земле и на нижних ветках деревьев и кустов. Сидя, часто поводят хвостом вверх, вниз и в стороны. Верх тела коричневато-бурый, низ беловато-серый. *Г.* Низкое «фиуить-трр». Песня звучная и разнообразная. *От.* Между собой в полевых условиях различаются с трудом. Южный соловей несколько крупнее, светлее, хвост у него длиннее. В отличие от соловья-свистуна, размер бóльший. *Б.* Лиственные и смешанные леса с кустарником. Чаще держатся близ воды. *ХП.* Перелетные птицы. *Гн.* Гнезда на земле. В кладке обычно по 5 оливково-бурых яиц.

7. Соловей-красношейка — Luscinia calliope Pall.

В. С воробья. *ОП.* Стройная, с довольно длинными но-ми птичка. Держится на земле или в нижнем ярусе леса. У сам-горло блестяще-красное. У самки и молодых в оперении крас-го цвета нет. *Г.* Громкий свист и короткое резкое трещание. есня — красивые, звучные свисты. *От.* В отличие от черно-удой красношейки, у самца на груди нет черного цвета. У самки ивковый (а не голубовато-серый) тон окраски. *Б.* Заросшие ку-арником леса, вырубки и поймы рек. *ХП.* Перелетная птица. *н.* Гнездо на земле. В кладке 4—6 голубых яиц.

8. Черногрудая красношейка — Luscinia pectoralis Gould.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая, стройная, с довольно длинны-и ногами птичка. Держится на земле, камнях и нижних ветках устов и деревьев. Часто поводит вверх и вниз черным с белым нованием хвостом. Во время пения самец поднимает хвост кверху. самца верх тела голубовато-серый, брюшко и бровь белые, удь и шея черные, горло блестяще-красное. У самки и молодых расного и черного цвета в окраске нет. *Г.* Негромкий свист и роткий треск. Песня состоит из громких трелей. *От.* В отличие красношейки, у самцов грудь черная, у самок общий тон окрас-и голубовато-серый. *Б.* Кустарники в горных лесах и на субаль-ийских лугах. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В ладке 3—5 зеленовато-голубых с бурыми крапинками яиц.

9. Варакушка — Luscinia svecica L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая, стройная, с овольно длинными ногами птичка. Держится на земле и на кус-ах. У самца верх тела оливково-серый, крылья бурые, хвост ыжий, с черными полосами — продольной посередине и попереч-ой на конце, горло и грудь ярко-синие, окаймленные снизу рыжей черноватой полосами. Посреди зоба обычно рыжее или белое ятно, брюшко белое. У самки горло и грудь беловатые, с темными естринами. Молодые сверху бурые, со светлыми пестринами, низу охристые, с темными полосками. *Г.* Довольно громкое чак-чак». Песня громкая, с подражанием голосам других птиц. *От.* У молодых варакушек, в отличие от молодых зарянок, хвост рыжими пятнами. *Б.* Заросли кустарников, обычно вблизи во-ы. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 6—7 еровато-зеленых с буроватыми крапинками яиц.



Таблица 30

1. Певчая славка. 2. Ястребиная славка. 3. Славка-черноголовка. 4. Садовая славка. 5. Серая славка. 6. Славка-мельничек. 7. Белоусая славка. 8. Скотоцерка.



Таблица 31

1. Каменка. 2. Черногрудая каменка. 3. Черношейная каменка. 4. Златогузая каменка. 5. Каменка-плясунья. 6. Черная каменка. 7. Черная каменка (светлая вариация).







370. Зарянка —
Erithacus rubecula L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая, с довольно длинными ногами птичка. Держится на земле или на нижних ветвях деревьев и кустов. Поет на дереве или на кусте. Окраска верхней стороны тела темная, оливково-серая, брюшко белое, горло и грудь оранжевые. Молодые сверху темно-бурые, со светлыми пестринами, снизу беловатые, с темными пестринами. *Г.* Резкое частое «тик-тик-тик». Песня — громкая, звенящая трель. *От.* У молодых зарянок, в отличие от молодых варакушек, хвост темный. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле, в пеньке или, реже, в дупле. В кладке 5—6 розоватых с красновато-бурыми крапинками яиц.

371. Японская зарянка —
Erithacus akahige Temm.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая стройная птичка. Держится в затененных местах леса. Часто прыгает по земле на лесных тропинках, вздергивая по временам хвостом. Во время пения голова и хвост подняты вверх, а крылья полуопущены. Верх тела красновато-бурый. Горло и зоб ржавчато-красные, грудь серая, брюшко и подхвостье желтовато-белые. *Г.* Короткое трещание. Песня — короткая громкая трель. *От.* В отличие от обыкновенной зарянки, верх тела красноватый, брюшко желтоватое. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Пе-

релетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 5 зеленовато-голубых яиц.

372. Седоголовая горихвостка — Phoenicurus caeruleocephalus Vig.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая, с довольно длинными ногами птичка. Держится на кустах и деревьях. У самца верх головы голубовато-серый, брюшко и широкие полосы на плечах белые, остальное оперение черное. У самки и молодых общая окраска буровато-серая, надхвостье рыжее, около глаза светлое, хорошо заметное кольцо. *Г.* Довольно громкий писк или свист «цсиинть-цить». *От.* В отличие от других горихвосток, хвост черный или бурый. *Б.* Горные леса с кустарниками. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле под корнями деревьев и камнями. В кладке 3—5 голубовато-белых яиц.

373. Горихвостка — Phoenicurus phoenicurus L.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая, с довольно длинными ногами птичка. Сидя, часто подергивает хвостом. У самца верх головы, шеи и спины пепельно-серый. Лоб белый. Бока головы и горло черные. Крылья бурые. Низ тела и хвост ярко-рыжие. Самка буровато-серая, с рыжим хвостом. Молодые темно-бурые, со светлыми пестринами и рыжим хвостом. *Г.* Звонкое «фьюить-тик-тик». Песня — звонкая трель. *От.* В отличие от сибирской горихвостки, спина серая. В отличие от горихвостки-чернушки, у самца белый лоб. Самки и молодые от молодых чернушек отличаются с трудом. Окраска их несколько более светлая. *Б.* Светлые леса, сады и парки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 6—7 голубых яиц.

374. Сибирская горихвостка — Phoenicurus auroreus Pall.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая, с довольно длинными ногами птичка. Держится на деревьях, кустах и на земле. У самца лоб, бока головы и шеи, горло, спина и крылья черные. На крыле широкая белая полоса, верх головы и шеи пепельно-серый. Нижняя сторона тела и хвост рыжие. Самка и молодые серовато-бурые, с белой полосой на крыле и рыжим хвостом. *Г.* Звонкое «фьюить-тик-тик». *От.* В отличие от обыкновенной горихвостки и чернушки, на крыле белое зеркальце. *Б.* Разреженный лес и пойменные рощи. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле или в расщелине скалы. В кладке 5—6 белых с красными крапинками яиц.











375. Горихвостка-чернушка — Phoenicurus ochruros Gm.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится на земле и на камнях. У самца верх головы и шеи (у западных птиц и брюшко) серые, спина, горло, бока головы, грудь (у западных и кавказских птиц и верхняя часть брюшка) черные, брюшко и хвост ржаво-рыжие. Самка буровато-серая, с рыжим хвостом. *Г.* Звонкое «фьюить-тик-тик». Песня — скрипящие и шипящие звуки с отдельными звонкими трелями. *От.* В отличие от обыкновенной и сибирской горихвосток, лоб серый, грудь черная. Самки и молодые различаются с трудом. *Б.* Открытые пространства гор со скалами, осыпями и выходами камней или каменные постройки на равнинах. *XII.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в трещине скалы или между камнями. В кладке 5—6 голубовато-белых яиц.

376. Рыжеспинная горихвостка — Phoenicurus erythronotus Eversm.

В. С воробья. *ОП.* Держится в кустах. Сидя, все время потряхивает хвостом. У самца верх головы и шеи серый, лоб и широкая полоса от клюва через глаз черные, крылья бурые, полосы на плечах и брюшке белые, спина, горло, грудь и хвост красновато-рыжие. Самка буровато-серая, с рыжим хвостом. Молодые серовато-бурые со светлыми пестринами и ры-

жим хвостом. *Г.* Глухое «трр-трр» и звонкое «фьиить». *От.* У самцов, в отличие от других горихвосток, спина рыжая. Самки и молодые очень похожи на чернушек, но несколько крупнее. *Б.* Горные леса и кустарники на сухих склонах с осыпями и скалами. *ХП.* Перелетная и кочующая птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 3—5 светло-зеленых с буроватыми пятнами яиц.

377. Белошапочная горихвостка — Chaimarrornis leucocephalus Vig.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Небольшая, с довольно длинными ногами птица. Держится по берегам горных рек. Сидя, поднимает и опускает хвост, поводя им из стороны в сторону и распуская его. Голова, грудь, спина, крылья и полоса на конце хвоста черные. На голове блестяще-белая шапочка. Брюшко, надхвостье и хвост шелковистые, темно-красного цвета. *Г.* Громкий протяжный свист. *От.* В отличие от самца краснобрюхой горихвостки, крылья сплошь черные, окраска более яркая. *Б.* Горные реки и ручьи в ущельях с отвесными скалистыми стенами. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнезда в щелях скал или между камнями, недалеко от воды. В кладке 3—4 зеленовато-голубых с ржаво-коричневыми крапинками яйца.

378. Краснобрюхая горихвостка — Phoenicurus erythrogaster Güld.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Небольшая, с довольно длинными ногами птица. Чаще всего видна сидящей на камне, на верхушке куста и по берегам речек. Сидя, все время потряхивает хвостом. Полет довольно плавный, во время него хорошо видны широкие, черные, с белой поперечной полосой крылья. У самца голова, горло, зоб, спина и крылья черные, шапочка на голове и широкая полоса на крыле белые, грудь, брюшко и хвост ржаво-красные. Самка и молодые буровато-серые, с рыжим хвостом, у молодых светлые пестрины. *Г.* Звонкое «тьиить-ти-тик». Песня — тихое щебетание. *От.* В отличие от белошапочной горихвостки, самцы более тусклые, на крыльях белые полосы. Самки и молодые отличаются от самок рыжеспинной горихвостки более крупными размерами. *Б.* В летнее время — верхний пояс гор, глухие ущелья, скалы и осыпи. Зимой — заросли облепихи и других ягодных кустарников в долинах горных рек. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в трещине скалы. В кладке 3—5 белых с красноватыми крапинками яиц.

379. Полосатая тимелия — Garrulax lineatus Vig.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Небольшая пушистая птица с довольно длинным, широким, на конце клиновидным









хвостом. Держится стайками и парами на земле и на кустах, в самой их гуще. Испуганная, часто убегает по земле, задрав высоко кверху хвост. Крылья короткие, округлые. Общая окраска дымчато-серая, с золотисто-оливковым оттенком на спине. По всему телу разбросаны продольные узкие золотисто-рыжие пестрины. На конце хвоста поперечные темные и светлая полоски. *Г.* Протяжный свист «тью-ти-виу», «тьюююю-вии» и глухие трещащие звуки. *От.* В отличие от завирушек, хвост длинный, на конце клиновидный, окраска иная. *Б.* Заросли горных кустарников. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо на кусте. В кладке 3—4 голубовато-зеленых яйца.

380. Лесная завирушка — Prunella modularis L.

В. С воробья. *ОП.* Скрытная, держащаяся на земле и в кустах птичка. Во время пения самец взлетает на вершины деревьев. Верх тела коричневато-бурый, с продольными темными пестринами. Низ буровато-серый. Очень похожа на лесную завирушку японская завирушка, живущая на Сахалине и Курильских островах. *Г.* Негромкая трель «трьрьри». Песня — набор громких трелей. *От.* В отличие от других завирушек, окраска темная. *Б.* Различные типы леса с зарослями кустарника. *ХП.* На юге оседлая, на севере и в центральной полосе перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве или на кусте. В кладке 4—5 зеленовато-голубых яиц.

381. Альпийская завирушка — Prunella collaris Scop.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Малоподвижная птица. Держится на земле, камнях и скалах. Голова, зоб и верхняя часть тела буровато-серые. Горло белое, с черными пятнышками. Крылья и хвост черно-бурые, по бокам хвоста белые пятна. Бока тела ржаво-рыжие или с ржаво-рыжими полосами. *Г.* Негромкое «чирк-чирк». Песня — звонкие трели. *От.* В отличие от гималайской завирушки, величина несколько бо́льшая, на горле нет чисто-белого пятна. *Б.* Альпийские луга, скалы, осыпи и морены ледников. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в трещине скалы или под нависшим камнем. В кладке 3—5 голубоватых яиц.

382. Гималайская завирушка — Prunella himalayana Blyth

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку и стайками на камнях и скалах. Голова и верх шеи буровато-серые. Крылья, хвост и спина бурые. На спине продольные темные пестрины. Горло белое, с темными пятнышками по бокам. Низ тела беловатый, с большими частыми ржаво-коричневыми продольными пестринами. *Г.* Мелодичная трель. *От.* В отличие от альпийской завирушки, размер несколько меньший, на горле чисто-белое пятно. *Б.* Альпийские луга, скалы и морены ледников. *ХП.* Не выяснен, вероятно, перелетная птица. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке 4—6 голубых яиц.

383. Сибирская завирушка — Prunella montanella Pall.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая скрытная, молчаливая птичка. Держится в чаще кустов. Самец поет, взлетая на вершины деревьев. Верх тела буровато-серый, с продольными темными пестринами. Шапочка на голове и полоса от клюва через глаз, заканчивающаяся пятном на щеках, черные. Бровь беловатая. Низ тела охристо-желтоватый, с редкими темными пятнами на боках. *Г.* Тихая трель «тирррррль». Песня — набор громких трелей. *От.* В отличие от бледной завирушки, окраска более яркая. В отличие от черногорлой завирушки, горло светлое. *Б.* Заросли кустарников в тайге и по берегам рек. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 5 голубовато-зеленых яиц.

384. Бледная завирушка — Prunella fulvescens Sev.
Пестрая завирушка — Prunella ocularis Radde

В. С воробья. *ОП.* Скрытные птички, держащиеся в кустах по склонам. Верх тела светлый, буровато-серый, с ред-









кими продольными пестринами. Низ тела охристо-белый. Над глазом белая бровь. От клюва через глаз к уху идет темно-бурая полоса, заканчивающаяся большим пятном на щеках. *Г.* Негромкая трель. Песня — громкие трели. *От.* В отличие от черногорлой завирушки, горло светлое. Между собой в полевых условиях не различаются, но вместе не встречаются. *Б.* Горные кустарники среди скал и осыпей. *ХП.* Кочующие птицы. *Гн.* Гнездо на земле. В кладке по 4—5 голубых яиц. Гнезда построй завирушки на территории СССР не найдены.

385. Черногорлая завирушка — Prunella atrogularis Brandt

В. С воробья. *ОП.* Скрытная птичка, держащаяся в чаще кустов. Верх тела буровато-серый, с продольными темными пестринами. Низ тела охристый, брюшко беловатое. Горло, полоса через глаз и щеки черно-бурые. Над глазом охристая бровь. *Г.* Негромкая трель. Песня — громкие трели. *От.* В отличие от бледной завирушки, горло черное. *Б.* Горные хвойные и смешанные леса и кустарники. *ХП.* Кочующая птица. *Гн.* Гнездо на дереве. В кладке 4—5 голубых яиц.

386. Деревенская ласточка, или касатка — Hirundo rustica L.

В. С воробья. *ОП.* Обычно видна летающей или сидящей вертикально на проводе или на сухой тонкой ветке дерева. По-

лет быстрый, разнообразный. Крылья длинные, острые. Хвост с вырезкой посередине и длинными тонкими перьями — косицами — по бокам. Верх тела блестящий, сине-черный. Горло ржаво-коричневое, окаймленное черной полоской. Низ тела белый, с рыжеватым или розоватым налетом. Молодые окрашены более тускло и не имеют косиц. *Г.* Звонкое «тви-вит». Песня — «тиль-вили-тили-вили-ррр». *От.* В отличие от других ласточек, горло коричневое. *Б.* Поселки деревенского типа. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо под крышей постройки, под мостом. В кладке 4—6 белых с буровато-красными крапинками яиц.



387. Рыжепоясничная ласточка — Hirundo daurica L.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая ласточка. Видна чаще всего летающей или сидящей на проводе. Хвост раздвоенный, с двумя длинными перьями по бокам. Крылья длинные, острые. Верх тела сине-черный. Надхвостье и полоска, отделяющая шею от спины, рыжие. Низ тела рыжевато-белый, с продольными бурыми пестринами. *Г.* Негромкое щебетание и звуки, напоминающие мяуканье котенка. *От.* В отличие от деревенской ласточки, грудь и брюшко пестрые. *Б.* Скалы, обрывы и поселения человека. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на скале, в обрыве и в постройках. В кладке 5—6 белых яиц.

388. Нитчатая, или индийская, ласточка — Hirundo smithii Leach.

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая ласточка. Держится в одиночку, парами и небольшими стайками. У самцов по бокам хвоста два длинных нитевидных пера. У самки эти перья значительно короче. Верх тела блестящий, сине-черный. Низ тела белый. На голове рыже-желтая шапочка. *Г.* Негромкое щебетание. *От.* В отличие от других ласточек, шапочка на голове рыжая. *Б.* Обрывистые берега рек и других водоемов, а также поселки. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в скалах, постройках, обрывах, под мостами. В кладке 3—4 белых с красно-коричневыми крапинками яйца.

389. Городская ласточка, или воронок — Delichon urbica L.

В. С воробья. *ОП.* Держится стаями. Гнездится колониями. Верх тела сине-черный. Надхвостье и вся нижняя сторо-









на тела белые. Хвост с неглубокой вырезкой посередине. *Г.* Громкое «тирррч-тирррчт». *От.* В отличие от других ласточек, надхвостье белое. *Б.* Скалы и поселения человека. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на стенах скал или построек. В кладке 4—6 белых яиц.

390. Скалистая ласточка — Ptyonoprogne rupestris Scop.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая, с темным брюшком ласточка. Держится парами и стайками. Полет довольно медленный. Крылья довольно длинные, острые, хвост с неглубокой вырезкой на конце. Общая окраска дымчато-бурая, несколько более светлая на нижней стороне тела. *Г.* Негромкое щебетание. *От.* В отличие от других ласточек, низ тела дымчатый. *Б.* Скалистые ущелья. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на отвесных стенах скал. В кладке 3—4 белых с буровато-коричневыми крапинками яйца.

391. Ласточка-береговушка — Riparia riparia L.

В. С воробья. *ОП.* Небольшая ласточка. Держится стаями, гнездится колониями, обычно неподалеку от воды. Хвост с неглубокой вырезкой посередине. Верх тела серовато-бурый. Нижняя сторона белая, на зобе бурый «ошейник». *Г.* Негромкое «чирр-чирр» или «дирр-дирр». *От.* В отличие от других ласточек, на зобе бурый «ошейник». *Б.* Обры-

вистые глинистые или песчаные берега рек, обрывы и карьеры. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в норе. В кладке 4—6 белых яиц.



392. Малый острокрылый дятел— Dendrocopos kizuki Temm.

В. С воробья. *ОП.* Маленький дятел. Верх тела бурый. На спине и крыльях поперечные белые полоски. Низ тела беловатый. На зобе бурое кольцо. На груди и боках бурые продольные пестрины. *Г.* Громкий треск. *От.* В отличие от большого острокрылого дятла, спина бурая. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—6 белых яиц.

393. Большой острокрылый дятел — Dendrocopos nanus Vig.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Маленький дятел. Верх головы серый. По бокам затылка у самца отдельные красные перышки. Спина черная, с белыми поперечными полосками. Крылья черные, с белыми пятнами. Нижняя сторона тела желтовато-бурая, с продольными черными пестринами. *Г.* Громкое «кик». *От.* В отличие от малого пестрого дятла, низ тела темный. В отличие от малого острокрылого дятла, спина черная. *Б.* Различные типы леса. *ХП.* Оседлая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—7 белых яиц.

394. Малый пестрый дятел — Dendrocopos minor L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Маленький дятел. Верх тела черный, с широкими поперечными белыми полосами. Низ тела грязновато-белый, с темными пестринами на боках. У самца на голове красная с белыми пятнышками шапочка. *Г.* Громкое «кики-ки-ки-ки». *От.* В отличие от острокрылых дятлов, низ тела светлый. *Б.* Лиственные и смешанные светлые леса и пойменные рощи. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 5—9 белых яиц.

395. Вертишейка — Jynx torquilla L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Скрытная, держащаяся в листве деревьев и на земле птица. Сидя, вытягивает и поворачивает из стороны в сторону шею. Окраска сероватая, охристо-пепельная. На голове и спине продольные бурые по-

лоски. На хвосте темные поперечные полосы. Нижняя сторона тела с интенсивным охристым оттенком и поперечным тонким бурым рисунком. *Г.* Звонкое «кяй-кяй-кяй» и шипение. *От.* Окраска настолько своеобразна, что спутать вертишейку с какой-либо другой птицей трудно. *Б.* Светлые лиственные и смешанные леса. *ХП.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо в дупле. В кладке 6—12 белых яиц.

396. Зимородок — Alcedo atthis L.

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Небольшая, ярко окрашенная птичка с коротким хвостом и длинным, довольно толстым клювом. Обычно виден сидящим над водой на сухой ветке или коряге. Полет быстрый. Летит низко над водой. Голова и крылья темно-зеленые. Спина и хвост блестяще-голубые. Горло и полоса от клюва к уху беловатые. Нижняя сторона тела ржаво-рыжая. Клюв буровато-красный. *Г.* Звонкое «ки-ки-ки». *От.* Спутать с другой птицей нельзя. *Б.* Обрывистые берега рек. *ХП.* Оседлая и кочующая птица. *Гн.* Гнездо в норе. В кладке 6—7 белых яиц.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бёме Р. Л., Кузнецов А. А. Птицы лесов и гор СССР. М., 1966.

Воробьев К. А. Птицы Якутии. М., 1963.

Дементьев Г. П. и др. Определитель птиц СССР. М., 1964.

Долгушин И. А. и др. Птицы Казахстана. Алма-Ата, 1960—1974, т. 1—5.

Иванов А. И. Птицы Памиро-Алая. Л., 1969.

Иванов А. И., Штегман Б. К. Краткий определитель птиц СССР. Л., 1978.

Промптов А. Н. Птицы в природе. М., 1960.

Птицы Советского Союза/ Под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова. М., 1951—1954, т. I—VI.

Сунгуров А. Н. Экскурсионный определитель птиц европейской части СССР. М., 1960.

Флинт В. Е. и др. Птицы СССР, М., 1968.

ПОДЛЕЖАТ ОХРАНЕ

Приведенные в этом списке виды птиц охраняются законом, и мы с вами должны приложить все усилия для их сбережения. Птицы, которых Красная книга СССР называет находящимися под угрозой исчезновения, в настоящее время пребывают в опасном состоянии. Область их распространения продолжает сокращаться, численность все более и более уменьшается. Главные причины этого явления — прямое истребление птиц человеком и разрушение мест их обитания. То же происходит и с редкими птицами. Мы также можем потерять их навсегда, если не перестанем истреблять, а будем охранять, создавать специальные заповедники, заказники и разводить их в питомниках. Каждый из нас должен знать, какие птицы подлежат охране и как они называются. Поэтому мы приводим здесь названия не только тех птиц, которые обитают в лесах и горах, но и всех птиц нашей страны, подлежащих охране.

Список птиц, внесенных в Красную книгу СССР

А. Находящиеся под угрозой исчезновения

Белоспинный альбатрос — Diomedea albatrus Pall.
Красноногий ибис — Nipponia nippon Temm.
Дальневосточный белый аист — Ciconia ciconia boyciana Swinhoe
Краснозобая казарка — Rufibrenta rubicollis Pall.
Горный гусь — Anser indicus Lath.
Хохлатая пеганка — Tadorna cristata Kuroda
Чешуйчатый крохаль — Mergus squamatus Gould
Бородач — Gypaëtus barbatus L.
Кречет — Falco gyrfalco L.
Рыжеголовый сапсан, или шахин — Falco pelegrinoides Temm.
Каспийский улар — Tetraogallus caspius Gm.
Тибетский улар — Tetraogallus tibetanus Gould
Алтайский улар — Tetraogallus altaicus Gebler
Японский, или уссурийский, журавль — Grus japonensis Müller
Белый журавль, или стерх — Grus leucogeranus Pall.

Даурский журавль — Grus vipio Pall.
Черный журавль — Grus monacha Temm.
Джек, или вихляй — Chlamydotis undulata Jacquin
Охотский улит — Tringa guttifer Nordmann
Серпоклюв — Ibidorhyncha struthersi Vig.
Кроншнеп-малютка — Numenius minutus Gould
Тонкоклювый, или малый, кроншнеп—Numenius tenuirostris Viell.
Реликтовая чайка — Larus relictus Lönnberg
Тибетская саджа — Syrrhaptes tibetana Gould
Чешуйчатый дятел — Picus squamatus Vig.
Тростниковая сутора — Paradoxornis heudei David

Б. Редкие

Розовый пеликан — Pelecanus onocrotalus L.
Кудрявый пеликан — Pelecanus crispus Bruch
Черный аист — Ciconia nigra L.
Фламинго — Phoenicopterus roseus Pall.
Малый лебедь — Cygnus bewickii Yarrel
Белощекая казарка — Branta leucopsis Bechstein
Гусь-сухонос — Anser cygnoides L.
Гусь-белошей — Philacte canagica Sewastianoff
Мраморный чирок — Anas angustirostris Ménetries
Мандаринка — Aix galericulata L.
Савка — Oxyura leucocephala Scopoli
Белоплечий орлан — Haliaeetus pelagicus Pall.
Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla L.
Орлан-долгохвост — Haliaeetus leucoryphus Pall.
Кумай — Gyps fulvus himalayensis Hume
Беркут — Aquila chrysaëtus L.
Орел-могильник — Aquila heliaca Savigny.
Степной орел — Aquila rapax Temm.
Змееяд — Circaëtus gallicus Gm.
Скопа — Pandion haliaëtus L.
Сапсан — Falko peregrinus Tunst.
Балобан — Falko cherrug Gray
Кавказский тетерев — Lyrurus mlokosiewiczi Tacz.
Дикуша — Falcipennis falcipennis Hartl.
Турач — Francolinus francolinus L.
Султанка — Porphyrio porphyrio L.
Дрофа — Otis tarda L.
Стрепет — Otis tetrax L.
Кречетка — Chettusia gregaria Pall.
Азиатский бекасовидный веретенник — Limnodromus semipalmatus Blyth.
Кулик-лопатень — Eurynorhynchus pygmaeus L.
Розовая чайка — Rhodostethia rosea Mac-Gilliwray

Буроголовая чайка — Larus brunnicephalus Jerdon
Алеутская крачка — Sterna aleutica Baird
Белогрудый голубь — Columba leuconota Vig.
Пустынный воробей — Passer simplex Licht.
Большой чекан — Saxicola insignis Gray

В заключение мы хотим напомнить, что все птицы приносят пользу человеку. Птиц, вредных при всяких условиях, всегда и везде, не существует. Поэтому охранять надо не только приведенных в этом списке, но и всех остальных птиц.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ

Звездочками отмечены страницы, на которых помещены рисунки; римскими цифрами обозначены номера цветных таблиц.

А

Аист белый 11, 13*
— черный 11, 13*

Б

Баклан большой 28*, 31
— малый 63*, 68
Балобан 55, VIII
Бекас 107*, 125
— азиатский 126
— -отшельник, или дупель горный 107*, 126
Белоглазка буробокая 171, XXXIX
Белоножка, или дрозд пегий 160, XXXV
Беркут 15, 16*
Бородач 17*, 19

В

Вальдшнеп 89, 91*
Варакушка 193, XLIV
Вертишейка 205, XLVIII
Воробей домовый 134, XXIV
— каменный 135, XXIV
— короткопалый 135, XXIV
— полевой 135, XXIV
— черногрудый 134, XXIV
Ворон 51, 52*
Ворона большеклювая 51, 52*
— серая 50, 52*
— черная 50, 52*
Вьюрок, или юрок 146, XXVIII
— альпийский, или снежный 147, XXIX
— буланый 143, XXVIII
— гималайский 146, XXIX
— жемчужный 147, XXIX
— канареечный 140, XXVI
— королевский 139, XXVI
— красный 108, XIX
— сибирский 147, XXIX
Выпь 44, VII
— малая 63*, 68
Вяхирь 74*, 82

Г

Гагара краснозобая 23, I
— полярная 23, I
— чернозобая 23, I
Гаичка буроголовая, или пухляк 167
— сероголовая 167, XXXVIII
— средиземноморская 168, XXXVIII
— черноголовая 167, XXXVIII
Галка 76, XI
— альпийская 79, XI
— даурская 77, XI
Гаршнеп 107*, 127
Глухарь 22, I
— каменный 22, I
Гоголь 41, V
Голубь белогрудый 74*, 81
— бурый 74*, 82
— сизый 74*, 81
— скалистый 74*, 81
Горихвостка 197, XLV
— белошапочная 199, XLV
— краснобрюхая 199, XLV
— рыжеспинная 198, XLV

Горихвостка седоголовая 197, XLV
— сибирская 197, XLV
— -чернушка 198, XLV
Горлица 75*, 83
— большая 75*, 83
— кольчатая 75*, 83
— малая 75*, 83
Грач 50, 52*
Гриф черный 17*, 19
Гуменник 25*, 27
Гусь белолобый 25*, 27
— горный 25*, 30
— серый 25*, 26
— -сухонос 25*, 27

Д

Дербник 93, XV
Дикуша 69, IX
Дрозд-белобровик 114, XX
— белогорлый 118, XXII
— белозобый 99*, 116
— бледный 116, XXI
— -деряба 111, XX
— каменный пестрый 117, XXII
— —синий 118, XXII
— малый 115, XXI
— Науманна 114, XXI
— певчий 111, XX
— пестрый, или земляной 110, XX
— -рябинник 111, XX
— сибирский 111, XX
— сизый 115, XXI
— темнозобый 115, XXI
— черный 99*, 117
Дубонос 105, XIX
— арчовый 104, XIX
— черноголовый большой 104, XIX
— — малый 136, XXV
Дубровник 151, XXXI
Дупель 107*, 125
— лесной 127
Дятел белокрылый 102
— белоспинный 103, XVIII
— зеленый 80, XII
— острокрылый большой 205, XLVIII
— — малый 205, XLVIII
— пестрый большой 102, XVIII
— — малый 205, XLVIII
— — средний 103, XVIII
— седой 80, XII
— сирийский 103, XVIII
— трехпалый, или желтоголовый 103, XVIII
— черный 51, 52*
— чешуйчатый 81, XII

Ж

Жаворонок лесной, или юла 144*, 159
— малый 144*, 159
— полевой 144*, 158
— пустынный, или вьюрковый 144*, 159
— рогатый 144*, 157
— серый 159
— тонкоклювый 159
— хохлатый 144*, 158
Жулан 175, XL
— индийский 174, XL
Журавль даурский 10, 12*
— серый 10, 12*
— уссурийский 10, 12*
— черный 11, 12*

З

Завирушка альпийская 201, XLVI
— бледная 201, XLVI
— гималайская 201, XLVI
— лесная 200, XLVI
— пестрая 201
— сибирская 201, XLVI
— черногорлая 202, XLVI
Зарянка 196, XLIV
— японская 196, XLIV
Зеленушка 137, XXV
— китайская 137, XXV
Зимняк, или канюк мохноногий 57*, 60
Зимородок 206, XLVIII
Змееяд 29*, 32

Зуек большеклювый 106*, 124
— короткоклювый 106*, 124
— малый 106*, 123
Зяблик 143, XXVIII

И

Иволга 100, XVII
— черноголовая 100, XVII

К

Каменка 188, 195*
— златогузая 187, 195*
— -плясунья 188, 195*
— пустынная 189
— черная 189, 195*
— черногегая 189, 195*
— черношейная 189, 195*
Каменушка 44, VI
Камышница 84, XIII
Камышовка дроздовидная 98*, 110
— толстоклювая 98*, 109
Камышовки 181, 182*
Канюк обыкновенный 56*, 59
— ястребиный 56*, 59
Касатка (утка) 37, IV
Кедровка 78, XI
Кеклик 70, IX
Клест белокрылый 148, XXX
— -еловик 148, XXX
— -сосновик 148, XXX
Клинтух 74*, 82
Клушица 78, XI
Кобчик 90, XV
Козодой 101, XVII
— большой 101
Коноплянка 138, XXVI
Коньки 145*, 162
Королек желтоголовый 169, XXXIX
— красноголовый 169, XXXIX
Коростель, или дергач 120, XXIII
Короткохвостка 181, 183*
Коршун красный 57*, 61
— черный 57*, 61
Крапивник 181, 183*
Красношейка черногрудая 193,XLIV
Крачка речная 75*, 84
Кречет 54, VIII
Кроншнеп большой 45, VII
— -малютка 90, 91*
— средний 45, VII
Крохаль большой 35, III
— длинноносый, или средний 36, III
— чешуйчатый 36, III
Кряква 37, IV
Кукушка 85, XIII
— глухая 85
— малая 85, XIII
— ширококрылая 85, XIII
Кукша 79, XII
Курганник 57*, 60
— мохноногий 57*, 61
Куропатка белая 69, IX
— бородатая, или даурская 73, X
— пустынная 72, X
— серая 72, X
— тундряная 69, IX

Л

Лазоревка 165, XXXVII
— белая 165, XXXVII
Ласточка-береговушка 204, XLVII
— городская, или воронок 203, XLVII
— деревенская, или касатка 202, XLVII
— нитчатая, или индийская 203, XLVII
— рыжепоясничная 203, XLVII
— скалистая 204, XLVII
Лебедь-кликун 13*, 14
Личинкоед серый 171, XL
Лунь болотный 53*, 55
— луговой 53*, 55
— пегий 53*, 55
— полевой 53*, 55
— степной 53*, 55
Луток 36, III

М

Майна 97, XVI
Мандаринка 39, IV
Мородунка 106*, 123

Морянка 42, VI
Мухоловка-белошейка 172*, 176
— желтоспинная 177, XLI
— малая 177, XLI
— Мугимаки, или таежная 177, XLI
— пестрогрудая 172*, 175
— -пеструшка 172*, 176
— райская 179, XLI
— рыжехвостая 178, XLI
— серая 172*, 175
— сибирская 175
— синяя 178, XLI
— ширококлювая 172*, 175

Н

Неясыть бородатая 28*, 31
— длиннохвостая 62*, 64
— серая 62*, 64
Нырок белоглазый 40, V
— Бэра 41, V
— красноголовый 41, V

О

Овсянка белошапочная 149, XXXI
— горная 151, XXXII
— желтобровая 153, XXXII
— желтогорлая 153, XXXII
— желчная 150, XXXI
— камышовая 155, XXXIV
— красноухая 149, XXXIII
— -крошка 154, XXXIV
— обыкновенная 149, XXXI
— ошейниковая 153, XXXIII
— полярная 154, XXXIV
— -ремез 156, XXXIII
— рыжая 150, XXXI
— рыжешейная 155, XXXIV
— садовая 152, XXXII
— седоголовая 157, XXXIII
— скалистая 153, XXXII
— Стюарта 151, XXXII
— таежная, или черногорлая 156, XXXIII
— черноголовая 155, XXXIV
— японская 157, XXXIII
Огарь 35, III
Оляпка бурая 99*, 117
— обыкновенная 99*, 117
Орел-карлик 57*, 59
— -могильник 16*, 18
— ястребиный 29*, 32
Орлан белоплечий 16*, 18
— -белохвост 15, 16*
— -долгохвост 15, 16*
Осоед 56*, 59
— хохлатый 56*, 59

П

Пастушок 121, XXIII
Пеночки 179, XLII
Перевозчик 106*, 122
Перепел 121, XXIII
— японский 122, XXIII
Перепелятник малый 94, XV
Пересмешки, или бормотушки 183*, 184
Песочник большой 106*, 125
Пискулька 25*, 27
Пищуха 163, XXXVI
— гималайская 163, XXXVI
— короткопалая 163
Поганка большая 46, VII
— красношейная 47, VII
— малая 47, VII
— серощекая 46, VII
— черношейная 47, VII
Погоныш 119, XXIII
— большой 120, XXIII
— -крошка 121, XXIII
— малый 121, XXIII
Подорлик большой 29*, 31
— малый 31
Поползень 163, XXXVI
— скалистый 164, XXXVI
— черноголовый 165, XXXVI
Просянка 148, XXXI
Пустельга обыкновенная 92, XV
— степная 92

Р

Ремез 169, XXXIX
Ржанка бурокрылая 87, XIV

— золотистая 86, XIV
Рябок белобрюхий 76, X
— чернобрюхий 76, X
Рябчик 70, IX

С

Саджа 73, X
— тибетская 73, X
Сапсан 54, VIII
Сверчки 180
Сверчок обыкновенный 173*, 180
— певчий 180
— пятнистый 173*, 180
— речной 173*, 180
— соловьиный 173*, 180
— таежный 173*, 180
Свиристель 119, XXII
— амурский 119, XXII
Свиязь 38, IV
Серпоклюв 87, XIV
Сизоворонка 85, XIII
Синехвостка 190, XLIII
Синица большая 165, XXXVII
— длиннохвостая 169, XXXIX
— рыжешейная 166, XXXVIII
— хохлатая, или гренадерка 168, XXXVIII
— черная, или московка 166
— японская, или тиссовая 167, XXXIX
Синичка расписная 170, XXXIX
Синьга тихоокеанская 44, VI
Синяя птица 79, XII
Сип белоголовый 17*, 19
Сипуха 62*, 66
Скворец 96, XVI
— малый 97, XVI
— розовый 96, XVI
— серый 97, XVI
Скопа 29*, 32
Скотоцерка 187, 194*
Славка белоусая 187, 194*
— -мельничек, или завирушка 186, 194*
— певчая 185, 194*
— садовая 185, 194*
— серая 186, 194*
— -черноголовка 185, 194*
— ястребиная 184, 194*
Снегирь 141, XXVII
— длиннохвостый 140, XXVII
— пустынный 142, XXVIII
Сова болотная 62*, 65
— иглоногая 62*, 66
— ушастая 62*, 65
— ястребиная 62*, 65
Совка буланая, или пустынная 112*, 129
— восточноазиатская 129
— ошейниковая 112*, 128
Сойка 79, XII
Соловей 192, XLIII
— -белошейка 191, XLIV
— -красношейка 193, XLIV
— -свистун 191, XLIII
— синий 191, XLIII
— тугайный 191, XLIII
— южный 192, XLIII
Сорока 77, XI
— голубая 77, XI
Сорокопут длиннохвостый 174, XL
— клинохвостый 98*, 109, XL
— красноголовый 175
— серый 98*, 108
— чернолобый 98*, 109
— японский 171, XL
Сплюшка 112*, 128
Стенолаз 163, XXXVI
Стервятник 17*, 20
Стриж белобрюхий 113*, 131
— белопоясный 113*, 131
— иглохвостый 113*, 132
— малый 113*, 131
— черный 113*, 131
Сутора бурая 170, XXXIX
Сыч воробьиный 112*, 130
— домовый 112*, 130
— мохноногий 112*, 129

Т

Тетерев 34, II
— кавказский 34, II
Тимелия полосатая 199, XLVI
Трясогузка белая 161, XXXV

Трясогузка горная 161, XXXV
— древесная 160, XXXV
— желтая 162, XXXV
— желтоголовая 161, XXXV
Турпан 43, VI
— горбоносый 43, VI
Турухтан 88, XIV

У

Удод 86, XIII
Улары 24*, 26
Улит большой 89, 91*
— охотский 89
— пепельный 89, 91*

Ф

Фазан 35, II
Филин 28*, 30
— рыбный, или гололапый 28*, 30
Фифи 106*, 123

Х

Хрустан 87, XIV

Ц

Цапля серая 13*, 14

Ч

Чайка буроголовая 67
— малая 63*, 67
— озерная 63*, 67
— сизая 63* 67
Чеглок 90, XV
Чекан луговой 189, XLIII
— черноголовый 189, XLIII
Чернеть морская 43, VI
— хохлатая 42, VI
Черныш 106*, 122
Чечевица 141, XXVII
— большая 105, XIX
— розовая 142, XXVII
— сибирская 141, XXVII
Чечевичник краснокрылый 143, XXVIII
Чечетка 139, XXVI
— горная 138, XXVI
Чиж 137, XXV
Чирок-клоктун 39, V
— -свистунок 39, V
— -трескунок 40, V

Ш

Шилохвость 37, IV
Широкорот 101, XVII
Широконоска 38, IV

Щ

Щегол 136, XXV
Щеголь 88, XIV
Щур 105, XIX
Щурка зеленая 101, XVII
— золотистая 101, XVII

Я

Ястреб-перепелятник 93, XV
— -тетеревятник 56*, 58
— -тювик 93, XV

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

A

Acanthis cannabina L. 138
— flammea L. 139
— flavirostris L. 138
Accipiter badius Gm. 93
— gentilis L. 58
— gularis Temm. et Schleg. 94
— nisus L. 93
Acridotheres tristis L. 97
Acrocephalus arundinaceus L. 110
Aegithalos caudatus L. 169
Aegolius funereus L. 129
Aegypius monachus L. 19
Aix galericulata L. 39
Alauda arvensis L. 158
Alcedo atthis L. 206
Alectoris kakelik Falck 70
Ammomanes deserti Licht. 159
Ammoperdix griseogularis Br. 72
Anas acuta L. 37
— clypeata L. 38
— crecca L. 39
— falcata Georgi 37
— formosa Georgi 39
— penelope L. 38
— platyrhynchos L. 37
— querquedula L. 40
Anser albifrons Scop. 27
— anser L. 26
— cygnoides L. 27
— erythropus L. 27
— fabalis Lath. 27
— indicus Lath. 30
Anthus 162
Apus affinis Gray 131
— apus L. 131
— melba L. 131
— pacificus Lath. 131
Aquila chrysaëtus L. 15
— clanga Pall. 31
— fasciata Vieill. 32
— heliaca Savigny. 18
— pennata Gm. 59
— pomarina Brehm 31
Ardea cinerea L. 14
Asio flammeus Pontopp. 65
— otus L. 65
Athene noctua Scop. 130
Aythya baeri Radde 41
— ferrina L. 41
— fuligula L. 42
— marilla L. 43
— nyroca Güld. 40

B

Bombycilla garrulus L. 119
— japonica Sieb. 119
Botaurus stellaris L. 44
Bradypterus 181
Bubo bubo L. 30
Bucanetes githagineus Licht. 142
Bucephala clangula L. 41
Butastur indicus Gm. 59
Buteo buteo L. 59
— hemilasius Temm. et Schleg. 61
— lagopus Pontopp. 60
— rufinus Cretzschmar 60

C

Calandrella acutirostris Hume 159
— cinerea Gm. 159
— rufescens Vieill. 159

Calidris tenuirostris Horsf. 125
Caprimulgus europaeus L. 101
— indicus Lath. 101
Carduelis carduelis L. 136
Carpodacus erythrinus Pall. 141
— rhodochlamys Bp. 142
— roseus Pall. 141
— rubicilla Güld. 105
Carpospiza brachydactyla Bp. 135
Catharus minimus Lafresn. 115
Certhia brachydactyla Brehm 163
— familiaris L. 163
— himalayana Vig. 163
Cettia 181
Chaimarrornis leucocephalus Vig. 199
Charadrius apicarius L. 86
— dominicus Müll. 87
— dubius Scop. 123
— leschenaultii Less. 124
— mongolus Pall. 124
— morinellus L. 87
Chloris chloris L. 137
— sinica L. 137
Ciconia ciconia L. 11
— nigra L. 11
Cinclus cinclus L. 117
— pallasii Temm. 117
Circaëtus gallicus Gm. 32
Circus aeruginosus L. 55
— cyaneus L. 55
— macrourus Gm. 55
— melanoleucus Penn. 55
— pygargus L. 55
Clangula hyemalis L. 42
Coccothraustes coccothraustes L. 105
Coloeus davuricus Pall. 77
— monedula L. 76
Columba eversmanni Bp. 82
— leuconota Vig. 81
— livia L. 81
— oenas L. 82
— palumbus L. 82
— rupestris Pall. 81
Coracias garrulus L. 85
Corvus corax L. 51
— cornix L. 50
— corone L. 50
— frugilegus L. 50
— levaillantii Less. 51
Coturnix coturnix L. 121
Crex crex L. 120
Cuculus canorus L. 85
— poliocephalus Lath. 85
— saturatus Blyth 85
Cyanopica cyana Pall. 77
Cygnus cygnus L. 14

D

Delichon urbica L. 203
Dendrocopos kizuki Temm. 205
— leucopterus Salvad. 102
— leucotos Bechst. 103
— major L. 102
— medius L. 103
— minor L. 205
— nanus Vig. 205
— syriacus Hempr. et Ehr. 103
Dendronanthus indicus Gm. 160
Dryocopus martius L. 51

E

Emberiza aureola Pall. 151
— bruniceps Brandt 150
— buchanani Blyth 153
— calandra L. 148
— chrysophrys Pall. 153
— cia L. 151
— cioides Brandt 149
— citrinella L. 149
— elegans Temm. 153
— fucata Pall. 153
— hortulana L. 152
— leucocephalos Gm. 149
— melanocephala Scop. 155
— pallasi Cab. 154
— pusilla Pall. 154
— rustica Pall. 156
— rutila Pall. 150
— schoeniclus L. 155
— spodocephala Pall. 157
— stewarti Blyth 151
— tristrami Swinh. 156
— variabilis Temm. 157
— yessoënsis Swinh. 155

Enicurus scouleri Vig. 160
Eophona migratoria Hart. 136
— personata Temm. et Schleg. 104
Eremophila alpestris L. 157
Erithacus akahige Temm. 196
— rubecula L. 196
Erythropygia galactotes Temm. 191
Eurystomus orientalis L. 101

F

Falcipennis falcipennis Hartl. 69
Falco cherrug Gray 55
— columbarius L. 93
— gyrfalco L. 54
— naumanni Fleisch. 92
— peregrinus Tunst. 54
— subbuteo L. 90
— tinnunculus L. 92
— vespertinus L. 90
Fringilla coelebs L. 143
— montifringilla L. 146

G

Galerida cristata L. 158
Gallinago gallinago L. 125
— media Lath. 125
— megala Swinh. 127
— solitaria Hodgs. 126
— stenura Bp. 126
Gallinula chloropus L. 84
Garrulax lineatus Vig. 199
Garrulus glandarius L. 79
Gavia arctica L. 23
— immer Brünn. 23
— stellata Pontop. 23
Glaucidium passerinum L. 130
Grus grus L. 10
— japonensis Müll. 10
— monacha Temm. 11
— vipio Pall. 10
Gypaëtus barbatus L. 19
Gyps fulvus Habl. 19

H

Haliaeetus albicilla L. 15
— leucoryphus Pall. 15
— pelagicus Pall. 18
Hierococcyx fugax Horsf. 85
Hippolais 184
Hirundapus caudacutus Lath. 132
Hirundo daurica L. 203
— rustica L. 202
— smithii Leach. 203
Histrionicus histrionicus L. 44

I

Ibidorhyncha struthersi Vig. 87
Irania gutturalis Guér. 191
Ixobrychus minutus L. 68

J

Jynx torquilla L. 205

K

Ketupa blakistoni Gm. 30

L

Lagopus lagopus L. 69
— mutus Montin 69
Lanius bucephalus Temm. et Schleg. 171
— cristatus L. 175
— excubitor L. 108
— minor Gm. 109
— schach L. 174
— senator L. 175
— sphenocercus Cab. 109
— vittatus Valenc. 174
Larus canus L. 67
— minutus Pall. 67
— ridibundus L. 67
Leptopoecile sophiae Sew. 170
Leucosticte arctoa Pall. 147
— brandti Bp. 147
— nemoricola Hodgs. 146
Locustella 180
Loxia curvirostra L. 148
— leucoptera Gm. 148
— pytyopsittacus Borkh. 148

Lulula arborea L. 159
Luscinia calliope Pall. 193
— cyane Pall. 191
— luscinia L. 192
— megarhynchos L. 192
— pectoralis Gould. 193
— sibilans Swinh. 191
— svecica L. 193
Lusciniola 181
Lymnocryptes minima Brünn. 127
Lyrurus mlokosiewiczi Tacz. 34
— tetrix L. 34

M

Melanitta americana Swains. 44
— deglandi Bp. 43
— fusca L. 43
Mergus albellus L. 36
— merganser L. 35
— serrator L. 36
Merops apiaster Pall. 101
— superciliosus L. 101
Milvus korschun Gm. 61
— milvus L. 61
Monticola saxatilis L. 117
— solitarius L. 118
Montifringilla nivalis L. 147
Motacilla alba L. 161
— cinerea Tunst. 161
— citreola Pall. 161
— flava L. 162
Muscicapa albicollis Temm. 176
— cyanomelana Temm. 178
— griseisticta Swinh. 175
— hypoleuca Pall. 176
— latirostris Raffl. 175
— mugimaki Temm. 177
— narcissina Temm. 177
— parva Bechst. 177
— ruficauda Swains. 178
— sibirica Gm. 175
— striata Pall. 175
Mycerobas carnipes Hodgs. 104
Myophonus coeruleus Scop. 79

N

Neophron percnopterus L. 20
Ninox scutulata Raffles 66
Nucifraga caryocatactes L. 78
Numenius arquata L. 45
— borealis Forster 90
— phaeopus L. 45

O

Oenanthe deserti Temm. 189
— finchii Heugl. 189
— hispanica L. 189
— isabellina Temm. 188
— oenanthe L. 188
— picata Blyth 189
— xanthoprymna Hempr. et Ehr. 187
Oriolus chinensis L. 100
— oriolus L. 100
Orocetes gularis Swinh. 118
Otus bakkamoena Penn. 128
— brucei Hume 129
— scops L. 128
— sunia Hodgs. 129

P

Pandion haliaëtus L. 32
Parus ater L. 166
— caeruleus L. 165
— cinctus Bodd. 167
— cristatus L. 168
— cyanus Pall. 165
— lugubris Temm. 168
— major L. 165
— montanus Bald. 167
— palustris L. 167
— rufonuchalis Blyth 166
— varius Temm. et Schleg. 167
Passer domesticus L. 134
— hispaniolensis Temm. 134
— montanus L. 135
Perdix daurica Pall. 73
— perdix L. 72
Pericrocotus divaricatus Raffl. 171
Perisoreus infaustus L. 79
Pernis apivorus L. 59
Petronia petronia L. 135
Phalacrocorax carbo L. 31
— pygmaeus Pall. 68
Phasianus colchicus L. 35

Philomachus pugnax L. 88
Phoenicurus auroreus Pall. 197
— caeruleocephalus Vig. 197
— erythrogaster Güld. 199
— erythronotus Eversm. 198
— ochruros Gm. 198
— phoenicurus L. 197
Phragamaticola aêdon Pall. 109
Phylloscopus 179
Pica pica L 77
Picoides tridactylus L. 103
Picus canus Gm. 80
— squamatus Vig. 81
— viridis L. 80
Pinicola enucleator L. 105
Podiceps auritus L. 47
— cristatus L. 46
— griseigena Bodd. 46
— nigricollis Brehm 47
— ruficollis Pall. 47
Porzana parva Scop. 121
— paykülliі Ljugh. 120
— porzana L. 119
— pusilla Pall. 121
Prunella atrogularis Brandt 202
— collaris Scop. 201
— fulvescens Sev. 201
— himalayana Blyth. 201
— modularis L. 200
— montanella Pall. 201
— ocularis Radde 201
Pterocles alchata L. 76
— orientalis L. 76
Ptyonoprogne rupestris Scop. 204
Pyrrhocorax graculus L. 79
— pyrrhocorax L. 78
Pyrrhospiza punicea Hume 108
Pyrrhula pyrrhula L. 141

R

Rallus aquaticus L. 121
Regulus ignicapillus Temm. 169
— regulus L. 169
Remiz pendulinus L. 169
Rhodopechys sanguinea Gould 143
Rhodospiza obsoleta Licht. 143
Riparia riparia L. 204

S

Saxicola rubetra L. 189
— torquata L. 189
Scolopax rusticola L. 89
Scotocerca inquieta Cretzschm. 187
Serinus canaria L. 140
— pusillus Pall. 139
Sitta europaea L. 163
— krüperi Pelz. 165
— tephronota Sharpe 164
Spinus spinus L. 137
Spodiopsar cineraceus Temm. 97
Sterna hirundo L. 84
Streptopelia decaocto Frivald. 83
— orientalis Lath. 83
— senegalensis L. 83
— turtur L. 83
Strix aluco L. 64
— nebulosa Forst. 31
— uralensis Pall. 64
Sturnia sturnina Pall. 97
Sturnus roseus L. 96
— vulgaris L. 96
Surnia ulula L. 65
Suthora webbiana Gray 170
Sylvia atricapilla L. 185
— borin Bodd. 185
— communis Lath. 186
— curruca L. 186
— hortensis Gm. 185
— mystacea Menetr. 187
— nisoria Bechst. 184
Syrrhaptes paradoxus Pall. 73
— tibetanus Gould 73

T

Tadorna ferruginea Pall. 35
Tarsiger cyanurus Pall. 190
Terekia cinerea Güld. 123
Terpsiphone paradisi L. 179
Tetraogallus 26
Tetrao parvirostris Bp. 22
— urogallus L. 22
Tetrastes bonasia L. 70
Tichodroma muraria L. 163
Tringa brevipes Vieillot 89

Tringa erythropus Pall. 88
— glareola L. 123
— hypoleucos L. 122
— nebularia Gunn. 89
— ochropus L. 122
Troglodytes troglodytes L. 181
Turdus hortulorum Sclat. 115
— iliacus L. 114
— merula L. 117
— naumanni Temm. 114
— pallidus Gm. 116
— philomelos Brehm 111
— pilaris L. 111
— ruficollis Pall. 115
— sibiricus Pall. 111
— torquatus L. 116
— viscivorus L. 111
Tyto alba Scop. 66

U

Uragus sibiricus Pall. 140
Urosphena squameiceps Swinh. 181
Upupa epops L. 86

Z

Zootera dauma Lath. 110
Zosterops erythropleurus Swinh. 171

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов 5
Введение 6
Как пользоваться определителем 8
Птицы крупнее гуся 9
Птицы величиной с гуся 21
Птицы величиной с курицу или утку 33
Птицы величиной с ворону 49
Птицы величиной с голубя или галку 71
Птицы величиной со скворца 95
Птицы величиной с воробья и мельче 133
Список рекомендуемой литературы 207
Подлежат охране 208
Алфавитный указатель русских названий 211
Алфавитный указатель латинских названий 217

БЁМЕ РЮРИК ЛЬВОВИЧ
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПТИЦЫ ЛЕСОВ И ГОР СССР

Редактор **В. И. Полетаева**
Редактор карт **М. Я. Подольская**
Художник **Е. Т. Яковлев**
Художественный редактор **В. Г. Ежков**
Технический редактор **С. Н. Терехова**
Корректоры **Г. Л. Нестерова** и **Г. В. Хрусталева**

ИБ № 5530

Сдано в набор 05.12.80. Подписано к печати 22.06.81. 60×90¹/₁₆. Бум. типограф. № 1. Гарн. об. нов. Печать высокая. Усл. печ. л. 14 + вкл. 3 п. л. + форз. 0,25. Усл. кр. отт. 26,5 л. Уч.-изд. л. 13,58 + вкл. 2,90 + форз. 0,43. Тираж 100 000 экз. Заказ № 702. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано с матриц Саратовского ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбината на Калининском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Таблица I.

1. Глухарь (самец). 2. Глухарь (самка). 3. Каменный глухарь (самец). 4. Каменный глухарь (самка). 5. Полярная гагара (весенняя). 6. Полярная гагара (осенняя). 7. Краснозобая гагара (весенняя). 8. Краснозобая гагара (осенняя). 9. Чернозобая гагара (весенняя). 10. Чернозобая гагара (осенняя).

Таблица II.

1. Тетерев (самец). 2. Тетерев (самка). 3. Кавказский тетерев. 4. Кавказский фазан (самец). 5. Амударьинский фазан (самец). 6. Маньчжурский фазан (самец). 7. Фазан (самка).

Таблица III.

1. Огарь. 2. Чешуйчатый крохаль (самец). 3. Большой крохаль (самец). 4. Большой крохаль (самка). 5. Средний крохаль (самец). 6. Средний крохаль (самка). 7. Луток (самец). 8. Луток (самка).

Таблица IV.

1. Кряква (самец). 2. Кряква (самка). 3. Мандаринка (самец). 4. Мандаринка (самка). 5. Шилохвость (самец). 6. Шилохвость (самка). 7. Касатка (самец). 8. Касатка (самка). 9. Свиязь (самец). 10. Свиязь (самка). 11. Широконоска (самец). 12. Широконоска (самка).

Таблица V.

1. Гоголь (самец). 2. Гоголь (самка). 3. Белоглазый нырок. 4. Красноголовый нырок (самец). 5. Красноголовый нырок (самка). 6. Нырок Бэра (самец). 7. Нырок Бэра (самка). 8. Чирок-свистунок (самец). 9. Чирок-свистунок (самка). 10. Чирок-трескунок. 11. Чирок-клоктун.

Таблица VI.

1. Морская чернеть. 2. Хохлатая чернеть (самец). 3. Хохлатая чернеть (самка). 4. Горбоносый турпан. 5. Турпан (самец). 6. Турпан (самка). 7. Тихоокеанская синьга (самец). 8. Тихоокеанская синьга (самка). 9. Морянка. 10. Каменушка (самец). 11. Каменушка (самка).

Таблица VII.

1. Большой кроншнеп. 2. Средний кроншнеп. 3. Выпь. 4. Большая поганка, или чомга (весенняя). 5. Чомга (осенняя). 6. Красношейная поганка (весенняя). 7. Красношейная поганка (осенняя). 8. Серощекая поганка (весенняя). 9. Серощекая поганка (осенняя). 10. Малая поганка (весенняя). 11. Малая поганка (осенняя). 12. Черношейная поганка (весенняя). 13. Черношейная поганка (осенняя).

Таблица VIII.

1. Кречет (белый). 2. Кречет (серый). 3. Сапсан. 4. Рыжеголовый сапсан. 5. Сапсан молодой. 6. Балобан. 7. Алтайский балобан.

Таблица IX.

1. Белая куропатка (летняя). 2. Белая куропатка (зимняя). 3. Тундряная куропатка (летняя). 4. Тундряная куропатка (зимняя). 5. Дикуша. 6. Рябчик. 7. Кеклик.

Таблица X.

1. Пустынная куропатка. 2. Серая куропатка. 3. Бородатая куропатка. 4. Чернобрюхий рябок. 5. Белобрюхий рябок. 6. Тибетская саджа. 7. Саджа, или копытка.

Таблица XI.

1. Кедровка. 2. Голубая сорока. 3. Сорока. 4. Галка. 5. Клушица. 6. Даурская галка. 7. Альпийская галка.

Таблица XII.

1. Сойка. 2. Черноголовая сойка. 3. Рыжеголовая сойка. 4. Кукша. 5. Синяя птица. 6. Седой дятел. 7. Чешуйчатый дятел. 8. Зеленый дятел.

Таблица XIII.

1. Камышница (весенняя). 2. Камышница (осенняя). 3. Кукушка. 4. Ширококрылая кукушка. 5. Малая кукушка. 6. Сизоворонка. 7. Удод.

Таблица XIV.

1. Бурокрылая ржанка. 2. Серпоклюв. 3. Золотистая ржанка (весенняя). 4. Золотистая ржанка (осенняя). 5. Хрустан. 6. Щеголь (весенний). 7. Щеголь (осенний). 8. Турухтан (самка). 9. Турухтан (весенний). 10, 11. Турухтан в брачном наряде.

Таблица XV.

1. Чеглок. 2. Кобчик (самка). 3. Кобчик (самец). 4. Дербник. 5. Ястреб-тювик. 6. Ястреб-перепелятник. 7. Обыкновенная пустельга. 8. Малый перепелятник.

Таблица XVI.

1. Скворец (взрослый). 2. Скворец (молодой). 3. Розовый скворец (взрослый). 4. Розовый скворец (молодой) 5. Серый скворец. 6. Малый скворец. 7. Японский малый скворец. 8. Майна.

Таблица XVII.

1. Черноголовая иволга. 2. Иволга. 3. Широкорот. 4. Золотистая щурка. 5. Зеленая щурка. 6. Козодой.

Таблица XVIII.

1. Сирийский дятел. 2. Белоспинный дятел. 3. Средний пестрый дятел. 4. Большой пестрый дятел (самец). 5. Большой пестрый дятел (самка). 6. Трехпалый дятел (самец). 7. Трехпалый дятел (самка).

Таблица XIX.

1. Большая чечевица (самец). 2. Большая чечевица (самка). 3. Щур (самец). 4. Щур (самка). 5. Красный вьюрок (самец). 6. Красный вьюрок (самка). 7. Дубонос (взрослый). 8. Дубонос (молодой). 9. Большой черноголовый дубонос (взрослый). 10. Большой черноголовый дубонос (молодой). 11. Арчовый дубонос (самец). 12. Арчовый дубонос (самка).

Таблица XX.

1. Дрозд-рябинник. 2. Дрозд-деряба. 3. Певчий дрозд. 4. Пестрый, или земляной дрозд. 5. Дрозд-белобровик. 6. Сибирский дрозд.

Таблица XXI.

1. Темнозобый дрозд (самец). 2. Темнозобый дрозд (самка). 3. Краснозобый дрозд. 4. Малый дрозд. 5. Дрозд Науманна (рыжий). 6. Дрозд Науманна (темный). 7. Бледный дрозд. 8. Сизый дрозд.

Таблица XXII.

1. Пестрый каменный дрозд (самец). 2. Пестрый каменный дрозд (самка). 3. Синий каменный дрозд (самец). 4. Синий каменный дрозд (самка). 5. Дальневосточный синий каменный дрозд (самец). 6. Дальневосточный синий каменный дрозд (самка). 7. Белогорлый дрозд (самец). 8. Свиристель (взрослый). 9. Свиристель (молодой). 10. Амурский свиристель.

Таблица XXIII.

1. Пастушок. 2. Коростель. 3. Большой погоныш. 4. Погоныш. 5. Погоныш-крошка. 6. Малый погоныш. 7. Японский перепел. 8. Перепел.

Таблица XXIV.

1. Домовый воробей. 2. Полевой воробей. 3. Каменный воробей. 4. Черногрудый воробей. 5. Короткопалый воробей.

Таблица XXV.

1. Щегол (взрослый). 2. Щегол (молодой). 3. Зеленушка (самец). 4. Зеленушка (самка). 5. Седоголовый щегол. 6. Малый черноголовый дубонос (самец). 7. Малый черноголовый дубонос (самка). 8. Китайская зеленушка. 9. Чиж (самец). 10. Чиж (самка).

Таблица XXVI.

1. Королевский вьюрок (взрослый). 2. Королевский вьюрок (молодой). 3. Чечетка (самец). 4. Чечетка (самка). 5. Коноплянка (самец). 6. Коноплянка (самка). 7. Пепельная чечетка. 8. Горная чечетка. 9. Канареечный вьюрок (самец). 10. Канареечный вьюрок (самка).

Таблица XXVII.

1. Сибирская чечевица (самец). 2. Сибирская чечевица (самка). 3. Розовая чечевица (самец). 4. Розовая чечевица (самка). 5. Длиннохвостый снегирь (самец). 6. Длиннохвостый снегирь (самка). 7. Снегирь (самец). 8. Снегирь (самка). 9. Чечевица. 10. Камчатский снегирь. 11. Серый снегирь.

Таблица XXVIII.

1. Вьюрок (самец). 2. Вьюрок (самка). 3. Зяблик (самец). 4. Зяблик (самка). 5. Краснокрылый чечевичник. 6. Пустынный снегирь. 7. Буланый вьюрок.

Таблица XXIX.

1. Жемчужный вьюрок. 2. Гималайский вьюрок. 3. Сибирский вьюрок. 4. Алтайский горный вьюрок. 5. Альпийский вьюрок. 6. Командорский горный вьюрок.

Таблица XXX.

1. Клёст-еловик (самка). 2. Клёст-еловик (самец). 3. Клёст-еловик (молодой). 4. Клёст-сосновик. 5. Белокрылый клёст (самец). 6. Белокрылый клёст (самка).

Таблица XXXI.

1. Просянка. 2. Обыкновенная овсянка (самец). 3. Обыкновенная овсянка (самка). 4. Желчная овсянка (самец). 5. Желчная овсянка (самка). 6. Белошапочная овсянка (самец). 7. Белошапочная овсянка (самка). 8. Дубровник (самец). 9. Дубровник (самка). 10. Рыжая овсянка (самец). 11. Рыжая овсянка (самка).

Таблица XXXII.

1. Желтобровая овсянка. 2. Желтогорлая овсянка (самец). 3. Желтогорлая овсянка (самка). 4. Садовая овсянка. 5. Горная овсянка. 6. Овсянка Стюарта. 7. Скалистая овсянка.

Таблица XXXIII.

1. Овсянка-ремез (самец). 2. Овсянка-ремез (самка). 3. Красноухая овсянка. 4. Японская овсянка. 5. Седоголовая овсянка (самец). 6. Седоголовая овсянка (самка). 7. Таежная овсянка. 8. Ошейниковая овсянка.

Таблица XXXIV.

1. Камышовая овсянка (самец). 2. Камышовая овсянка (самка). 3. Рыжешейная овсянка. 4. Овсянка-крошка. 5. Черноголовая овсянка (самец). 6. Черноголовая овсянка (самка). 7. Полярная овсянка (самец). 8. Полярная овсянка (самка).

Таблица XXXV.

1. Древесная трясогузка. 2. Горная трясогузка (самец). 3. Горная трясогузка (самка). 4. Желтая трясогузка (самец). 5. Желтая трясогузка (самка). 6. Белая трясогузка. 7. Дальневосточная белая трясогузка. 8. Маскированная белая трясогузка. 9. Белая трясогузка (молодая). 10. Белая трясогузка (осенняя). 11. Белоножка. 12. Желтоголовая трясогузка.

Таблица XXXVI.

1. Стенолаз (весенний). 2. Стенолаз (зимний). 3. Поползень. 4. Кавказский поползень. 5. Пищуха. 6. Гималайская пищуха. 7. Черноголовый поползень. 8. Скалистый поползень.

Таблица XXXVII.

1. Большая синица (среднеазиатская). 2. Большая синица. 3. Белая лазоревка. 4. Белая лазоревка (среднеазиатская). 5. Лазоревка.

Таблица XXXVIII.

1. Сероголовая гаичка. 2. Средиземноморская гаичка. 3. Московка. 4. Рыжешейная синица. 5. Хохлатая синица. 6. Черноголовая гаичка.

Таблица XXXIX.

1. Длиннохвостая синица. 2. Длиннохвостая синица (кавказская). 3. Ремез. 4. Черноголовый ремез. 5. Желтоголовый королек. 6. Красноголовый королек. 7. Расписная синичка (самец). 8. Расписная синичка (самка). 9. Буробокая белоглазка. 10. Бурая сутора. 11. Японская синица.

Таблица XL.

1. Серый личинкоед. 2. Японский сорокопут. 3. Индийский жулан. 4. Длиннохвостый сорокопут. 5. Красноголовый сорокопут. 6. Жулан (самец). 7. Жулан (самка). 8. Жулан (азиатский).



Таблица XLI.

1. Райская мухоловка (самец). 2. Райская мухоловка (самка). 3. Мухоловка Мугимаки (самец). 4. Мухоловка Мугимаки (самка). 5. Рыжехвостая мухоловка. 6. Малая мухоловка (самец). 7. Малая мухоловка (самка). 8. Желтоспинная мухоловка (самец). 9. Желтоспинная мухоловка (самка). 10. Синяя мухоловка (самец). 11. Синяя мухоловка (самка).

Таблица XLII.

1. Пеночка-трещотка. 2. Пеночка-весничка. 3. Пеночка-зарничка. 4. Корольковая пеночка. 5. Бурая пеночка. 6. Индийская пеночка.

Таблица XLIII.

1. Синехвостка. 2. Соловей-свистун. 3. Южный соловей. 4. Соловей. 5. Синий соловей. 6. Тугайный соловей. 7. Черноголовый чекан. 8. Луговой чекан.

Таблица XLIV.

1. Соловей-белошейка (самец). 2. Соловей-белошейка (самка). 3. Черногрудая красношейка (самец). 4. Черногрудая красношейка (самка). 5. Соловей-красношейка. 6. Варакушка (самец). 7. Варакушка (самка). 8. Зарянка (взрослая). 9. Зарянка (молодая). 10. Японская зарянка.

Таблица XLV.

1. Горихвостка (самец). 2. Горихвостка (самка). 3. Белошапочная горихвостка. 4. Рыжеспинная горихвостка. 5. Горихвостка-чернушка. 6. Седоголовая горихвостка (самец). 7. Седоголовая горихвостка (самка). 8. Сибирская горихвостка. 9. Краснобрюхая горихвостка.

Таблица XLVI.

1. Альпийская завирушка. 2. Лесная завирушка. 3. Сибирская завирушка. 4. Гималайская завирушка. 5. Черногорлая завирушка. 6. Бледная завирушка. 7. Полосатая тимелия.

Таблица XLVII.

1. Деревенская ласточка. 2. Городская ласточка. 3. Скалистая ласточка. 4. Рыжепоясничная ласточка. 5. Ласточка-береговушка. 6. Нитчатая ласточка.

Таблица XLVIII.

1. Малый острокрылый дятел. 2. Малый пестрый дятел. 3. Большой острокрылый дятел. 4. Зимородок. 5. Вертишейка.